







19825



B. Prov.

I

20.42

B. 23

608243

ANALYSE

DES
INFINIMENT PETITS,

POUR
L'INTELLIGENCE DES LIGNES COURBES.

Par Mr le Marquis DE L'HOSPITAL.

SECONDE EDITION.



A PARIS,

Chez FRANÇOIS MONTALANT à l'entrée du
Quay des Augustins du côté du Pont S. Michel.

M D C C X V I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.



P R E F A C E.



'ANALYSE qu'on explique dans cet Ouvrage , suppose la commune ; mais elle en est fort différente. L'Analyse ordinaire ne traite que des grandeurs finies : celle-ci pénétre jusque dans l'infini même. Elle compare les différences infiniment petites des grandeurs finies ; elle découvre les rapports de ces différences : & par là elle fait connoître ceux des grandeurs finies , qui comparées avec ces infiniment petits sont comme autant d'infinis. On peut même dire que cette Analyse s'étend au-delà de l'infini : car elle ne se borne pas aux différences infiniment petites ; mais elle découvre les rapports des différences de ces différences , ceux encore des différences troisièmes , quatrièmes , & ainsi de suite , sans trouver jamais de terme qui la puisse arrêter.

a ij

De sorte qu'elle n'embrasse pas seulement l'infini ; mais l'infini de l'infini, ou une infinité d'infinis.

Une Analyse de cette nature pouvoit seule nous conduire jusqu'aux véritables principes des lignes courbes. Car les courbes n'étant que des polygones d'une infinité de côtés, & ne différant entr'elles que par la différence des angles que ces côtés infiniment petits font entr'eux ; il n'appartient qu'à l'Analyse des infiniment petits de déterminer la position de ces côtés pour avoir la courbure qu'ils forment, c'est-à-dire les tangentes de ces courbes, leurs perpendiculaires, leurs points d'inflexion ou de rebroussement, les rayons qui s'y réfléchissent, ceux qui s'y rompent, &c.

Les polygones inscrits ou circonscrits aux courbes, qui par la multiplication infinie de leurs côtés, se confondent enfin avec elles, ont été pris de tout temps pour les courbes mêmes. Mais on en étoit demeuré là : ce n'est que depuis la découverte de l'Analyse dont il s'agit ici, que l'on a bien senti l'étendue & la fécondité de cette idée.

Ce que nous avons des Anciens sur ces matières, principalement d'*Archimède*, est assurément digne d'admiration. Mais outre

qu'ils n'ont touché qu'à fort peu de courbes, qu'ils n'y ont même touché que légèrement; ce ne sont presque par tout que propositions particulieres & sans ordre, qui ne sont apercevoir aucune méthode réguliere & suivie. Ce n'est pas cependant qu'on leur en puisse faire un reproche légitime: ils ont eu besoin d'une extrême force de génie* pour percer à travers tant d'obscurités, & pour entrer les premiers dans des païs entièrement inconnus. S'ils n'ont pas été loin, s'ils ont marché par de longs circuits; du moins, quoi qu'en dise † *Viette*, ils ne se sont point égarés: & plus les chemins qu'ils ont tenus étoient difficiles & épineux, plus ils sont admirables de ne s'y être pas perdus. En un mot il ne paroît pas que les Anciens en ayent pû faire davantage pour leur temps: ils ont fait ce que nos bons esprits auroient fait en leur place; & s'ils étoient à la nôtre, il est à croire qu'ils auroient les mêmes vûes que nous. Tout cela est une suite de l'égalité naturelle des esprits & de la succession nécessaire des découvertes.

Ainsi il n'est pas surprenant que les Anciens n'ayent pas été plus loin; mais on ne sçauroit assés s'étonner que de grands hommes, & sans doute d'aussi grands hommes

* *Archimedis de lineis spiralibus tractatum cum bis terque legifsem, totasque animi vires intulissim, ut subtilissimarum demonstrationum de spiralium tangentibus artificium adsequerer; nusquam tamen, ingenuè fatebor, ab earum contemplatione ita certus recessi, quin scrupulus animo semper haeret, vim illius demonstrationis me non percipisse totam. &c.*
Bullialdus Praef. de lineis spiralibus.

† *Si verè Archimedes, salaciter conclusit Euclides, &c. Suppl. Geom.*

que les Anciens, en soient si long-temps demeurés là; & que par une admiration presque superstitieuse pour leurs ouvrages, ils se soient contentés de les lire & de les commenter, sans se permettre d'autre usage de leurs lumières, que ce qu'il en falloit pour les suivre; sans oser commettre le crime de penser quelquefois par eux-mêmes, & de porter leur vuë au delà de ce que les Anciens avoient découvert. De cette manière bien des gens travailloient, ils écrivoient, les Livres se multiplioient, & cependant rien n'avançoit: tous les travaux de plusieurs siècles n'ont abouti qu'à remplir le monde de respectueux commentaires & de traductions répétées d'originaux souvent assés méprisables.

Tel fut l'état des Mathématiques, & sur tout de la Philosophie, jusqu'à M. *Descartes*. Ce grand homme poussé par son génie & par la supériorité qu'il se sentoit, quitta les Anciens pour ne suivre que cette même raison que les Anciens avoient suivie; & cette heureuse hardiesse, qui fut traitée de révolte, nous valut une infinité de vuës nouvelles & utiles sur la Physique & sur la Géométrie. Alors on ouvrit les yeux, & l'on s'avisa de penser.

Pour ne parler que des Mathématiques,

dont il est seulement ici question, M. *Descartes* commença où les Anciens avoient fini , & il débuta par la solution d'un Problème où *Pappus* dit * qu'ils étoient tous demeurés. On sçait jusqu'où il a porté l'Analyse & la Géométrie, & combien l'alliage qu'il en a fait, rend facile la solution d'une infinité de Problèmes qui paroissent impénétrables avant lui. Mais comme il s'appliquoit principalement à la résolution des égalités, il ne fit d'attention aux courbes qu'autant qu'elles lui pouvoient servir à en trouver les racines: de sorte que l'Analyse ordinaire lui suffisant pour cela, il ne s'avisa point d'en chercher d'autre. Il n'a pourtant pas laissé de s'en servir heureusement dans la recherche des tangentes; & la Méthode qu'il découvrit pour cela, lui parut si belle, qu'il ne fit point de difficulté de dire, * que ce Problème étoit le plus utile & le plus général, non seulement qu'il sçût, mais même qu'il eût jamais désiré de sçavoir en Géométrie.

* *Cehest.
Markem.
Lib. 7.
initio.*

* *Geomet.
Liv. 2.*

Comme la Géométrie de M. *Descartes* avoit mis la construction des Problèmes par la résolution des égalités fort à la mode, & qu'elle avoit donné de grandes ouvertures pour cela; la plupart des Géomètres s'y appliquèrent, ils y firent aussi de nouvelles découvertes, qui

s'augmentent & se perfectionnent encore tous les jours.

Pour M. *Paschal*, il tourna ses vuës de tout un autre côté: il examina les courbes en elles-mêmes, & sous la forme de polygone; il rechercha les longueurs de quelques-unes, l'espace qu'elles renferment, le solide que ces espaces décrivent, les centres de gravité des unes & des autres, &c. Et par la considération seule de leurs élémens, c'est-à-dire des infiniment petits, il découvrit des Méthodes générales & d'autant plus surprenantes, qu'il ne paroît y être arrivé qu'à force de tête & sans analyse.

Peu de temps après la publication de la Méthode de M. *Descartes* pour les tangentes, M. de *Fermat* en trouva aussi une, que M. *Descartes* a enfin avoué* lui-même être plus simple en bien des rencontres que la sienne. Il est pourtant vrai qu'elle n'étoit pas encore aussi simple que M. *Barrow* l'a rendue depuis en considérant de plus près la nature des polygones, qui présente naturellement à l'esprit un petit triangle fait d'une particule de courbe, comprise entre deux appliquées infiniment proches, de la différence de ces deux appliquées, & de celle des coupées correspondantes;

* Lett. 71.
Tom. 3.

res ; & ce triangle est semblable à celui qui se doit former de la tangente , de l'appliquée , & de la soutangente : de sorte que par une simple Analogie cette dernière Méthode épargne tout le calcul que demande celle de M. *Descartes* , & que cette Méthode , elle-même , demandoit auparavant.

M. *Barrow* * n'en demeura pas là , il inventa aussi une espèce de calcul propre à cette Méthode ; mais il lui falloit , aussi-bien que dans celle de M. *Descartes* , ôter les fractions , & faire évanouir tous les signes radicaux pour s'en servir.

Au défaut de ce calcul est survenu celui du célèbre * M. *Leibnis* ; & ce sçavant Géomètre a commencé où M. *Barrow* & les autres avoient fini. Son calcul l'a mené dans des pais jusqu'ici inconnus ; & il y a fait des découvertes qui font l'étonnement des plus habiles Mathématiciens de l'Europe. M^{rs} *Bernoulli* ont été les premiers qui se sont aperçus de la beauté de ce calcul : ils l'ont porté à un point qui les a mis en état de surmonter des difficultés qu'on n'auroit jamais osé tenter auparavant.

L'étendue de ce calcul est immense : il convient auxco urbes mécaniques , comme aux

* *Lecl. Geomet.* p. 80.

* *Acta Erud. Lipsic.* an. 1684. p. 467.

géométriques ; les signes radicaux lui sont indifferens ; & même souvent commodes ; il s'étend à tant d'indéterminées qu'on voudra ; la comparaison des infiniment petits de tous les genres lui est également facile. Et de là naissent une infinité de découvertes surprenantes par rapport aux tangentes tant courbes que droites , aux questions *De maximis & minimis* , aux points d'inflexion & de rebroussement des courbes, aux développées, aux caustiques par réflexion ou par refraction, &c. comme on le verra dans cet Ouvrage.

Je le divise en dix Sections. La première contient les principes du calcul des différences. La seconde fait voir de quelle manière l'on s'en doit servir pour trouver les tangentes de toutes sortes de courbes, quelque nombre d'indéterminées qu'il y ait dans l'équation qui les exprime , quoique M. *Craige* * n'ait pas crû qu'il pût s'étendre jusqu'aux courbes mécaniques ou transcendantes. La troisième, comment il sert à résoudre toutes les questions *De maximis & minimis*. La quatrième, comment il donne les points d'inflexion & de rebroussement des courbes. La cinquième en découvre l'usage pour trouver les développées de M. *Hugens* , dans toutes sortes de courbes.

* *De figurarum curvilinearum quadraturis*, part. 1.

La sixième & la septième font voir comment il donne les caustiques, tant par réflexion que par réfraction, dont l'illustre M. *Tschirnhaus* est l'inventeur, & pour toutes sortes de courbes encore. La huitième en fait voir encore l'usage pour trouver les points des lignes courbes qui touchent une infinité de lignes données de position, droites ou courbes. La neuvième contient la solution de quelques Problèmes qui dépendent des découvertes précédentes. Et la dixième consiste dans une nouvelle manière de se servir du calcul des différences pour les courbes géométriques : d'où l'on déduit la Méthode de M^{rs} *Descartes* & *Hudde*, laquelle ne convient qu'à ces sortes de courbes.

Il est à remarquer que dans les Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a que très peu de propositions ; mais elles sont toutes générales, & comme autant de Méthodes dont il est aisé de faire l'application à tant de propositions particulières qu'on voudra : je la fais seulement sur quelques exemples choisis, persuadé qu'en fait de Mathématique il n'y a à profiter que dans les Méthodes, & que les Livres qui ne consistent qu'en détail ou en propositions particulières, ne sont bons qu'à faire perdre

du temps à ceux qui les font, & à ceux qui les lisent. Aussi n'ai-je ajouté les Problèmes de la Section neuvième, que parcequ'ils passent pour curieux, & qu'ils sont très universels. Dans la dixième Section ce ne sont encore que des Méthodes que le calcul des différences donne à la manière de M^{rs} *Descartes* & *Hudde*; & si elles sont si limitées, on voit par toutes les précédentes que ce n'est pas un défaut de ce calcul, mais de la Méthode Cartésienne à laquelle on l'assujettit. Au contraire rien ne prouve mieux l'usage immense de ce calcul, que toute cette variété de Méthodes; & pour peu d'attention qu'on y fasse, l'on verra qu'il tire tout ce qu'on peut tirer de celle de M^{rs} *Descartes* & *Hudde*, & que la preuve universelle qu'il donne de l'usage qu'on y fait des progressions arithmétiques, ne laisse plus rien à souhaiter pour l'infailibilité de cette dernière Méthode.

J'avois dessein d'y ajouter encore une Section pour faire sentir aussi le merveilleux usage de ce calcul dans la Physique, jusqu'à quel point de précision il la peut porter, & combien les ~~Mécaniques~~ *Mécaniques* en peuvent retirer d'utilité. Mais une maladie m'en a empêché :

Le public n'y perdra pourtant rien , & il l'aura quelque jour même avec usure.

Dans tout cela il n'y a encore que la première partie du calcul de M. *Leibnis*, laquelle consiste à descendre des grandeurs entières à leurs différences infiniment petites, & à comparer entr'eux ces infiniment petits de quelque genre qu'ils soient : c'est ce qu'on appelle *Calcul différentiel*. Pour l'autre partie, qu'on appelle *Calcul intégral*, & qui consiste à remonter de ces infiniment petits aux grandeurs ou aux tous dont ils sont les différences, c'est-à-dire à en trouver les sommes, j'avois aussi dessein de le donner. Mais M. *Leibnis* m'ayant écrit qu'il y travailloit dans un Traité qu'il intituloit *De Scientiâ infiniti*, je n'ai eu garde de priver le public d'un si bel Ouvrage qui doit renfermer tout ce qu'il y a de plus curieux pour la Méthode inverse des tangentes, pour les rectifications des courbes, pour la quadrature des espaces qu'elles renferment, pour celles des surfaces des corps qu'elles décrivent, pour la dimension de ces corps, pour la découverte des centres de gravité, &c. Je ne rends même ceci public, que parcequ'il m'en a prié par ses Lettres, & que je le crois nécessaire pour préparer les esprits

à comprendre tout ce qu'on pourra découvrir dans la suite sur ces matières.

Au reste je reconnois devoir beaucoup aux lumieres de M^{rs} *Bernoulli*, sur tout à celles du jeune presentement Professeur à Groningue. Je me suis servi sans façon de leurs découvertes & de celles de M. *Leibnis*. C'est pourquoi je consens qu'ils en revendiquent tout ce qu'il leur plaira, me contentant de ce qu'ils voudront bien me laisser.

* *Journal
des Sçavans
du 30 Aoust
1694.*

C'est encore une justice dûë au sçavant M. *Newton*, & que M. *Leibnis* lui a renduë* lui-même: Qu'il avoit aussi trouvé quelque chose de semblable au calcul différentiel, comme il paroît par l'excellent Livre intitulé *Philosophia naturalis principia Mathematica*, qu'il nous donna en 1687, lequel est presque tout de ce calcul. Mais la Caractéristique de M. *Leibnis* rend le sien beaucoup plus facile & plus expeditif; outre qu'elle est d'un secours merveilleux en bien des rencontres.

Comme l'on imprimoit la dernière feuille de ce Traité, le Livre de M. *Nieuwentiit* m'est tombé entre les mains. Son titre, *Analysis infinitorum*, m'a donné la curiosité de le parcourir: mais j'ai trouvé qu'il étoit fort différent de celui-ci; car outre que cet Auteur

ne se sert point de la Caractéristique de M. *Leibnis*, il rejette absolument les différences secondes, troisièmes, &c. Comme j'ai bâti la meilleure partie de cet Ouvrage sur ce fondement, je me croirois obligé de répondre à ses objections, & de faire voir combien elles sont peu solides, si M. *Leibnis* n'y avoit déjà pleinement satisfait dans les Actes* de Leypsock. D'ailleurs les deux demandes ou suppositions que j'ai faites au commencement de ce Traité, & sur lesquelles seules il est appuyé, me paroissent si évidentes, que je ne crois pas qu'elles puissent laisser aucun doute dans l'esprit des Lecteurs attentifs. Je les aurois même pû démontrer facilement à la manière des Anciens, si je ne me fusse proposé d'être court sur les choses qui sont déjà connues, & de m'attacher principalement à celles qui sont nouvelles.

* *Acta Erud.*
an. 1695. p.
310 & 369.





T A B L E.

SECTION I.	<i>Où l'on donne les Regles du calcul des différences,</i>	page 1
SECT. II.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les tangentes de toutes sortes de lignes courbes,</i>	11
SECT. III.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les plus grandes & les moindres appliquées, ou se réduisent les questions De maximis & minimis,</i>	41
SECT. IV.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les points d'inflexion & de rebroussement,</i>	55
SECT. V.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les développées,</i>	71
SECT. VI.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les caustiques par réflexion,</i>	104
SECT. VII.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les caustiques par réfraction,</i>	120
SECT. VIII.	<i>Usage du calcul des différences pour trouver les points des lignes courbes qui touchent une infinité de lignes données de position, droites ou courbes,</i>	131
SECT. IX.	<i>Solution de quelques Problèmes qui dépendent des Méthodes précédentes,</i>	145
SECT. X.	<i>Nouvelle manière de se servir du calcul des différences dans les courbes géométriques, d'où l'on déduit la Méthode de M^r Descartes & Hudde,</i>	164

ANALYSE



ANALYSE

DES

INFINIMENT PETITS.

PREMIERE PARTIE.

DU CALCUL DES DIFFERENCES.

SECTION PREMIERE.

Où l'on donne les regles de ce Calcul.

DÉFINITION I.



N appelle quantités *variables* celles qui augmentent ou diminuent continuellement ; & au contraire quantités *constantes* celles qui demeurent les mêmes pendant que les autres changent. Ainsi dans une parabole les appliquées & les coupées sont des quantités variables, au lieu que le parametre est une quantité constante.

A

DEFINITION II.

La portion infiniment petite dont une quantité variable augmente ou diminue continuellement, en est appelée la

FIG. 1. *Différence*. Soit par exemple une ligne courbe quelconque AMB , qui ait pour axe ou diamètre la ligne AC , & pour une de ses appliquées la droite PM ; & soit une autre appliquée pm infiniment proche de la première. Cela posé, si l'on mène MR parallèle à AC ; les cordes AM , Am ; & qu'on décrive du centre A , de l'intervalle AM le petit arc de cercle MS : Pp sera la différence de AP , Rm celle de PM , Sm celle de AM , & Mm celle de l'arc AM . De même le petit triangle MAm qui a pour base l'arc Mm , fera la différence du segment AM ; & le petit espace $MPpm$, celle de l'espace compris par les droites AP , PM , & par l'arc AM .

COROLLAIRE.

1. IL est évident que la différence d'une quantité constante est nulle ou zéro: ou (ce qui est la même chose) que les quantités constantes n'ont point de différence.

Avertissement.

On se servira dans la suite de la note ou caractéristique d pour marquer la différence d'une quantité variable que l'on exprime par une seule lettre; & pour éviter la confusion, cette note d n'aura point d'autre usage dans la suite de ce calcul. Si l'on nomme par exemple les variables AP , x ; PM , y ; AM , z ; l'arc AM , u ; l'espace mixtiligne APM , s ; & le segment AM , t : dx exprimera la valeur de Pp , dy celle de Rm , dz celle de Sm , du celle du petit arc Mm , ds celle du petit espace $MPpm$, & dt celle du petit triangle mixtiligne MAm .

I. DEMANDE OU SUPPOSITION.

2. ON demande qu'on puisse prendre indifféremment l'une pour l'autre deux quantités qui ne diffèrent entr'elles que d'une quantité infiniment petite: ou (ce qui est la même

chose) qu'une quantité qui n'est augmentée ou diminuée que d'une autre quantité infiniment moindre qu'elle, puisse être considérée comme demeurant la même. On demande par exemple qu'on puisse prendre Ap pour AP , pm pour PM , l'espace Apm pour l'espace APM , le petit espace $MPpm$ pour le petit rectangle $MPpR$, le petit secteur AMm pour le petit triangle AMS , l'angle pAm pour l'angle PAM , &c.

II. DEMANDE OU SUPPOSITION.

3. ON demande qu'une ligne courbe puisse être considérée comme l'assemblage d'une infinité de lignes droites, chacune infiniment petite : ou (ce qui est la même chose) comme un polygone d'un nombre infini de côtés, chacun infiniment petit, lesquels déterminent par les angles qu'ils font entr'eux, la courbure de la ligne. On demande par exemple que la portion de courbe Mm & l'arc de cercle MS puissent être considérés comme des lignes droites à cause de leur infinie petitesse, en sorte que le petit triangle mSM puisse être censé rectiligne.

Avertissement.

*On suppose ordinairement dans la suite que les dernières lettres de l'alphabet, z, y, x, &c. marquent des quantités variables ; & au contraire que les premières a, b, c, &c. marquent des quantités constantes : de sorte que x devenant $x + dx$; y, z, &c. deviennent $y + dy$, $z + dz$, &c. * Et a, b, c, &c. demeurent * Art. 1. les mêmes a, b, c, &c.*

PROPOSITION I.

Problème.

4. PRENDRE la différence de plusieurs quantités ajoutées ensemble, ou soustraites les unes des autres.

Soit $a + x + y - z$ dont il faut prendre la différence. Si l'on suppose que x soit augmentée d'une portion infiniment petite ; c'est à dire qu'elle devienne $x + dx$; y de-

Aij

- 4
 * Art. 1. viendra alors $y + dy$ & $z, z + dz$; pour la constante a , *elle demeurera la même a : de sorte que la quantité proposée $a + x + y - z$ deviendra $a + x + dx + y + dy - z - dz$; & sa différence, que l'on trouvera en la retranchant de cette dernière, sera $dx + dy - dz$. Il en est ainsi des autres, ce qui donne cette règle.

R È G L E I.

Pour les quantités ajoutées, ou soustraites.

On prendra la différence de chaque terme de la quantité proposée, & retenant les mêmes signes, on en composera une autre quantité qui sera la différence cherchée.

P R O P O S I T I O N I I.

Problème.

5. P R E N D R E la différence d'un produit fait de plusieurs quantités multipliées les unes par les autres.

1°. La différence de xy est $ydx + xdy$. Car y devient $y + dy$ lors que x devient $x + dx$; & partant xy devient alors $xy + ydx + xdy + dxdy$, qui est le produit de $x + dx$ par $y + dy$, & sa différence sera $ydx + xdy + dxdy$, c'est à dire $*ydx + xdy$: puisque $dxdy$ est une quantité infiniment petite par rapport aux autres termes ydx , & xdy ; car si l'on divise par exemple ydx & $dxdy$ par dx , on trouve d'une part y , & de l'autre dy qui en est la différence, & par conséquent infiniment moindre qu'elle. D'où il suit que la différence du produit de deux quantités est égale au produit de la différence de la première de ces quantités par la seconde, plus au produit de la différence de la seconde par la première.

2°. La différence de xyz est $yzdx + xzdy + xydz$. Car en considérant le produit xy comme une seule quantité, il faudra, comme l'on vient de prouver, prendre le produit de sa différence $ydx + xdy$ par la seconde z (ce qui donne $yzdx + xzdy$) plus le produit de la différence dz

DES INFINIMENT PETITS. I. Partie. 5

de la seconde z par la première xy (ce qui donne $xydz$), & partant la différence de xyz sera $yzdx + xzdy + xydz$.

3°. La différence de xyz est $xyzdx + xzdy + xydz$. Ce qui se prouve comme dans le cas précédent en regardant le produit xyz comme une seule quantité. Il en est ainsi des autres à l'infini, d'où l'on forme cette règle.

RÈGLE II.

Pour les quantités multipliées.

La différence du produit de plusieurs quantités multipliées les unes par les autres, est égale à la somme des produits de la différence de chacune de ces quantités par le produit des autres.

Ainsi la différence de ax est $xo + adx$, c'est à dire adx . Celle de $\overline{a+x} \times \overline{b-y}$ est $bdx - ydx - ady - xdy$.

PROPOSITION III.

Problème.

6. PRENDRE la différence d'une fraction quelconque.

La différence de $\frac{x}{y}$ est $\frac{ydx - xdy}{y^2}$. Car supposant $\frac{x}{y} = z$, on aura $x = yz$, & comme ces deux quantités variables x & yz doivent toujours être égales entr'elles, soit qu'elles augmentent ou diminuent, il s'en suit que leur différence, c'est à dire leurs accroissemens ou diminutions seront aussi égales entr'elles, & partant * on aura $dx = ydz + zdy$, & $dz = \frac{dx - zdy}{y} = \frac{ydx - xdy}{y^2}$ en mettant pour z sa valeur $\frac{x}{y}$. Ce qu'il falloit, &c. d'où l'on forme cette règle.

RÈGLE III.

Pour les quantités divisées, ou pour les fractions.

La différence d'une fraction quelconque est égale au

A iij

produit de la différence du numérateur par le dénominateur, moins le produit de la différence du dénominateur par le numérateur : le tout divisé par le quarré du dénominateur.

Ainsi la différence de $\frac{a}{x}$ sera $-\frac{adx}{xx}$, celle de $\frac{x}{a+x}$ sera $\frac{adx}{aa+2ax+xx}$.

PROPOSITION IV.

Problème.

7. **PRENDRE** la différence d'une puissance quelconque parfaite ou imparfaite d'une quantité variable.

Il est nécessaire afin de donner une règle générale qui serve pour les puissances parfaites & imparfaites, d'expliquer l'analogie qui se rencontre entre leurs exposans.

Si l'on propose une progression géométrique dont le premier terme soit l'unité, & le second une quantité quelconque x , & qu'on dispose par ordre sous chaque terme son exposant, il est clair que ces exposans formeront une progression arithmétique.

Prog. geom. $1, x, \frac{xx}{x}, x^3, x^4, x^5, x^6, x^7, \&c.$

Prog. arith. $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \&c.$

Et si l'on continue la progression géométrique au dessous de l'unité, & l'arithmétique au dessous de zero, les termes de celle-ci seront les exposans de ceux auxquels ils répondent dans l'autre. Ainsi -1 est l'exposant de $\frac{1}{x}$, -2 celui de $\frac{1}{xx}$, &c.

Prog. geom. $x, 1, \frac{1}{x}, \frac{1}{xx}, \frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^4}, \&c.$

Prog. arith. $1, 0, -1, -2, -3, -4, \&c.$

Mais si l'on introduit quelque nouveau terme dans la progression géométrique, il faudra pour avoir son exposant, en introduire un semblable dans l'arithmétique.

Ainsi $\sqrt{x}$ aura pour exposant $\frac{1}{2}$: $\sqrt[3]{x}$, $\frac{1}{3}$: $\sqrt{x^4}$, $\frac{4}{3}$: $\sqrt[3]{x^5}$, $-\frac{1}{2}$: $\sqrt[3]{x^2}$, $-\frac{2}{3}$: $\sqrt[3]{x^2}$, $-\frac{2}{3}$: &c. de sorte que ces expres-

sions $\sqrt{x}$ & $x^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{x}$ & $x^{\frac{1}{3}}$, $\sqrt[4]{x}$ & $x^{\frac{1}{4}}$, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ & $x^{-\frac{1}{2}}$, &c. ne signifient que la même chose.

Prog. geom. x , $\sqrt{x}$, x , $\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\sqrt[3]{xx}$, x , $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $\sqrt[3]{xx}$, $\sqrt[4]{x^3}$, $\sqrt[4]{x^4}$, x .

Prog. arith. 0 , $\frac{1}{x}$, x , 0 , $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{1}{x}$, 0 , $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{3}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{1}{x}$, 0 , $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{3}{x}$, $\frac{4}{x}$, x .

Prog. geom. $\frac{1}{x}$, $\sqrt[3]{x^2}$, $\frac{1}{xx}$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt[4]{x^3}$, $\sqrt[4]{x^4}$, $\frac{1}{xx}$, $\frac{1}{x^3}$, $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$, $\frac{1}{x^4}$.

Prog. arith. -1 , $-\frac{1}{x}$, -2 , -1 , $-\frac{4}{x}$, $-\frac{1}{x}$, -2 , -3 , $-\frac{7}{x}$, -4 .

Où l'on voit que de même que $\sqrt{x}$ est moyenne géométrique entre 1 & x , de même aussi $\frac{1}{x}$ est moyenne arithmétique entre leurs exposans zero & 1 : & de même que $\sqrt[3]{x}$ est la première des deux moyennes géométriquement proportionnelles entre 1 & x , de même aussi $\frac{1}{x}$ est la première des deux moyennes arithmétiquement proportionnelles entre leurs exposans zero & 1 : & il en est ainsi des autres. Or il suit de la nature de ces deux progressions.

1°. Que la somme des exposans de deux termes quelconques de la progression géométrique sera l'exposant du terme qui en est le produit. Ainsi x^{4+1} où x^5 est le produit de x^1 par x^4 , & $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}$ où x^1 est le produit de $x^{\frac{1}{2}}$ par $x^{\frac{1}{2}}$, & $x^{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}$ où x^0 est le produit de $x^{-\frac{1}{2}}$ par $x^{\frac{1}{2}}$, &c. De même $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}$ où x^1 est le produit de $x^{\frac{1}{2}}$ par lui-même, c'est à dire son quarré, & x^{+1+1+1} où x^3 est le produit de x^1 par x^1 par x^1 , c'est à dire son cube, & $x^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}$ où x^{-2} est la quatrième puissance de $x^{-\frac{1}{2}}$, & il en est ainsi des autres puissances. D'où il est évident que le double, le triple, &c. de l'exposant d'un terme quelconque de la progression géométrique est l'exposant du quarré, du cube, &c. de ce terme ; & partant que la moitié, le tiers, &c. de l'exposant d'un terme quelconque de la progression géométrique sera l'exposant de la racine quarrée, cubique, &c. de ce terme.

2°. Que la différence des exposans de deux termes quelconques de la progression géométrique sera l'exposant du

quotient de la division de ces termes. Ainsi $x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}$
 $= x^{\frac{1}{2}}$ sera l'exposant du quotient de la division de
 $x^{\frac{1}{2}}$ par $x^{\frac{1}{2}}$, & $x^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}} = x^{-\frac{3}{4}}$ sera l'exposant du quo-
 tient de la division de $x^{-\frac{1}{2}}$ par $x^{\frac{1}{4}}$, où l'on voit que c'est
 la même chose de multiplier $x^{-\frac{1}{2}}$ par $x^{-\frac{1}{4}}$ que de di-
 viser $x^{-\frac{1}{2}}$ par $x^{\frac{1}{4}}$. Il en est ainsi des autres. Ceci bien
 entendu, il peut arriver deux différens cas.

Premier cas, lorsque la puissance est parfaite, c'est à dire
 lorsque son exposant est un nombre entier. La différence
 de xx est $2xdx$, de x^3 est $3xxdx$, de x^4 est $4x^3dx$, &c. Car
 le quarré de x n'étant autre chose que le produit de x par
 * *Art. 5.* x , sa différence * sera $xdx + xdx$, c'est à dire $2xdx$. De mê-
 me le cube de x n'étant autre chose que le produit de x
 par x par x , sa différence * sera $xxdx + xxdx + xxdx$, c'est
 à dire $3xxdx$; & comme il en est ainsi des autres puissances
 à l'infini, il s'en suit que si l'on suppose que m marque un
 nombre entier tel que l'on voudra, la différence de x^m sera
 $mx^{m-1}dx$.

Si l'exposant est négatif, on trouvera que la différence
 de x^{-m} ou de $\frac{1}{x^m}$ sera $\frac{-mx^{m-1}dx}{x^{2m}} = -mx^{-m-1}dx$.

Second cas, lorsque la puissance est imparfaite, c'est à
 dire lorsque son exposant est un nombre rompu. Soit pro-
 posé de prendre la différence de $\sqrt{x^m}$ ou $x^{\frac{m}{n}}$ ($\frac{m}{n}$ exprime un
 nombre rompu quelconque) on supposera $x^{\frac{m}{n}} = z$, & en
 élevant chaque membre à la puissance n on aura $x^m = z^n$,
 & en prenant les différences comme l'on vient d'expliquer
 dans le premier cas, on trouvera $mx^{m-1}dx = nz^{n-1}dz$,
 & $dz = \frac{mx^{m-1}dx}{nz^{n-1}} = \frac{m}{n}x^{\frac{m}{n}-1}dx$, ou $\frac{m}{n}dx\sqrt{x^{m-n}}$, en
 mettant à la place de nz^{n-1} sa valeur $nx^{\frac{m}{n}-1}$. Si l'expo-
 sant est négatif, on trouvera que la différence de $x^{-\frac{m}{n}}$
 ou de $\frac{1}{x^{\frac{m}{n}}}$ sera $\frac{-\frac{m}{n}x^{\frac{m}{n}-1}dx}{\frac{1}{x^{\frac{m}{n}}}} = -\frac{m}{n}x^{-\frac{m}{n}-1}dx$. Ce

Ce qui donne cette regle générale.

REGLE IV.

Pour les Puissances parfaites ou imparfaites.

La différence d'une puissance quelconque parfaite ou imparfaite d'une quantité variable, est égale au produit de l'exposant de cette puissance, par cette même quantité élevée à une puissance moindre d'une unité, & multipliée par sa différence.

Ainsi si l'on suppose que m exprime tel nombre entier ou rompu que l'on voudra, soit positif, soit négatif, & x une quantité variable quelconque, la différence de x^m sera toujours $m x^{m-1} dx$.

E X E M P L E S.

La différence du cube de $ay - xx$, c'est à dire de $ay - xx$, est $3 \times ay - xx^2 \times a dy - 2x dx = 3a^2 y dy - 6aaxxydy + 3ax^2 dy - 6aayyxdx + 12ayx^2 dx - 6x^3 dx$.

La différence de $\sqrt{xy + yy}$ ou de $xy + yy^{\frac{1}{2}}$, est $\frac{1}{2} \times xy + yy - \frac{1}{2} \times ydx + xdy + 2ydy$, ou $\frac{ydx + xdy + 2ydy}{2\sqrt{xy + yy}}$.

Celle de $\sqrt{a^2 + axyy}$ ou de $a^2 + axyy^{\frac{1}{2}}$, est $\frac{1}{2} \times a^2 + axyy - \frac{1}{2} \times ayydx + 2axydy$, ou $\frac{ayydx + 2axydy}{2\sqrt{a^2 + axyy}}$. Celle de $\sqrt[3]{ax + xx}$,

ou de $ax + xx^{\frac{1}{3}}$, est $\frac{1}{3} \times ax + xx - \frac{1}{3} \times adx + 2xdx$, ou $\frac{adx + 2xdx}{3\sqrt[3]{ax + xx}}$.

La différence de $\sqrt{ax + xx} + \sqrt{a^2 + axyy}$ ou de $ax + xx + \sqrt{a^2 + axyy}^{\frac{1}{2}}$, est $\frac{1}{2} \times ax + xx + \sqrt{a^2 + axyy} - \frac{1}{2} \times adx + 2xdx + \frac{ayydx + 2axydy}{2\sqrt{a^2 + axyy}}$, ou $\frac{adx + 2xdx}{2\sqrt{ax + xx} + \sqrt{a^2 + axyy}} + \frac{ayydx + 2axydy}{2\sqrt{a^2 + axyy} \times 2\sqrt{ax + xx} + \sqrt{a^2 + axyy}}$.

B

* Art. 7. 6. La différence de $\frac{\sqrt[3]{ax+xx}}{\sqrt{xy+yy}}$ sera selon cette regle* & celle

$$\frac{\frac{adx+xxdx}{3\sqrt[3]{ax+xx}} \times \sqrt{xy+yy} - ydx - xdy - zdy}{xy+yy} \times \frac{\sqrt[3]{ax+xx}}{2\sqrt{xy+yy}}$$

des fractions

REMARQUE.

8. IL est à propos de bien remarquer que l'on a toujours supposé en prenant les différences, qu'une des variables x croissant, les autres y , z , &c. croissent aussi; c'est à dire que les x devenant $x + dx$, les y , z , &c. devenoient $y + dy$, $z + dz$, &c. C'est pourquoi s'il arrive que quelques unes diminuent pendant que les autres croissent, il en faudra regarder les différences comme des quantités négatives par rapport à celles des autres qu'on suppose croître. & changer par conséquent les signes des termes où les différences de celles qui diminuent se rencontrent. Ainsi si l'on suppose que les x croissant, les y & les z diminuent, c'est à dire que les x devenant $x + dx$, les y & les z deviennent $y - dy$ & $z - dz$, & que l'on veuille prendre la différence du produit xyz ; il faudra changer dans la différence $xydz + xzdy + yzdx$ trouvée *, les signes des termes où dy & dz se rencontrent: ce qui donne $yzdx - xydz - xzdy$ pour la différence cherchée.

* Art. 5.



SECTION II.

Usage du calcul des différences pour trouver les Tangentes de toutes sortes de lignes courbes.

DÉFINITION.

SI l'on prolonge un des petits côtés Mm du polygone FIG. 2. qui compose* une ligne courbe, ce petit côté ainsi* Art. 1. prolongé sera appelé la Tangente de la courbe au point M ou m .

PROPOSITION I.

Problème.

9. SOIT une ligne courbe AM telle que la relation de la cou- FIG. 3.
pée AP à l'appliquée PM , soit exprimée par une équation quel-
conque, & qu'il faille du point donné M sur cette courbe mener
la tangente MT .

Ayant mené l'appliquée MP , & supposé que la droite MT qui rencontre le diamètre au point T , soit la tangente cherchée; on concevra une autre appliquée mp infiniment proche de la première, avec une petite droite MR parallèle à AP . Et en nommant les données AP , x ; PM , y ; (donc Pp ou $MR = dx$, & $Rm = dy$.) les triangles semblables mRM & MPT donneront $mR(dy)$. $RM(dx :: MP(y). PT = \frac{ydx}{dy}$. Or par le moyen de la différence de l'équation donnée, on trouvera une valeur de dx en termes qui seront tous affectés par dy , laquelle étant multipliée par y & divisée par dy , donnera une valeur de la sous-tangente PT en termes entièrement connus & délivrés des différences, laquelle servira à mener la tangente cherchée MT .

REMARQUE.

10. LORSQUE le point T tombe du côté opposé au point A origine des x , il est clair que x croissant, y dimi- FIG. 4.

- * *Art. 3.* nue, & qu'il faut changer par conséquent* dans la différence de l'équation donnée les signes de tous les termes où dy se rencontre : autrement la valeur de dx en dy seroit négative ; & partant aussi celle de $PT \left(\frac{y dx}{dy} \right)$. Il est mieux cependant, pour ne se point embarrasser, de prendre toujours la différence de l'équation donnée par les règles que l'on
- * *Scilicet. 1.* a prescrites* sans y rien changer, car s'il arrive à la fin de l'opération que la valeur de PT soit positive, il s'ensuivra qu'il faudra prendre le point T du même côté que le point A origine des x , comme l'on a supposé en faisant le calcul : & au contraire si elle est négative, il le faudra prendre du côté opposé. Ceci s'éclaircira par les exemples suivans.

EXEMPLE I.

FIG. 3. II. 1°. Si l'on veut que $ax = yy$ exprime la relation de AP à PM ; la courbe AM sera une parabole qui aura pour paramètre la droite donnée a , & l'on aura en prenant de part & d'autre les différences, $adx = 2ydy$, & $dx = \frac{2ydy}{a}$ & $PT \left(\frac{y dx}{dy} \right) = \frac{yy}{a} = 2x$ en mettant pour yy sa valeur ax . D'où il suit que si l'on prend PT double de AP , & qu'on mène la droite MT , elle sera tangente au point M . Ce qui étoit proposé.

FIG. 4. 2°. Soit l'équation $ax = xy$ qui exprime la nature de l'hyperbole entre les asymptotes. On aura en prenant les différences $x dy + y dx = 0$, & partant $PT \left(\frac{y dx}{dy} \right) = -x$. D'où il suit que si l'on prend $PT = PA$ du côté opposé au point A , & qu'on mène la droite MT , elle sera la tangente en M .

3°. Soit l'équation générale $y^m = x$ qui exprime la nature de toutes les paraboles à l'infini lorsque l'exposant m marque un nombre positif entier ou rompu, & de toutes les hyperboles lorsqu'il marque un nombre négatif. On aura en prenant les différences $my^{m-1} dy = dx$, & partant $PT \left(\frac{y dx}{dy} \right) = my^m = mx$ en mettant pour y^m sa valeur x .

Si $m = \frac{2}{3}$, l'équation sera $y^3 = axx$ qui exprime la nature d'une des paraboles cubiques, & la sous-tangente $PT = \frac{2}{3}x$. Si $m = -2$, l'équation sera $a^3 = xyy$ qui exprime la nature de l'une des hyperboles cubiques, & la sous-tangente $PT = -2x$. Il en est ainsi des autres.

Pour mener dans les paraboles la tangente au point A origine des x , il faut chercher quelle doit être la raison de dx à dy en ce point; car il est visible que cette raison étant connue, l'angle que la tangente fait avec l'axe où le diamètre sera aussi déterminé. On a dans cet exemple $dx : dy :: my^{m-1} : x$. D'où l'on voit que y étant zero en A, la raison de dy à dx doit y être infiniment grande lorsque m surpasse 1, & infiniment petite lorsqu'elle est moindre: c'est à dire que la tangente en A doit être parallèle aux appliquées dans le premier cas, & se confondre avec le diamètre dans le second.

EXEMPLE II.

12. SOIT une ligne courbe AMB telle que $AP \times PB$ Fig. 5.

$(x \times a - x) \cdot PM^2 (yy) :: AB (a) \cdot AD (b)$. Donc $\frac{xy}{b} = ax - xx$, & en prenant les différences, $\frac{xy dy}{b} = adx - 2xdx$, d'où l'on tire $PT \left(\frac{y dx}{dy} \right) = \frac{xy dy}{ab - bx} = \frac{2ax - 2xx}{a - 2x}$, en mettant pour $\frac{xy}{b}$ sa valeur $ax - xx$; & $PT = AP$ ou $AT = \frac{ax}{a - 2x}$.

Supposant à présent que $AP^3 \times PB^3 (x^3 \times a - x^3) \cdot PM^2 (y^2) :: AB (a) \cdot AD (b)$, on aura $\frac{xy^2}{b} = x^3 \times a - x^3$, & en prenant les différences $\frac{xy^2 dy}{b} = 3xx dx \times a - 3x^2 dx = 2adx + 2xdx \times x^2$, d'où l'on tire $\frac{y dx}{dy} = \frac{3x^3 \times a - x^3}{3xx \times a - 3x^2 - 2x \times x^2} = \frac{3x^3 \times a - x^3}{3a - 3x - 2x}$ ou $\frac{3ax - x^3}{3a - 5x}$ & $AT = \frac{3ax}{3a - 5x}$.

B iij

Et généralement si l'on veut que m marque l'exposant de la puissance de AP , & n celui de la puissance de PB , on aura $\frac{ay^{m+n}}{b} = x^m \times a - x^n$ qui est une équation générale pour toutes les ellipses à l'infini, dont la différence est

d'où l'on tire (en mettant pour $\frac{ay^{m+n}}{b}$ la valeur $x^m \times a - x^n$)

$$PT \left(\frac{ydx}{dy} \right) = \frac{m + nx^m \times a - x^n}{mx^{m-1} \times a - x^{n-1} \times x^m} = \frac{m + nx \times a - x}{ma - m - nx}$$

$$\text{ou } PT = \frac{m + n \times a - x}{ma - m - nx}, \text{ \& } AT = \frac{nax}{ma - m - nx}.$$

EXEMPLE III.

FIG. 6. 13. Les mêmes choses étant posées que dans l'exemple précédent, excepté que l'on suppose ici que le point B tombe de l'autre côté du point A par rapport au point P , on aura l'équation $\frac{ay^{m+n}}{b} = x^m \times a + x^n$ qui exprime la nature de toutes les hyperboles considérées par rapport à leurs diamètres. D'où l'on tirera comme ci-dessus $PT = \frac{m + n \times a + x}{ma + m + nx}$ & $AT = \frac{nax}{ma + m + nx}$.

Maintenant si l'on suppose que AP soit infiniment grande, la tangente TM ne rencontrera la courbe qu'à une distance infinie, c'est à dire qu'elle en deviendra l'asymptote CE ; & l'on aura en ce cas $AT \left(\frac{nax}{ma + m + nx} \right) = \frac{n}{m+n} a = AC$;

puisque a étant infiniment moindre que x , le terme ma sera nul par rapport à $m + nx$. Par la même raison en ce cas l'équation à la courbe deviendra $ay^{m+n} = bx^{m+n}$. Ainsi en faisant pour abréger $m+n=p$, & en extrayant de part & d'autre la racine p , on aura $y\sqrt[p]{a} = x\sqrt[p]{b}$, dont la différence est $dy\sqrt[p]{a} = dx\sqrt[p]{b}$: de sorte qu'en menant AE parallèle aux appliquées, & en concevant un petit triangle au point où l'asymptote CE rencontre la courbe, on formera cette proportion $dx \cdot dy$, ou $\sqrt[p]{a} \cdot \sqrt[p]{b} :: AC \cdot \left(\frac{p}{p} a \right)$. $AE = \frac{n}{p} \sqrt[p]{ba^{p-1}}$. Or les

valeurs de CA & AE étant ainsi déterminées, on mènera la droite indéfinie CE qui sera l'asymptote cherchée.

Si $m=1$ & $n=1$, la courbe sera l'hyperbole ordinaire, & on aura $AC = \frac{1}{2}a$, & $AE = \frac{1}{2}\sqrt{ab}$, c'est à dire à la moitié du diamètre conjugué, ce que l'on sçait d'ailleurs être conforme à la vérité.

EXEMPLE IV.

14. SOIT l'équation $y^3 - x^3 = axy$ ($AP = x$, $PM = y$, FIG. 6. a est une ligne droite donnée) & que cette équation exprime la nature de la courbe AM , la différence sera $3yydy - 3xxdx = axdy + aydx$. Donc $\frac{ydx}{dy} = \frac{y^3 - axy}{3xx + ay}$, & $AT \left(\frac{ydx}{dy} - x \right) = \frac{y^3 - 3x^3 - 3axy}{3xx + ay} = \frac{axy}{3xx + ay}$ en mettant pour $y^3 - 3x^3$ sa valeur $3axy$.

Maintenant si l'on suppose que AP & PM soient chacune infiniment grande, la tangente TM deviendra l'asymptote CE , & les droites AT , AS deviendront AC , AE qui déterminent la position de l'asymptote. Or AT que j'appelle $t = \frac{axy}{3xx + ay}$, d'où l'on tire $y = \frac{3txx}{ax - at} = \frac{3x}{a}$ lors que AT devient AC , parcequ'alors at est nulle par rapport à ax . Mettant donc cette valeur $\frac{3x}{a}$ à la place de y dans $y^3 - x^3 = axy$, on aura $27t^3x^3 - a^3x^3 = 3a^3txx$, d'où l'on tire (en effaçant le terme $3a^3txx$, parceque x étant infinie, il est nul par rapport aux deux autres $27t^3x^3$ & a^3x^3) $AC(t) = \frac{1}{3}a$. De même $AS \left(y - \frac{xy}{dx} \right)$ que j'appelle $s = \frac{axy}{3y - ax}$, d'où l'on tire $x = \frac{3ty}{ay + at} = \frac{3y}{a}$, parceque y étant infinie par rapport à s , le terme as sera nul par rapport au terme ay ; & en mettant cette valeur dans l'équation à la courbe, on trouvera $AE(t) = \frac{1}{3}a$. D'où il suit que si l'on prend les lignes AC , AE égales chacune à $\frac{1}{3}a$, & qu'on mene la droite indéfinie CE , elle sera l'asymptote de la courbe AM .

On se réglera sur ces deux derniers exemples pour trouver les asymptotes des autres lignes courbes.

PROPOSITION II.

Problème.

FIG. 7. 15. *Si l'on suppose dans la proposition précédente que les coupées AP soient des portions d'une ligne courbe dont l'on sçache mener les tangentes PT, & qu'il faille du point donné M sur la courbe AM mener la tangente MT.*

Ayant mené l'appliquée MP avec la tangente PT , & supposé que la droite MT qui la rencontre en T , soit la tangente cherchée; on imaginera une autre appliquée mp infiniment proche de la première, & une petite droite MR parallèle à PT : & en nommant les données AP, x ; PM, y ; on aura comme auparavant Pp ou $MR = dx$, $Rm = dy$, & les triangles semblables mRM & MPT donneront $mR(dy) \cdot RM(dx) :: MP(y) \cdot PT = \frac{ydx}{dy}$. On achevera ensuite le reste par le moyen de l'équation qui exprime la relation des coupées $AP(x)$ aux appliquées $PM(y)$, comme l'on a vu dans les exemples qui précédent, & comme l'on verra encore dans ceux qui suivent.

EXEMPLE I.

16. *SOIT* $\frac{yy}{x} = \frac{x\sqrt{aa+yy}}{a}$, dont la différence est $\frac{2xydy - y^2dx}{xx} = \frac{dx\sqrt{aa+yy}}{a} + \frac{xydy}{a\sqrt{aa+yy}}$: on aura en réduisant cette égalité à une proportion $dy \cdot dx(MP \cdot PT) :: \frac{\sqrt{aa+yy}}{a} + \frac{yy}{xx} \cdot \frac{xy}{xx} - \frac{xy}{a\sqrt{aa+yy}}$. Et partant le rapport de la donnée MP à la soutangente cherchée PT , sera exprimé en termes entièrement connus & délivrés des différences. Ce qui étoit proposé.

EXEM-

EXEMPLE II.

17. SOIT $x = \frac{ay}{b}$, dont la différence est $dx = \frac{ady}{b}$: on aura $PT(\frac{ydx}{dy}) = \frac{ay}{b} = x$. Si l'on suppose que la ligne courbe APB soit un demi-cercle, & que les appliquées MP , étant prolongées en Q , soient perpendiculaires sur le diamètre AB ; la courbe AMC sera une demi-roulette ou cycloïde: simple lorsque $b=a$, allongée lorsqu'elle est plus grande, & accourcie lorsqu'elle est moindre.

COROLLAIRE.

18. SI la roulette étant simple, l'on mene la corde AP ; je dis qu'elle sera parallèle à la tangente MT . Car le triangle MPT étant alors isoscele, l'angle externe TPQ sera double de l'interne opposé TMQ . Or l'angle APQ est égal à l'angle APT , puisque l'un & l'autre a pour mesure la moitié de l'arc AP ; & partant il est la moitié de l'angle TPQ . Les angles TMQ , APQ seront donc égaux entr'eux; & par conséquent les lignes MT , AP seront parallèles.

PROPOSITION III.

Problème.

19. SOIT une ligne courbe quelconque AP qui ait pour FIG. 7. diamètre la droite $KNAQ$, & dont l'on sçache mener les tangentes PK ; soit de plus une autre courbe AM telle que menant comme on voudra, l'appliquée MQ qui coupe la première courbe au point P , la relation de l'arc AP à l'appliquée MQ soit exprimée par une équation quelconque. Il faut d'un point donné M mener la tangente MN .

Ayant nommé les connues PK , t ; KQ , s ; l'arc AP , x ; MQ , y ; l'on aura (en concevant une autre appliquée mq infiniment proche de MQ , & en tirant PO , MS parallèles à AQ .) $Pp = dx$, $mS = dy$; & à cause des triangles semblables KPQ & PpO , mSM & MQN , l'on aura $PK(t)$.

C

$KQ(s) :: Pp(dx)$. PO ou $MS = \frac{dx}{r}$. Et $mS(dy)$.
 $SM(\frac{dx}{r}) :: MQ(y)$. $QN = \frac{ydx}{ay}$. Or par le moyen de
 la différence de l'équation donnée, on trouvera une valeur
 de dx en termes qui seront tous affectés par dy , & partant
 si l'on substitue cette valeur à la place de dx dans $\frac{ydx}{ay}$,
 les dy se détruiront, & la valeur de la sous-tangente cher-
 chée QN sera exprimée en termes tous connus. Ce qu'il
 falloit trouver.

PROPOSITION IV.

Problème.

FIG. 8. 20. SOIENT deux lignes courbes AQC , BCN qui
 aient pour diamètre la droite $TEABF$, & dont l'on sçache me-
 ner les tangentes QE , NF ; soit de plus une autre ligne courbe
 MC telle que la relation des appliquées MP , QP , NP , soit ex-
 primée par une équation quelconque. Il faut d'un point donné
 M sur cette dernière courbe lui mener la tangente MT .

• Art. 8. Ayant imaginé aux points Q , M , N , les petits triangles
 QOq , MRm , NSn , & nommé les connues PE , s ; PF , t ;
 PQ , x ; PM , y ; PN , z ; l'on aura $Oq = dx$, $Rm = dy$, Sn
 $= -dz$, * parceque x & y croissant, z diminue. Et à cause
 des triangles semblables QPE & qOQ , NPF & nSN ,
 MPT & mRM ; l'on aura $QP(x)$. $PE(s) :: qO(dx)$.
 OQ ou MR ou $SN = \frac{dx}{x}$. Et $NP(z)$. $PF(t) :: nS$
 $(-dz)$. $SN = \frac{-dx}{z} = \frac{dx}{x}$ (d'où l'on tire $dz = \frac{-zdx}{x}$).
 Et $mR(dy)$. $RM(\frac{dx}{x}) :: MP(y)$. $PT = \frac{ydx}{x dy}$. Or si l'on
 met dans la différence de l'équation donnée, à la place de
 dz , la valeur $\frac{-zdx}{x}$, on trouvera une valeur de dx en dy ,
 laquelle étant substituée dans $\frac{ydx}{x dy}$, les dy se détruiront,
 & la valeur de la sous-tangente PT sera exprimée en ter-
 mes tous connus.

EXEMPLE.

21. SOIT $yy = xz$, dont la différence est $zydy = xdz + xdz = \frac{yzdx - xzdx}{z}$, en mettant pour dz sa valeur négative $-\frac{xzdx}{xz}$, d'où l'on tire $dx = \frac{zydy}{yz - xz}$; & partant $PT\left(\frac{zydy}{x dz}\right) = \frac{zydy}{yz - xz} = \frac{zy}{z - x}$, en mettant pour yy sa valeur xz .

Soit maintenant l'équation générale $y^{m+n} = x^m z^n$, dont la différence est $m + ny^{m+n-1} dy = m z^n x^{m-1} dx + n x^m z^{n-1} dz = \frac{m z^n x^{m-1} dx - n x^m z^{n-1} dz}{z}$, en mettant pour dz sa valeur $-\frac{xzdx}{xz}$, d'où l'on tire $PT\left(\frac{zydy}{x dz}\right) = \frac{m z^n x^{m-1} + n x^m z^{n-1}}{m z^n x^{m-1} - n x^m z^{n-1}}$, en mettant pour y^{m+n} sa valeur $x^m z^n$.

On peut remarquer que si les courbes AQC , BCN venoient des lignes droites, la courbe MC seroit alors une des Sections coniques à l'infini; sçavoir une Ellipse lorsque l'appliquée CD , qui part du point de rencontre C , tombe entre les extrémités A , B ; une Hyperbole lorsqu'elle tombe de part ou d'autre; & enfin une Parabole lorsque l'une des extrémités A ou B est infiniment éloignée de l'autre, c'est à dire lorsque l'une des lignes droites CA ou CB est parallèle au diamètre AB .

PROPOSITION V.

Problème.

22. SOIT une ligne courbe APB qui ait un commencement FIG. 9. fixe & invariable au point A , & dont l'on sçache mener les tangentes PH ; soit hors de cette ligne un autre point fixe F , & une autre ligne courbe CMD telle qu'ayant mené la droite quelconque FMP , la relation de sa partie FM à la portion de courbe AP soit exprimée par telle équation qu'on voudra. On propose de mener du point donné M la tangente MT .

Ayant mené sur FP la perpendiculaire FH qui rencon-

C ij

tre la tangente donnée PH au point H , & la cherchée MT au point T , imaginé une droite $FRmOp$ qui fasse avec FP un angle infiniment petit, & décrit du centre F les petits arcs du cercle PO , MR ; le petit triangle pOP sera semblable au triangle rectangle PFH ; car les angles HPF ,

* Art. 2. HPF sont * égaux, puisqu'ils ne diffèrent entr'eux que de l'angle PFp que l'on suppose infiniment petit, & de plus l'angle pOP est droit, puisque la tangente en O (qui n'est autre chose que la continuation du petit arc PO considéré comme une droite (est perpendiculaire sur le rayon FO . Par la même raison les triangles mRM , MFT seront semblables. Or il est clair que les petits triangles ou secteurs FPO & FMR sont semblables. Si donc l'on nomme les connues PH, t ; HF, s ; FM, y ; FP, z ; & l'arc AP, x ; on aura $PH(t) \cdot HF(s) :: Pp(dx) \cdot PO = \frac{sdx}{t}$. Et $FP(z) \cdot FM(y) :: PO(\frac{sdx}{t}) \cdot MR = \frac{ydx}{tz}$. Et $mR(dy) \cdot RM(\frac{ydx}{tz}) :: FM(y) \cdot FT = \frac{yydx}{tzdy}$. Et on achevera le reste par le moyen de la différence de l'équation donnée.

EXEMPLE.

FIG. 10. 23. Si l'on veut que la courbe APB soit un cercle qui ait pour centre le point fixe F ; il est clair que la tangente PH devient parallèle & égale à la soutangente FH , à cause que HP sera aussi perpendiculaire à PF , & qu'ainsi l'on aura en ce cas $FT = \frac{yydx}{zdy} = \frac{yydx}{ady}$, en nommant la droite $FP(z)$, a ; parcequ'elle devient constante de variable qu'elle étoit auparavant. Cela posé, si l'on nomme la circonférence entière, ou une de ses portions déterminées, b ; & que l'on fasse $b \cdot x :: a \cdot y$, la courbe CMD , qui est en ce cas FMD , sera la Spirale d'*Archimede*, & l'on aura $y = \frac{ax}{b}$ qui a pour sa différence $dy = \frac{adx}{b}$, d'où l'on tire $ydx = \frac{bydy}{a} = xdy$ en mettant pour y sa valeur $\frac{ax}{b}$; & partant $FT(\frac{yydx}{ady}) = \frac{xy}{a}$. Ce qui donne cette construction.

Soit décrit du centre F & du rayon FM , l'arc de cercle MQ , terminé en Q par le rayon FQ qui joint les points fixes A, F ; soit pris FT égale à l'arc MQ : je dis que la droite MT sera tangente en M . Car à cause des secteurs semblables FPA, FMQ , l'on aura $FP(a).FM(y)::AP(x).MQ=\frac{yx}{a}=FT$.

Si l'on fait en général $b.x::a^m.y^m$, (l'exposant m désigne un nombre entier ou rompu tel que l'on veut) la courbe FMD sera une des spirales à l'infini, & l'on aura $y^m=\frac{a^m x}{b}$, qui a pour sa différence $my^{m-1}dy=\frac{a^m dx}{b}$, d'où l'on tire $ydx=\frac{mbymdy}{a^m} = mxdy$, en mettant pour y^m sa valeur $\frac{a^m x}{b}$; & partant $FT(\frac{ydx}{ady})=\frac{mxy}{a}=m \times MQ$.

PROPOSITION VI.

Problème.

24. SOIT une ligne courbe APB dont l'on sçache mener FIG. 11. les tangentes PH , & un point fixe F hors de cette ligne; soit une autre ligne courbe CMD telle que menant comme on voudra, la droite FPM , la relation de FP à FM soit exprimée par une équation quelconque. Il faut du point donné M mener la tangente MT .

Ayant mené la droite FHT perpendiculaire sur FM , & imaginé comme dans la proposition précédente les petits triangles POp, MRm semblables aux triangles HFP, TFM , on nommera les connues $FH, s; FP, x; FM, y$; & l'on aura $PF(x).FH(s)::pO(dx).OP=\frac{sdx}{x}$. Et $FP(x).FM(y)::OP(\frac{sdx}{x}).RM=\frac{sydx}{xx}$. Et $mR(dy).RM(\frac{sydx}{xx})::FM(y).FT=\frac{sydx}{xxdy}$. On achevera ensuite le reste par le moyen de la différence de l'équation donnée.

EXEMPLE.

25. Si l'on veut que la courbe APB soit une ligne droite PH , & que l'équation qui exprime la relation de FP à FM soit $y - x = a$, c'est à dire que PM soit toujours égale à la même droite donnée a ; l'on aura pour différence $dy = dx$; & partant $FT \left(\frac{yyy dx}{xx dy} \right) = \frac{yy}{xx}$. Ce qui donne cette construction.

Soit menée ME parallèle à PH , & MT parallèle à PE ; je dis qu'elle sera tangente en M .

Car $FP(x) \cdot FH(s) :: FM(y) \cdot FE = \frac{y}{x}$. Et $FP(x) \cdot FE \left(\frac{y}{x} \right) :: FM(y) \cdot FT = \frac{yy}{xx}$. Il est clair que la courbe CMD est la Conchoïde de *Nicomede*, dont l'asymptote est la droite PH , & le pole est le point fixe F .

PROPOSITION VII.

Problème.

FIG. 12. 26. SOIT une ligne courbe ARM dont l'on sçache mener les tangentes MH , & qui ait pour diamètre la droite $EPAHT$, soit hors de ce diamètre un point fixe F , d'où parte une ligne droite indéfinie $FPSM$ qui coupe le diamètre en P & la courbe en M . Si l'on conçoit maintenant que la droite FPM , en tournant autour du point F , fasse mouvoir le plan PAM toujours parallèlement à soi-même le long de la ligne droite ET immobile & indéfinie, en sorte que la distance PA demeure partout la même; il est clair que l'intersection continue de M des lignes FM , AM décrira dans ce mouvement une ligne courbe CMD . On propose de mener d'un point donné M sur cette courbe la tangente MT .

Ayant imaginé que le plan PAM soit parvenu dans la situation infiniment proche pam , & tiré la ligne mRS parallèle à AP ; il est clair par la génération que $Pp = Aa = Rm$; & partant que $RS = Sm - Pp$. Or nommant les connues FP ou Fp, x ; FM ou Fm, y ; PH, s ; MH, t ; &

la différence Pp , dx ; les triangles semblables Fpp & Fsm , MPH & MSR , MHT & MRm , donneront $Fp(x) \cdot Fm(y) :: Pp(dx) \cdot Sm = \frac{ydx}{x}$ (donc $SR = \frac{ydx - xdx}{x}$).

Et $PH(s) \cdot HM(t) :: SR \left(\frac{ydx - xdx}{x} \right) \cdot RM = \frac{ydx - txdx}{sx}$.

Et $MR \left(\frac{ydx - txdx}{sx} \right) \cdot Rm(dx) :: MH(t) \cdot HT = \frac{tx}{y-x}$.

Donc si l'on mène FE parallèle à MH , & qu'on prenne $HT = PE$, la ligne MT sera la tangente cherchée.

Si la ligne AM étoit une ligne droite; la courbe CMD seroit une Hyperbole qui auroit pour une de ses asymptotes la ligne ET . Et si elle étoit un cercle qui eût son centre au point P ; la courbe CMD seroit la Conchoïde de *Nicomede*, qui auroit pour asymptote la ligne ET , & pour pole le point F . Mais si elle étoit une parabole; la courbe CMD seroit la compagne de la Paraboloïde de *Descartes**, qui se décriroit en même temps au dessous de la droite ET par l'intersection de FP avec l'autre moitié de la Parabole. * Geom. Liv. 3.

PROPOSITION VIII.

Problème.

27. SOIT une ligne courbe AN qui ait pour diamètre la ligne droite AP , avec un point fixe F hors de ces lignes; soit une autre ligne courbe CMD telle que menans comme l'on voudra, la droite $FMPN$, la relation de ses parties FN , FP , FM soit exprimée par une équation quelconque. Il est question de tirer du point donné M la tangente MT . FIG. 11.

Soit menée par le point F la ligne HK perpendiculaire à FN , qui rencontre en K le diamètre AP , & en H la tangente donnée NH ; soient décrits du centre F & des intervalles FN , FP , FM des petits arcs de cercle NQ , PO , MR terminés par la droite Fn que l'on conçoit faire avec FN un angle infiniment petit. Cela posé.

Sil'on nomme les connues FK, s ; FH, t ; FP, x ; FM, y ; FN, z ; les triangles semblables PFK & pOP , FMR &

FPO & FNQ , HFN & NQn , mRM & MFT donneront $PF(x)$. $FK(z) :: pO(dx)$. $OP = \frac{rdx}{x}$. Et $FP(x)$. $FM(y) :: PO(\frac{rdx}{x})$. $MR(\frac{rdx}{xx})$. Et $FP(x)$. $FN(z) :: PO(\frac{rdx}{x})$. $NQ = \frac{rdx}{xx}$. Et $HF(t)$. $FN(z) :: NQ(\frac{rdx}{xx})$. $Qn(-dz) = \frac{rdx}{xx}$. Et $mR(dy)$. $RM(\frac{rdx}{xx}) :: FM(y)$. $FT = \frac{rdx}{xxdy}$. Or par le moyen de la différence de l'équation donnée on trouvera une valeur de dy en dx & dz , dans laquelle mettant à la place de dz sa valeur négative $-\frac{rdx}{xx}$, parceque x croissant, z diminue, tous les termes seront affectés par dx ; de sorte que cette valeur étant enfin substituée dans $\frac{rdx}{xxdy}$, les dx se détruiront. Et partant la valeur de FT sera exprimée en termes connus & déli-
vrés des différences.

Si l'on supposoit que la ligne droite AP fût une ligne courbe, & qu'on menât la tangente PK ; on trouveroit toujours pour FT la même valeur, & le raisonnement demeurerait le même.




EXEMPLE.

FIG. 14. 28. SUPPOSONS que la ligne courbe AN soit un cercle qui passe par le point F (tellement situé à l'égard du diamètre AP que la ligne FB perpendiculaire à ce diamètre passe par le centre G de ce cercle), & que PM soit toujours égale à PN ; il est clair que la courbe CMD , qui devient en ce cas FMA , sera la Cissoïde de Diocles, & que l'on aura pour équation $z + y = 2x$, dont la différence est $dy = 2dx - dz = \frac{2xxdx + 177dz}{1xx}$ en mettant pour

dz sa valeur $-\frac{2xxdx}{1xx}$ trouvée ci-dessus*. Et partant FT

* Art. 27. $(\frac{rdx}{xxdy}) = \frac{rdx}{2xx + 177x}$.

Si le point donné M tomboit sur le point A , les lignes FM , FN , FP seroient égales chacune à FA , comme aussi les



Gravé par Berrey



3
~~~~~

les droites  $FK$ ,  $FH$ ; & partant on auroit en ce cas  $FT = \frac{x^2}{2a} = \frac{1}{2}x$ , c'est à dire que si l'on prend  $FT = \frac{1}{2}AF$ , & qu'on mene la ligne  $AT$ , elle sera tangente en  $A$ .

On peut encore trouver les tangentes de la Cissoïde par le moyen de la premiere Proposition, en menant les perpendiculaires  $NE$ ,  $ML$  sur le diametre  $FB$ , & cherchant l'équation qui exprime le rapport de la coupée  $FL$  à l'appliquée  $LM$ ; ce qui se fait ainsi. Ayant nommé les connues  $FB$ ,  $2a$ ;  $FL$  ou  $BE$ ,  $x$ ;  $LM$ ,  $y$ ; les triangles semblables  $FEN$ ,  $FLM$ , & la propriété du cercle donneront  $FL(x) \cdot LM(y) :: FE \cdot EN :: EN(\sqrt{2ax - xx})$ .

$EB(x)$ . D'où l'on tire  $yy = \frac{x^2}{2a - x}$ , dont la difference est  $2ydy = \frac{6axdx - 2x^2dx}{2a - x^2}$ . Et partant  $LO^*(\frac{ydx}{dy}) = \frac{yy \times 2a - x^2}{3axx - x^2} \cdot \text{Art. 9.}$   
 $= \frac{2ax - xx}{3a - x}$ , en mettant pour  $yy$  sa valeur  $\frac{x^2}{2a - x}$ .

## PROPOSITION IX.

## Problème.

29. SOIENT deux lignes courbes  $ANB$ ,  $CPD$ , & une ligne droite  $FKT$ , sur lesquelles soient marqués des points fixes  $A$ ,  $C$ ,  $F$ ; soit de plus une autre ligne courbe  $EMG$  telle qu'ayant mené par un de ses points quelconques  $M$  la droite  $FMN$ , &  $MP$  parallele à  $FK$ , la relation de l'arc  $AN$  à l'arc  $CP$  soit exprimée par une équation quelconque. Il faut d'un point donné  $M$  sur la courbe  $EG$  mener la tangente  $MT$ . FIG. 15.

Ayant mené par le point cherché  $T$  la ligne  $TH$  parallele à  $FM$ , & par le point donné  $M$  les droites  $MRK$ ,  $MOH$  paralleles aux tangentes en  $P$  & en  $N$ , on tirera  $Fm$  On infiniment proche de  $FMN$  &  $mRp$  parallele à  $MP$ .

Cela posé, si l'on nomme les connues  $FM$ ,  $s$ ;  $FN$ ,  $t$ ;  $MK$ ,  $x$ ;  $CP$ ,  $x$ ;  $AN$ ,  $y$ . (donc  $Pp$  ou  $MR = dx$ ,  $Nn = dy$ ) les triangles semblables  $FNn$  &  $FMO$ ,  $MOm$  &  $MHT$ ,  $MRm$  &  $MKT$  donneront  $FN(t) \cdot FM(s) :: Nn(dy) \cdot MO = \frac{t^2}{s}$ .

D

Et  $MR(dx)$ .  $MO \left( \frac{udy}{x} \right) :: MK(u)$ .  $MH = \frac{udy}{idx}$ . Or par le moyen de la différence de l'équation donnée l'on aura une valeur de  $dy$  en termes qui seront tous affectés par  $dx$ , laquelle étant substituée dans  $\frac{udy}{idx}$ , les  $dx$  se détruiront; & partant la valeur de  $MH$  sera exprimée en termes entièrement connus. Ce qui donne cette construction.

Soit mené  $MH$  parallèle à la touchante en  $N$  & égale à la valeur que l'on vient de trouver : soit tirée  $HT$  parallèle à  $FM$ , qui rencontre en  $T$  la droite  $FK$ , par où & par le point donné  $M$  soit menée la tangente cherchée  $MT$ .

## E X E M P L E.

FIG. 16. 30. Si l'on veut que la courbe  $ANB$  soit un quart de cercle qui ait pour centre le point fixe  $F$ , que la courbe  $CPD$  soit le rayon  $APF$  perpendiculaire sur la droite  $FKGQTB$ , & que l'arc  $AN(y)$  soit toujours à la droite  $AP(x)$  comme le quart de cercle  $ANB(b)$  au rayon  $AF(a)$ ; la courbe  $EMG$  deviendra la Quadratrice  $AMG$  de Dinostrata, & l'on aura  $MH \left( \frac{udy}{idx} \right) = \frac{a dy - x dy}{a dx}$ , puisque  $FP$  ou  $MK(u) = a - x$ , &  $FN(r) = a$ . Mais l'analogie supposée donne  $ay = bx$ , &  $ady = bdx$ . Mettant donc dans la valeur de  $MH$  à la place de  $x$  & de  $dy$  leurs valeurs  $\frac{ay}{b}$  &  $\frac{b dx}{a}$ , on trouvera  $MH = \frac{b^2 - y^2}{a}$ . Ce qui donne cette construction.

Soit menée  $MH$  perpendiculaire sur  $FM$ , & égale à l'arc  $MQ$  décrit du centre  $F$ , & soit tirée  $HT$  parallèle à  $FM$ ; je dis que la ligne  $MT$  sera tangente en  $M$ . Car à cause des secteurs semblables  $FNB$ ,  $FMQ$ , l'on aura  $FN(u)$ .  $FM(s) :: NB(b - y)$ .  $MQ = \frac{b^2 - y^2}{a}$ .

## C O R O L L A I R E.

FIG. 17. 31. Si l'on veut déterminer le point  $G$  où la quadratrice  $AMG$  rencontre le rayon  $FB$ , on imaginera un autre rayon  $Fgb$  infiniment proche de  $FGB$ ; & en menant  $gf$  parallèle à  $FB$ , la propriété de la quadratrice

& les triangles semblables  $F B b, g f F$ , rectangles en  $B$  & en  $f$ , donneront  $AB. AF :: Bb. Ff :: FB$  ou  $At$   $gf$  ou  $FG$ . D'où l'on voit que si l'on prend une troisième proportionnelle au quart de cercle  $AB$  & au rayon  $AF$ , elle sera égale à  $FG$ , c'est à dire que  $FG = \frac{a}{b}$ . Ce qui donne lieu lieu d'abréger la construction des tangentes.

Car menant  $TE$  parallèle à  $MH$ , les triangles semblables  $FMK, FTE$  donneront  $MK (a - x). MF(s) :: ET$  ou  $MH (\frac{b_1 - x}{a})$ .  $FT = \frac{b_1 - y_1}{a - x} = \frac{b_1}{a}$ . en mettant pour  $x$  sa valeur  $\frac{a^2}{b}$ , & divisant ensuite le tout par  $b - y$ ; d'où il est clair que la ligne  $FT$  est troisième proportionnelle à  $FG$  & à  $FM$ . FIG. 16.

## PROPOSITION X.

## Problème.

32. SOIT une ligne courbe  $AMB$  telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconques  $M$  aux foyers  $F, G, H$ , &c. les droites  $MF, MG, MH$ , &c. leur relation soit exprimée par une équation quelconque : & soit proposé de mener du point donné  $M$  la perpendiculaire  $MP$  sur la tangente en ce point. FIG. 18.

Ayant pris sur la courbe  $AB$  l'arc  $Mm$  infiniment petit, & mené les droites  $F R m, G m S, H m O$ , on décrira des centres  $F, G, H$  les petits arcs de cercles  $MR, MS, MO$ ; ensuite du centre  $M$  & d'un intervalle quelconque on décrira de même le cercle  $CDE$  qui coupe les lignes  $MF, MG, MH$  aux points  $C, D, E$ , d'où l'on abaissera sur  $MP$  les perpendiculaires  $CL, DK, EI$ . Cette préparation étant faite, je remarque

1<sup>o</sup>. Que les triangles rectangles  $MRm, MLC$  sont semblables; car en ôtant des angles droits  $LMm, RMC$  l'angle commun  $LMR$ , les restes  $RMm, LMC$  seront égaux, & de plus ils sont rectangles en  $R$  &  $L$ . On prouvera de même que les triangles rectangles  $MSm$  &  $MKD, MOm$  &  $MIE$  sont semblables. Partant, puisque l'hypothénuse  $Mm$  est commune aux petits triangles  $MRm, MSm, MOm$ , & que les

hypothénuses  $MC$ ,  $MD$ ,  $ME$  des triangles  $MLC$ ,  $MKD$ ,  $MIE$  sont égales entr'elles; il s'ensuit que les perpendiculaires  $CL$ ,  $DK$ ,  $EI$  ont le même rapport entr'elles que les différences  $Rm$ ,  $Sm$ ,  $Om$ .

20. Que les lignes, qui partent des foyers situés du même côté de la perpendiculaire  $MP$ , croissent pendant que les autres diminuent, ou au contraire. Comme dans la figure 18.  $FM$  croît de sa différence  $Rm$ , pendant que les autres  $GM$ ,  $HM$  diminuent des leurs  $Sm$ ,  $Om$ .

Si l'on suppose à présent, pour fixer les idées, que l'équation qui exprime la relation des droites  $FM(x)$ ,  $GM(y)$ ,  $HM(z)$ , soit  $ax + xy - z^2 = 0$ , dont la différence est  $adx + ydx + xdy - 2zdz = 0$ ; Il est évident que la tangente en  $M$  (qui n'est autre chose que la continuation du petit côté  $Mm$  du polygone que l'on conçoit \* composer la courbe  $AMB$ ) doit être tellement placée qu'en menant d'un de ses points quelconques  $m$  des parallèles  $mR$ ,  $mS$ ,  $mO$  aux droites  $FM$ ,  $GM$ ,  $HM$ , terminées en  $R$ ,  $S$ ,  $O$  par des perpendiculaires  $MR$ ,  $MS$ ,  $MO$  à ces mêmes droites, on ait toujours l'équation  $a + y \times Rm + x \times Sm - 2z \times Om = 0$ ; ou (ce qui revient au même, en mettant à la place de  $Rm$ ,  $Sm$ ,  $Om$  leurs proportionnelles  $CL$ ,  $DK$ ,  $EI$ ) que la perpendiculaire  $MP$  à la courbe doit être placée en sorte que  $a + y \times CL + x \times DK - 2z \times EI = 0$ . Ce qui donne cette construction.

Fig. 18, 19. Que l'on conçoive que le point  $C$  soit chargé du poids  $a + y$  qui multiplie la différence  $dx$  de la droite  $FM$  sur laquelle il est situé, & de même le point  $D$  du poids  $x$ , & le point  $E$  pris de l'autre côté de  $M$  par rapport au foyer  $H$  (parceque le terme  $- 2zdz$  est négatif) du poids  $2z$ . Je dis que la droite  $MP$  qui passe par le commun centre de pesanteur des poids supposez en  $C$ ,  $D$ ,  $E$ , sera la perpendiculaire requise. Car il est clair par les principes de la Mécanique, que toute ligne droite, qui passe par le centre de pesanteur de plusieurs poids, les sépare en sorte que les poids d'une part multipliés chacun par sa distance de cette droite, sont précisément égaux aux poids

de l'autre part multipliés aussi chacun par sa distance de cette même droite. Donc posant le cas que  $x$  croissant,  $y$  &  $z$  croissent aussi, c'est à dire que les foyers  $F, G, H$  tombent du même côté de  $MP$ , comme l'on suppose toujours en prenant la différence de l'équation donnée selon les règles prescrites; il s'ensuit que la ligne  $MP$  laissera d'une part les poids en  $C$  &  $D$ , & de l'autre le poids en  $E$ , & qu'ainsi l'on aura  $\overline{a+y} \times CL + x \times DK - 2x \times EI = 0$ , qui étoit l'équation à construire. Fig. 19.

Or je dis maintenant que puisque la construction est bonne dans ce cas, elle le sera aussi dans tous les autres; car supposant par exemple que le point  $M$  change de situation dans la courbe en sorte que  $x$  croissant,  $y$  &  $z$  diminuent, c'est à dire que les foyers  $G, H$  passent de l'autre côté de  $MP$ , il s'ensuit 1°. \* Qu'il faut changer dans la différence de l'équation donnée les signes des termes affectés par  $dy, dx$ , ou par leurs proportionnelles  $DK, EI$ ; de sorte que l'équation à construire sera dans ce nouveau cas  $\overline{a+y} \times CL - x \times DK + 2x \times EI = 0$ . 2°. Que les poids en  $D$  &  $E$  changeront de côté par rapport à  $MP$ , & qu'ainsi l'on aura par la propriété du centre de pesanteur  $\overline{a+y} \times CL - x \times DK + 2x \times EI = 0$ , qui est l'équation à construire. Et comme cela arrive toujours dans tous les cas possibles, il s'ensuit, &c. Fig. 18. \* Art. 82

Il est évident que le même raisonnement subsistera toujours tel que soit le nombre des foyers, & telle que puisse être l'équation donnée, de sorte que l'on peut énoncer ainsi la construction générale.

Soit prise la différence de l'équation donnée dont je suppose que l'un des membres soit zero, & soit décrit à discrétion du centre  $M$  un cercle  $CDE$  qui coupe les droites  $ME, MG, MH$  aux points  $C, D, E$ , dans lesquels soient conçus des poids qui aient entr'eux le même rapport que les quantités qui multiplient les différences des lignes sur lesquelles ils sont situés. Je dis que la ligne  $MP$  qui passe par leur commun centre de pesanteur, sera la perpendiculaire requise. Il est à remarquer que si l'un des

poids est négatif dans la différence de l'équation donnée, il le faut concevoir de l'autre côté du point  $M$  par rapport au foyer.

Si l'on veut que les foyers  $F, G, H$  soient des lignes droites ou courbes sur qui les droites  $MF, MG, MH$  tombent à angles droits, la même construction aura toujours lieu. Car menant du point  $m$  pris infiniment près de  $M$  les perpendiculaires  $mf, mg, mh$  sur les foyers, & du point  $M$  les petites perpendiculaires  $MR, MS, MO$  sur ces lignes; il est clair que  $Rm$  sera la différence de  $MF$ , puisque les droites  $MF, Rf$  étant perpendiculaires entre les parallèles  $Ff, MR$ , elles seront égales, & de même que  $Sm$  est la différence de  $MG$ , &  $Om$  celle de  $MH$ ; & on prouvera ensuite tout le reste comme ci-dessus.

On peut encore concevoir que les foyers  $F, G, H$  soient tous ou en partie des lignes courbes qui aient des commencemens fixes & invariables aux points  $F, G, H$ , & que la ligne courbe  $AMB$  soit telle qu'ayant mené par exemple d'un de ses points quelconques  $M$  les tangentes  $MV, MX$  & la droite  $MG$ ; la relation des lignes mixtilignes  $FVM, HXM$  & de la droite  $GM$  soit exprimée par une équation quelconque. Car ayant mené du point  $m$  pris infiniment près de  $M$  la tangente  $ma$ , il est clair qu'elle rencontrera l'autre tangente au point  $V$  (puisque'elle n'est que la continuation du petit arc  $Vn$  considéré comme une petite droite), & partant que si l'on décrit du centre  $V$  le petit arc de cercle  $MR$ ;  $Rm$  sera la différence de la ligne mixtiligne  $FVM$  qui devient  $FVaRm$ . Et tout le reste se démontrera comme ci-devant.

*M. Tschirnhaus a donné la première idée de ce Problème dans son Livre de la Médecine de l'esprit; M. Fatio en a trouvé en-faite une solution très ingénieuse qu'il a fait insérer dans les Journaux d'Hollande: mais la manière dont ils l'ont conçu, n'est qu'un cas particulier de la construction générale que je viens de donner.*

## EXEMPLE I.

33. SOIT  $axx + byy + czz - f = 0$  (les droites  $a, b, c, f$  sont données) dont la différence est  $axdx + bydy + czdz = 0$ . C'est pourquoi concevant en  $C$  le poids  $ax$ , en  $D$  le poids  $by$ , & en  $E$  le poids  $c\kappa$ , c'est à dire des poids qui soient entr'eux comme ces rectangles, la ligne  $MP$  qui passe par leur commun centre de pesanteur, sera perpendiculaire à la courbe au point  $M$ . FIG. 11.

Mais si l'on mene  $FO$  parallèle à  $CL$ , & que l'on prenne le rayon  $MC$  pour l'unité, les triangles semblables  $MCL, MFO$  donneront  $FO = x \times CL$ ; & de même menant  $GR$  parallèle à  $DK$ , &  $HS$  parallèle à  $EL$ , on trouvera que  $GR = y \times DK$  &  $HS = \kappa \times EL$ : de sorte qu'en imaginant aux foyers  $F, G, H$  les poids  $a, b, c$ ; la ligne  $MP$ , qui passe par le centre de pesanteur des poids  $ax, by, c\kappa$  supposés en  $C, D, E$ , passera aussi par le centre de pesanteur de ces nouveaux poids. Or ce centre est un point fixe, puisque les poids en  $F, G, H$ , savoir  $a, b, c$ , sont des droites constantes qui demeurent toujours les mêmes en quelque endroit que se trouve le point  $M$ . D'où il suit que la courbe  $AMB$  doit être telle que toutes ses perpendiculaires se coupent dans le même point, c'est à dire qu'elle sera un cercle qui aura pour centre ce point. Voici donc une propriété très remarquable du cercle que l'on peut énoncer ainsi.

S'il y a sur un même plan autant de poids  $a, b, c$ , &c. que l'on voudra, situés en  $F, G, H$ , &c. & que l'on décrive de leur commun centre de pesanteur un cercle  $AMB$ ; je dis qu'ayant mené d'un de ses points quelconques  $M$ , les droites  $MF, MG, MH$ , &c. la somme de leurs quarrés multipliés chacun par le poids qui lui répond, sera toujours égale à une même quantité.

## EXEMPLE II.

34. SOIT la courbe  $AMB$  telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconques  $M$  au foyer  $F$  qui est un point FIG. 12.

fixe la droite  $MF$ , & au foyer  $G$  qui est une ligne droite la perpendiculaire  $MG$ ; le rapport de  $MF$  à  $MG$  soit toujours le même que de la donnée  $a$  à la donnée  $b$ .

Ayant nomme  $FM, x$ ;  $MG, y$ ; on aura  $x.y :: a.b$ , & partant  $ay = bx$  dont la différence est  $ady - bdx = 0$ . C'est pourquoi concevant en  $C$  pris au delà de  $M$  par rapport à  $F$  le poids  $b$ , & en  $D$  (à pareille distance de  $M$ ) le poids  $a$ , & menant par leur centre commun de pesant. leur la ligne  $MP$ ; elle sera la perpendiculaire requise.




Il est clair par le principe de la balance, que si l'on divise la corde  $CD$  au point  $P$  en sorte que  $CP.DP :: a.b$ ; le point  $P$  sera le centre commun de pesant. des poids supposés en  $C$  &  $D$ .

La courbe  $AMB$  est une section conique, sçavoir une Parabole lorsque  $a=b$ , une Hyperbole lorsque  $a$  surpasse  $b$ , & enfin une Ellipse lorsqu'il est moindre.

#### EXEMPLE III.

FIG. 14. 35. Si après avoir attaché les extrémités d'un fil  $FZVMGMXTH$  en  $F$  & en  $H$ , & avoir fiche une petite pointe en  $G$ , on fait rendre également ce fil par le moyen d'un stile placé en  $M$ , en sorte que les parties  $FZV, HX$  soient roulées autour des courbes qui ont leur origine en  $F$  &  $H$ , que la partie  $MG$  soit double, c'est à dire qu'elle soit repliée en  $G$ , & que les choses demeurant en cet état l'on fasse mouvoir le stile  $M$ ; il est clair qu'il décrira une courbe  $AMB$ . Il est question de mener d'un point donné  $M$  sur cette courbe la perpendiculaire  $MP$ , la position du fil qui sert à la décrire étant donnée en ce point.

Je remarque que les parties droites  $MP, MX$  du fil sont toujours tangentes en  $V$  &  $X$ , & que si l'on nomme les lignes mixtilignes  $FZVM, x$ ;  $HXMX, z$ ; la droite  $MG, y$ ; & une ligne droite prise égale à la longueur du fil,  $a$ ; l'on aura toujours  $x + zy + z = a$ : d'où je connois que la courbe  $AMB$  est comprise dans la construction générale. C'est pourquoi prenant la différence  $dx + zdy + dz = 0$ , & concevant en  $C$  le poids  $1$ , en  $D$  le poids  $z$ , & en  $E$  le poids



Gravé par Bergé



DES INFINIMENT PETITS. I. Part. 33  
 poids  $x$ ; je dis que la ligne  $MP$ , qui passe par le centre commun de pesanteur de ces poids, sera la perpendiculaire requise.

# PROPOSITION XI.

## Problème.

36. SOIENT deux lignes quelconques  $APB$ ,  $EQF$  dont l'on sçache mener les tangentes  $PG$ ,  $QH$ ; & soit une ligne droite  $PQ$  sur laquelle soit marqué un point  $M$ . Si l'on conçoit que les extrémités  $P$ ,  $Q$  de cette droite glissent le long des lignes  $AB$ ,  $EF$ , il est clair que le point  $M$  décrira dans ce mouvement une ligne courbe  $CD$ . Il est question de mener d'un point donné  $M$  sur cette courbe la tangente  $MT$ .

FIG. 25.

Ayant imaginé que la droite mobile  $PMQ$  soit parvenue dans la situation infiniment proche  $pmq$ , on tirera les petites droites  $PO$ ,  $MR$ ,  $QS$  perpendiculaires sur  $PQ$ , ce qui formera les petits angles rectangles  $POp$ ,  $mRM$ ,  $qSq$ ; & ayant pris  $PK$  égale à  $MQ$ , on mènera la droite  $HKG$  perpendiculaire sur  $PQ$ , & l'on prolongera  $OP$  en  $T$ , où je suppose qu'elle rencontre la tangente cherchée  $MT$ . Cela posé, il est clair que les petites droites  $Op$ ,  $Rm$ ,  $Sq$  seront égales entr'elles, puisque par la construction  $PM$  &  $MQ$  sont par tout les mêmes.

Ayant nommé les connues  $PM$  ou  $KQ$ ,  $a$ ;  $MQ$  ou  $PK$ ,  $b$ ;  $KG$ ,  $f$ ;  $KH$ ,  $g$ ; & la petite droite  $Op$  ou  $Rm$  ou  $Sq$ ,  $dy$ ; les triangles semblables  $PKG$  &  $pOP$ ,  $QKH$  &  $qSQ$  donneront  $PK(b) \cdot KG(f) :: pO(dy) \cdot OP = \frac{f dy}{b}$ . Et  $QK(a) \cdot KH(g) :: qS(dy) \cdot SQ = \frac{g dy}{a}$ . Or l'on sçait par la Geometrie commune que  $MR = \frac{OP \times MR + QS \times PM}{PQ} = \frac{f dy + g dy}{a + b}$ . Ainsi les triangles semblables  $mRM$ ,  $MPT$  donneront  $mR(dy) \cdot RM(\frac{f dy + g dy}{a + b}) :: MP(a) \cdot PT = \frac{af + ag}{a + b}$ . Ce qu'il falloit trouver.

E

## PROPOSITION XII.

## Problème.

FIG. 16. 37. SOIENT deux lignes quelconques BN, FQ qui aient pour axes les droites BC, ED qui s'entre-coupent à angles droits au point A; & soit une ligne courbe LM telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconques M les droites MGQ, MPN parallèle à AB, AE; la relation des espaces EGQF, (le point E est un point fixe donné sur la droite AE, & la ligne EF est parallèle à AC) APND, & les droites AP, PM, PN, GQ, soit exprimée par une équation quelconque. Il est question de mener d'un point donné M sur la courbe LM, la tangente MT.

Ayant nommé les données & variables AP ou GM,  $x$ ; PM ou AG,  $y$ ; PN,  $u$ ; GQ,  $z$ ; l'espace EGQF,  $s$ ; l'espace APND,  $t$ ; & les sous-tangentes données PH,  $a$ ; GK,  $b$ ; l'on aura Pp ou NS ou MR =  $dx$ , Gg ou Rm ou OQ =  $-dy$ ;  $Sn = -du = -\frac{u dx}{a}$  à cause des triangles semblables HPN;  $NSn$ ; Oq =  $dz = -\frac{z dy}{b}$ ,  $NPpn = dt = u dx$ , & QGgq =  $ds = -z dy$ ; où l'on doit observer que les valeurs de Rm & Sn sont négatives, parceque AP ( $x$ ) croissant, PM ( $y$ ) & PN ( $u$ ) diminuent. Cela posé, on prendra la différence de l'équation donnée, dans laquelle on mettra à la place de  $dt$ ,  $ds$ ,  $du$ ,  $dz$  leurs valeurs  $u dx$ ,  $-z dy$ ,  $-\frac{u dx}{a}$ ,  $-\frac{z dy}{b}$ ; ce qui donnera une nouvelle équation qui exprimera le rapport cherché de  $dy$  à  $dx$ , ou de MP à PT.

## EXEMPLE I.

38. SOIT  $s + zx = t + ux$ , on aura en prenant les différences  $ds + z dx = dt + u dx + x du$ , & mettant à la place de  $ds$ ,  $dt$ ,  $dz$ ,  $du$  leurs valeurs, on trouvera  $-z dy - \frac{z dx}{b} = u dx - \frac{u dx}{a}$ , d'où l'on tire  $PT \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{a y z z + a^2 b z}{b u x - a b a}$ .

## EXEMPLE II.

39. SOIT  $s = t$ , donc  $ds = dt$ , c'est à dire —  $xdy = ydx$ ; & partant  $PT \left( \frac{ydx}{dy} \right) = -\frac{y^2}{u}$ . Or comme cette quantité est négative, il s'ensuit\* que l'on doit prendre \* Art. 10. le point  $T$  du côté opposé au point  $A$  origine des  $x$ . Si l'on suppose que la ligne  $FQ$  soit une hyperbole qui ait pour asymptotes les droites  $AC, AE$ , en sorte que  $GQ \left( \frac{x}{y} \right) = \frac{e}{y}$ , & que la ligne  $BND$  soit une droite parallèle à  $AB$ , de manière que  $PN(u)$  soit par tout égale à la droite donnée  $c$ ; il est clair que la courbe  $LM$  a pour asymptote la droite  $AB$ , & que sa soutangente  $PT \left( -\frac{y^2}{u} \right) = -c$ : c'est à dire qu'elle demeure par tout la même.

La courbe  $LM$  est appelée dans ce cas *Logarithmique*.

## PROPOSITION XIII.

## Problème.

26. SOIENT deux lignes quelconques  $BN, FQ$  qui aient FIG. 27. pour axe la même droite  $BA$ , sur laquelle soient marqués deux points fixes  $A, E$ ; soit une troisième ligne courbe  $LM$  telle qu'ayant mené par un de ses points quelconques  $M$  la droite  $AN$ , décrit du centre  $A$  l'arc de cercle  $MG$ , & tiré  $GQ$  parallèle à  $EF$  perpendiculaire sur  $AB$ ; la relation des espaces  $EGQF(s)$ ,  $ANB(t)$ , & des droites  $AM$  ou  $AG(y)$ ,  $AN(z)$ ,  $GQ(u)$ , soit exprimée par une équation quelconque. Il faut mener d'un point donné  $M$  sur la courbe  $LM$  la tangente  $MT$ .

Après avoir mené la droite  $ATH$  perpendiculaire sur  $AMN$ , soit imaginé une autre droite  $Amn$  infiniment proche de  $AMN$ , un autre arc  $mg$ , une autre perpendiculaire  $gg$ , & décrit du centre  $A$  le petit arc  $NS$ : on nommera les soutangentes données  $AH, a$ ;  $GK, b$ ; & on aura  $Rm$  ou  $Gg = dy$ ,  $Sn = dx$ ; les triangles semblables  $HAN$  &  $NSn, KGQ$

E ij

&  $QOq$ , donneront aussi  $SN = \frac{u^2}{z}$ ,  $Oq = -du = \frac{u^2}{z}$ ,  
 $GQq = -ds = udy$ ,  $ANn$  ou  $AN \times \frac{1}{z} NS = -dt = \frac{1}{z} adx$ . On mettra toutes ces valeurs dans la différence de l'équation donnée, & l'on en formera une nouvelle, d'où l'on tirera une valeur de  $dz$  en  $dy$ . Or à cause des sécateurs & des triangles semblables  $AN$  &  $AMR$ ,  $mRM$  &  $MAT$ , on trouve  $AN(z) : AM(y) :: NS(\frac{adx}{z}) . MR = \frac{aydz}{zx}$ .

Et  $mR(dy) . RM(\frac{aydz}{zx}) :: AM(y) . AT = \frac{ayydz}{zx dy}$ . Si donc l'on met dans cette formule à la place de  $dz$  la valeur en  $dy$ , les différences se détruiront, & la valeur de la soutangente cherchée  $AT$  sera exprimée en termes entièrement connus. Ce qu'il falloit trouver.

## EXEMPLE I.

41. SOIT  $ny - s = zz - t$ , dont la différence est  $udy + ydu - ds = 2zdz - dt$ , ce qui donne (après la substitution faite)  $dz = \frac{4budy - 2udy}{4bz + ab}$ ; & en mettant cette valeur dans  $\frac{ayydz}{zx dy}$ , on trouve  $AT = \frac{4abyy - 2ayy^2}{4bz + abz}$ .

## EXEMPLE II.

42. SOIT  $s = zt$ , donc  $ds = zdt$ , c'est à dire  $-udy = -adx$ , ou  $dz = \frac{udy}{a}$ ; & partant  $AT(\frac{ayydz}{zx dy}) = \frac{yyy}{zx}$ .

Si la ligne  $BN$  est un cercle qui ait pour centre le point  $A$ , & pour rayon la droite  $AB = AN = c$ , & que  $FQ$  soit une hyperbole telle que  $GQ(u) = \frac{cf}{u}$ ; il est clair que la courbe  $LM$  fait une infinité de retours au tour du centre  $A$  avant que d'y parvenir (puisque l'espace  $FEGQ$  devient infini lorsque le point  $G$  tombe en  $A$ ), & que  $AT = \frac{yyy}{zx}$ . D'où l'on voit que la raison de  $AM$  à  $AT$  est constante; & partant que l'angle  $AMT$  est par tout le même.

La courbe  $LM$  est appelée en ce cas *Logarithmique spirale*.

## PROPOSITION XIV.

## Problème.

43. SOIENT sur un même plan deux courbes quelconques FIG. 18. AMD, BMC qui se touchent en un point M, & soit sur le plan de la courbe BMC un point fixe L. Si l'on conçoit à présent que la courbe BMC roule sur la courbe AMD en s'y appliquant continuellement en sorte que les parties révolues AM, BM soient toujours égales entr'elles; il est visible que le plan BMC emportant le point L, ce point décrira dans ce mouvement une espèce de roulette ILK. Cela posé, je dis que si l'on mène dans chaque différente position de la courbe BMC (du point décrivant L au point touchant M) la droite LM; elle sera perpendiculaire à la courbe ILK.

Car imaginant sur les deux courbes AMD, BMC deux parties Mm, Mm égales entr'elles & infiniment petites, on les pourra considérer \* comme deux petites droites qui font \* Art. 3. au point M un angle infiniment petit. Or afin que le petit côté Mm de la courbe ou polygone BMC tombe sur le petit côté Mm du polygone AMD, il faut que le point L décrive autour du point touchant M comme centre un petit arc Ll. Il est donc évident que ce petit arc fera partie de la courbe ILK; & par conséquent que la droite ML, qui lui est perpendiculaire, sera aussi perpendiculaire sur la courbe ILK au point L. Ce qu'il falloit prouver.

## PROPOSITION XV.

## Problème.

44. SOIT un angle rétiligne quelconque MLN, dont les FIG. 29. côtés LM, LN touchent deux courbes quelconques AM, BN. Si l'on fait glisser ces côtés autour de ces courbes, en sorte qu'ils les touchent continuellement; il est clair que le sommet L décrira dans ce mouvement une courbe ILK. Il est question de mener une perpendiculaire LC sur cette courbe, la position de l'angle MLN étant donnée.

Soit décrit un cercle qui passe par le sommet  $L$ , & par les points touchans  $M, N$ ; soit menée par le centre  $C$  de ce cercle la droite  $CL$ : je dis qu'elle sera perpendiculaire à la courbe  $ILK$ .

Car considérant les courbes  $AM, BN$  comme des polygones d'une infinité de côtés tels que  $Mm, Nn$ ; il est évident que si l'on fait glisser les côtés  $LM, LN$ , de l'angle rectiligne  $MLN$ , qu'on suppose demeurer toujours le même, autour des points fixes  $M, N$ , (on considère les tangentes  $LM, LN$  comme la continuation des petits côtés  $Mf, Ng$ ) jusqu'à ce que le côté  $LM$  de l'angle tombe sur le petit côté  $Mm$  du polygone  $AM$ , & l'autre côté  $LN$  sur le petit côté  $Nn$  du polygone  $BN$ ; le sommet  $L$  décrira une petite partie  $Ll$  de l'arc de cercle  $MLN$ , puisque par la construction cet arc est capable de l'angle donné  $MLN$ . Cette petite partie  $Ll$  sera donc commune à la courbe  $ILK$ ; & par conséquent la droite  $CL$ , qui lui est perpendiculaire, sera aussi perpendiculaire sur cette courbe au point  $L$ . Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION XVI.

### Problème.

FIG. 30. 45. **SOIT**  $ABCD$  une corde parfaitement flexible à laquelle soient attachés différens poids  $A, B, C$ , &c. qui aient entr'eux tels intervalles  $AB, BC$ , &c. que l'on voudra. Si l'on traine cette corde sur un plan horizontal par l'extrémité  $D$ , le long d'une courbe donnée  $DP$ ; il est clair que ces poids se disposeront en sorte qu'ils feront tendre la corde, & qu'ils décriront ensuite des courbes  $AM, BN, CO$ , &c. On demande la manière d'en tirer les tangentes, la position de la corde  $ABCD$  étant donnée avec la grandeur des poids.

Dans le premier instant que l'extrémité  $D$  avance vers  $P$ , les poids  $A, B, C$ , décrivent ou tendent à décrire aiant de petits côtés  $Aa, Bb, Cc$  des polygones qui composent les courbes  $AM, BN, CO$ ; & par conséquent il ne faut pour en mener les tangentes  $AB, BG, CK$ , que déterminer la

direction des poids  $A, B, C$  dans ce premier instant, c'est à dire la position des droites qu'ilstendent à décrire. Pour la trouver, je remarque

1<sup>o</sup>. Que le poids  $A$  est tiré dans ce premier instant suivant la direction  $AB$ , & comme il n'y a aucun obstacle qui s'oppose à cette direction, puisqu'il ne traîne après lui aucun poids, il la doit suivre; & partant la droite  $AB$  sera la tangente en  $A$  de la courbe  $AM$ .

2<sup>o</sup>. Que le poids  $B$  est tiré suivant la direction  $BC$ ; mais parcequ'il traîne après lui le poids  $A$  qui n'est pas dans cette direction, & qui doit par conséquent y apporter quelque changement, le poids  $B$  n'aura pas sa direction suivant  $BC$ , mais suivant une autre droite  $BG$ , dont il faut trouver la position. Ce que je fais ainsi.

Je décris sur  $BC$  comme diagonale le rectangle  $EF$ , dont le côté  $BF$  est sur  $AB$  prolongée, & supposant que la force avec laquelle le poids  $B$  est tiré suivant  $BC$ , s'exprime par  $BC$ ; il est visible par les regles de la Mécanique, que cette force  $BC$  se peut partager en deux autres  $BE$  &  $BF$ , c'est à dire que le poids  $B$  étant tiré suivant la direction  $BC$  par la force  $BC$ , c'est la même chose que s'il étoit tiré en même temps par la force  $BE$  suivant la direction  $BE$ , & par la force  $BF$  suivant la direction  $BF$ . Or le poids  $A$  ne s'oppose point à la direction  $BE$ , puisqu'elle lui est perpendiculaire; & par conséquent la force  $BE$  suivant cette direction demeure toute entière: mais il s'oppose avec toute sa pesanteur à la direction  $BF$ . Afin donc que le poids  $B$  avec la force  $BF$  vainque la résistance du poids  $A$ , il faut que cette force se distribue dans ces poids à proportion de leurs masses ou grandeurs: c'est pourquoi si l'on divise  $EC$  au point  $G$ , en sorte que  $CG$  soit à  $GE$  comme le poids  $A$  au poids  $B$ ; il est clair que  $EG$  exprimera la force restante avec laquelle le poids  $B$  tend à se mouvoir suivant la direction  $BF$ , après avoir vaincu la résistance du poids  $A$ . Il est donc évident que le poids  $B$  est tiré en même temps par la force  $BE$  suivant la direction  $BE$ , & par la force  $EG$  suivant la direction

*BF* ou *EC*; & partant qu'il tendra à aller par *BG* avec la force *BG*: c'est à dire que *BG* sera sa direction, & par conséquent tangente en *B* de la courbe *BN*.

3°. Pour avoir la tangente *CK*, je forme sur *CD* comme diagonale le rectangle *HI*, dont le côté *CI* est sur *BC* prolongée; & je vois que le poids *B* ne résiste point à la force *CH* avec laquelle le poids *C* est tiré suivant la direction *CH*, mais bien à la force *CI* avec laquelle il est tiré suivant la direction *CI*, & de plus que le poids *A* résiste aussi à cette force. Pour sçavoir de combien, je tire *AL* perpendiculaire sur *CB* prolongée du côté de *B*, & je remarque que si *AB* exprime la force avec laquelle le poids *A* est tiré suivant la direction *AB*, *BL* exprimera celle avec laquelle ce même poids *A* est tiré suivant la direction *BC*; de sorte que le poids *C* avec la force *CI* doit vaincre le poids entier *B*, & de plus une partie du poids *A* qui est à ce poids *A* comme *BL* est à *BA*, ou *BF* à *BC*. Si donc l'on fait  $B + \frac{A \times BF}{BC}$ .  $C :: DK . KH$ , il est clair que *CK* sera la direction du poids *C*, & par conséquent la tangente en *C* de la troisième courbe *CO*.

Si le nombre des courbes étoit plus grand, on trouveroit de la même manière la tangente de la quatrième, cinquième, &c. Et si l'on vouloit avoir les tangentes des courbes décrites par les points moyens entre les poids, on les trouveroit par l'art. 36.



## SECTION III.

*Usage du calcul des différences pour trouver les plus grandes & les moindres appliquées, où se réduisent les questions De maximis & minimis.*

## DÉFINITION I.

SOIT une ligne courbe  $MDM$  dont les appliquées  $PM$ , Fig. 31.  
 $ED$ ,  $PM$  soient parallèles entr'elles; & qui soit telle  
 que la coupée  $AP$  croissant continuellement, l'appliquée  
 $PM$  croisse aussi jusqu'à un certain point  $E$ , après lequel  
 elle diminue; ou au contraire qu'elle diminue jusqu'à un  
 certain point  $E$ , après lequel elle croisse. Cela posé, 32.  
33.  
34.

La ligne  $ED$  sera nommée *la plus grande* ou *la moindre* appliquée.

## DÉFINITION II.

Si l'on propose une quantité telle que  $PM$ , qui soit composée d'une ou de plusieurs indéterminées telles que  $AP$ , laquelle  $AP$  croissant continuellement, cette quantité  $PM$  croisse aussi jusqu'à un certain point  $E$ , après lequel elle diminue, ou au contraire; & qu'il faille trouver pour  $AP$ , une valeur  $AE$  telle que la quantité  $ED$  qui en est composée, soit plus grande ou moindre que toute autre quantité  $PM$  semblablement formée de  $AP$ . Cela s'appelle une question *De maximis & minimis*.

## PROPOSITION GÉNÉRALE.

46. LA nature de la ligne courbe  $MDM$  étant donnée; trouver pour  $AP$  une valeur  $AE$  telle que l'appliquée  $ED$  soit la plus grande ou la moindre de ses semblables  $PM$ .

Lorsque  $AP$  croissant,  $PM$  croît aussi; il est évident\* que  
 la différence  $Rm$  sera positive par rapport à celle de  $AP$ ; \* Art. 8.  
10.  
 & qu'au contraire lorsque  $PM$  diminue, la coupée  $AP$  croît.

F

sant toujours, la différence sera négative. Or toute quantité qui croît ou diminue continuellement, ne peut devenir de positive négative, qu'elle ne passe par l'infini ou par le zero; sçavoir par le zero lorsqu'elle va d'abord en diminuant, & par l'infini lorsqu'elle va d'abord en augmentant. D'où il suit que la différence d'une quantité qui exprime un *plus grand* ou un *moindre*, doit être égale à zero ou à l'infini. Or la nature de la courbe *MDM* étant donnée, on trouvera \* une valeur de *Rm*, laquelle étant égalee d'abord à zero, & ensuite à l'infini, servira à découvrir la valeur cherchée de *AE* dans l'une ou l'autre de ces suppositions.

\* *Sic. l. 1. on 2.*

## REMARQUE.

- FIG. 31. 32. 47. LA tangente en *D* est parallèle à l'axe *AB* lorsque la différence *Rm* devient nulle dans ce point; mais lorsqu'elle devient infinie, la tangente se confond avec l'appliquée *ED*. D'où l'on voit que la raison de *mR* à *RM*, qui exprime celle de l'appliquée à la soutangente, est nulle ou infinie sous le point *D*.
- FIG. 33. 34.

On conçoit aisément qu'une quantité, qui diminue continuellement, ne peut devenir de positive négative sans passer par le zero; mais on ne voit pas avec la même évidence que lorsqu'elle augmente, elle doit passer par l'infini. C'est pourquoi pour aider l'imagination, soient entendues des tangentes aux points *M, D, M*; il est clair dans

- FIG. 31. 32. les courbes où la tangente en *D* est parallèle à l'axe *AB*, que la soutangente *PT* augmente continuellement à mesure que les points *M, P* approchent des points *D, E*; & que le point *M* tombant en *D*, elle devient infinie; & qu'enfin lorsque *AP* surpasse *AE*, la soutangente *PT* devient \* négative de positive qu'elle étoit, ou au contraire.
- \* *Art. 10.*

## EXEMPLE I.

- FIG. 35. 48. SUPPOSONS que  $x^3 + y^3 = axy$  ( $AP = x$ ,  $PM = y$ ,  $AB = a$ ) exprime la nature de la courbe *MDM*. On aura en prenant les différences  $3xxdx + 3yydy = axdy + aydx$ ,

&  $dy = \frac{aydx - 1xxdx}{3y - ax} = 0$  lorsque le point  $P$  tombe sur le point cherchée  $E$ , d'où l'on tire  $y = \frac{1xx}{a}$ ; & substituant cette valeur à la place de  $y$  dans l'équation  $x^3 + y^3 = axy$ , on trouve pour  $AE$  une valeur  $x = \frac{1}{3}a\sqrt[3]{2}$  telle que l'appliquée  $ED$  sera plus grande que toutes les semblables  $PM$ .

## EXEMPLE II.

49. SOIT  $y - a = a^{\frac{1}{3}}x - x^{\frac{1}{3}}$ , l'équation qui expri- Fig. 33.  
me la nature de la courbe  $MDM$ . On aura en prenant les différences,  $dy = -\frac{2dx\sqrt[3]{a}}{3\sqrt[3]{a-x}}$  que j'égalé d'abord à zero; mais parceque cette supposition me donne  $-2dx\sqrt[3]{a} = 0$  qui ne peut faire connoître la valeur de  $AE$ , j'égalé ensuite  $\frac{-2dx\sqrt[3]{a}}{3\sqrt[3]{a-x}}$  à l'infini, ce qui me donne  $\sqrt[3]{a-x} = 0$ ; d'où l'on tire  $x = a$ , qui est la valeur cherchée de  $AE$ .

## EXEMPLE III.

50. SOIT une demi-roulette accourcie  $AMF$ , dont la Fig. 36.  
base  $BF$  est moindre que la demi-circonférence  $ANB$  du cercle générateur qui a pour centre le point  $C$ . Il faut déterminer le point  $E$  sur le diamètre  $AB$ , en sorte que l'appliquée  $ED$  soit la plus grande qu'il est possible.

Ayant mené à discretion l'appliquée  $PM$  qui coupe le demi-cercle en  $N$ , on concevra à l'ordinaire aux points  $M, N$ , les petits triangles  $MRm, NSn$ , & nommant les indéterminées  $AP, x$ ;  $PN, z$ ; l'arc  $AN, u$ ; & les données  $ANB, a$ ;  $BF, b$ ;  $CA$  ou  $CN, c$ ; l'on aura par la propriété de la roulette  $ANB(a) \cdot BF(b) :: AN(u) \cdot NM = \frac{bu}{a}$ .

Donc  $PM = z + \frac{bu}{a}$ , & la différence  $Rm = \frac{adz + bdu}{a}$  = 0 lorsque le point  $P$  tombe au point cherché  $E$ . Or les triangles rectangles  $NSn, NPC$  sont semblables; car si l'on ôte des angles droits  $CNn, PNS$  l'angle commun  $CNS$ , les restes  $SNn, PNC$  seront égaux. Et partant  $CN(c) \cdot CP$

F ij.

$(c - x) :: Nn'(du) . Sn'(dz) = \frac{cdx - xdu}{c}$ . Donc en mettant cette valeur à la place de  $dz$  dans  $adx + bdu = 0$ , on trouvera  $\frac{acdx - axdu + bcdx}{c} = 0$ , d'où l'on tirera  $x$  (qui est en ce cas  $AE) = c + \frac{bc}{a}$ .

Il est donc évident que si l'on prend  $CE$  du côté de  $B$  quatrième proportionnelle à la demi-circonférence  $ANB$ , à la base  $BF$ , & au rayon  $CB$ , le point  $E$  fera celui qu'on cherche.

## EXEMPLE IV.

FIG. 35. 51. COUPER la ligne donnée  $AB$  en un point  $E$ , en sorte que le produit du carré de l'une des parties  $AE$  par l'autre  $EB$ , soit le plus grand de tous les autres produits formés de la même manière.


Ayant nommé l'inconnue  $AE, x$ ; & la donnée  $AB, a$ ; on aura  $\overline{AE} \times EB = axx - x^3$ , qui doit être un *plus grand*. C'est pourquoi on imaginera une ligne courbe  $MDM$ , telle que la relation de l'appliquée  $MP (y)$  à la coupée  $AP (x)$  soit exprimée par l'équation  $y = \frac{axx - x^3}{aa}$ , & on cherchera un point  $E$  tel que l'appliquée  $ED$  soit la plus grande de toutes ses semblables  $PM$ ; ce qui donne  $dy = \frac{2axdx - 3x^2dx}{aa} = 0$ , d'où l'on tire  $AE (x) = \frac{2}{3}a$ .

Si l'on veut en général que  $x^m \times a - x^n$  soit un *plus grand* ( $m$  &  $n$  peuvent marquer tels nombres qu'on voudra), il faudra que la différence de ce produit soit égale à zéro ou à l'infini, ce qui donne  $mx^{m-1}dx \times a - x^n - na - x^{n-1}dx \times x^m = 0$ , d'où en divisant par  $x^{m-1} \times a - x^{n-1}dx$ , l'on tire  $am - mx - nx = 0$ , &  $AE (x) = \frac{m}{m+n}a$ .


Si  $m = 2$ , &  $n = -1$ , l'on aura  $AE = 2a$ , & il faudra alors énoncer le Problème ainsi.

FIG. 37. Prolonger la ligne donnée  $AB$  du côté de  $B$  en un point  $E$ , en sorte que la quantité  $\frac{AE}{BE}$  soit un *moindre*, & non pas un *plus grand*; car l'équation à la courbe  $MDM$  sera


27.



32.



35.



Gravé par Berrey



$\frac{xx}{x-a} = y$ , dans laquelle si l'on suppose  $x = a$ , l'appliquée  $PM$  qui devient  $BC$  sera  $\frac{aa}{0}$ , c'est à dire infinie, & supposant  $x$  infinie, l'on aura  $y = x$ , c'est à dire que l'appliquée sera aussi infinie.

Si  $m = 1$ , &  $n = -2$ , l'on aura  $AE = -a$ ; d'où il suit que l'on doit énoncer le Problème alors en cette sorte.

Prolonger la droite donnée  $AB$  du côté de  $A$  en un Fig. 38.

point  $E$ , en sorte que la quantité  $\frac{AE \times AB}{BE^2}$  soit plus gran.

de que toute autre quantité semblable  $\frac{AP \times AB}{BP^2}$ .

### EXEMPLE V.

52. LA ligne droite  $AB$  étant divisée en trois parties Fig. 39.  
 $AC$ ,  $CF$ ,  $FB$ , il faut couper sa partie du milieu  $CF$  au point  $E$ , en sorte que le rapport du rectangle  $AE \times EB$  au rectangle  $CE \times EF$  soit moindre que tout autre rapport formé de la même manière.

Ayant nommé les données  $AC$ ,  $a$ ;  $CF$ ,  $b$ ;  $CB$ ,  $c$ ; & l'inconnue  $CE$ ,  $x$ ; l'on aura  $AE = a + x$ ,  $EB = c - x$ ,  $EF = b - x$ , & partant le rapport de  $AE \times EB$  à  $CE \times EF$  sera  $\frac{ac + cx - ax - xx}{bx - xx}$  qui doit être un moindre. C'est pourquoy si l'on imagine une ligne courbe  $MDM$ , telle que la relation de l'appliquée  $PM$  ( $y$ ) à la coupée  $CP$  ( $x$ ) soit exprimée par l'équation  $y = \frac{ac + cx - ax - xx}{bx - xx}$ , la question se réduit à trouver pour  $x$  une valeur  $CE$  telle que l'appliquée  $ED$  soit la moindre de toutes les semblables  $PM$ . On formera donc (en prenant les différences, & divisant ensuite par  $adx$ ) l'égalité  $cx - ax - bxx + 2acx - abc = 0$ , dont l'une des racines résout la question.

Si  $c = a + b$ , l'on aura  $x = \frac{1}{2}b$ .

### EXEMPLE VI.

53. ENTRE tous les Cones qui peuvent être inscrits

F iij

dans un sphère, déterminer celui qui a la plus grande surface convexe.

**Fig. 40.** La question se réduit à déterminer sur le diamètre  $AB$  du demi-cercle  $AFB$  le point  $E$ , en sorte qu'ayant mené la perpendiculaire  $EF$ , & joint  $AF$ , le rectangle  $AF \times FE$  soit le plus grand de tous ses semblables  $AN \times NP$ . Car si l'on conçoit que le demi-cercle  $AFB$  fasse une révolution entière autour du diamètre  $AB$ , il est clair qu'il décrira une sphère, & que les triangles rectangles  $AEF$ ,  $APN$  décriront des cones inscrits dans cette sphère, dont les surfaces convexes décrites par les cordes  $AE$ ,  $AN$ , seront entr'elles comme les rectangles  $AF \times FE$ ,  $AN \times NP$ .

Soit donc l'inconnue  $AE = x$ , la donnée  $AB = a$ , on aura par la propriété du cercle  $AF = \sqrt{ax}$ ,  $EF = \sqrt{ax - xx}$ ; & partant  $AF \times FE = \sqrt{aaxx - ax^3}$  qui doit être un *plus grand*. C'est pourquoi on imaginera un ligne courbe  $MDM$  telle que la relation de l'appliquée  $PM (y)$  à la coupée  $AP (x)$  soit exprimée par l'équation  $\frac{\sqrt{aaxx - ax^3}}{x} = y$ ; & l'on cherchera le point  $E$ , en sorte que l'appliquée  $ED$  soit plus grande que toutes ses semblables  $PM$ . On aura donc en prenant la différence  $\frac{axdx - xxxdx}{2\sqrt{aaxx - ax^3}} = 0$ , d'où l'on tire  $AE (x) = \frac{2}{3}a$ .

#### EXEMPLE VII.

54. ON demande entre tous les Parallélépipèdes égaux à un cube donné  $a^3$ , & qui ont pour un de leurs côtés la droite donnée  $b$ , celui qui a la moindre superficie.

Noimant  $x$  un des deux côtés que l'on cherche, l'autre sera  $\frac{a^3}{bx}$ ; & prenant les plans alternatifs des trois côtés  $b$ ,  $x$ ,  $\frac{a^3}{bx}$  du parallélépipède, leur somme sçavoir  $bx + \frac{a^3}{x} + \frac{a^3}{b}$  fera la moitié de sa superficie qui doit être un *moindre*. C'est pourquoi concevant à l'ordinaire une ligne courbe qui ait pour équation  $\frac{bx}{x} + \frac{a^3}{x} + \frac{a^3}{b} = y$ , l'on trou-

vera en prenant la différence  $\frac{b dx}{a} - \frac{a dx}{xx} = 0$ , d'où l'on tire  $xx = \frac{a^2}{b}$ , &  $x = \sqrt{\frac{a^2}{b}}$ ; de sorte que les trois côtés du parallélépipède qui satisfait à la question, seront le premier  $b$ , le second  $\sqrt{\frac{a^2}{b}}$ , & le troisième  $\sqrt{\frac{a^2}{b}}$ . D'où l'on voit que les deux côtés que l'on cherchoit, sont égaux entr'eux.

## EXEMPLE VIII.

55. ON demande présentement entre tous les Parallé- FIG. 41.  
lépipèdes qui sont égaux à un cube donné  $a^3$ , celui qui a la moindre superficie.

Nommant  $x$  un des côtés inconnus, il est clair par l'exemple précédent, que les deux autres côtés seront chacun  $\sqrt[3]{\frac{a^3}{x}}$ ; & partant la somme des plans alternatifs qui est la moitié de la superficie, sera  $\frac{a^2}{x} + 2\sqrt[3]{a^3 x}$  qui doit être *un moindre*. C'est pourquoi sa différence  $-\frac{a^2 dx}{xx} + \frac{a^2 dx}{\sqrt[3]{a^3 x}}$   $= 0$ , d'où l'on tire  $x = a$ ; & par conséquent les deux autres côtés seront aussi chacun  $= a$ ; de sorte que le cube même donné satisfait à la question.

## EXEMPLE IX.

56. LA ligne  $AEB$  étant donnée de position sur un plan FIG. 41.  
avec deux points fixes  $C, F$ ; & ayant mené à un de ses points quelconques  $P$  deux droites  $CP (u)$ ,  $PF (z)$ ; soit donnée une quantité composée de ces indéterminées  $u$  &  $z$ , & de telles autres droites données  $a, b$ , &c. qu'on voudra. On demande quelle doit être la position des droites  $CE, EF$ , afin que la quantité donnée, qui en est composée, soit plus grande ou moindre que cette même quantité lorsqu'elle est composée des droites  $CP, PF$ .

Supposons que les lignes  $CE, EF$  aient la position requise; & ayant joint  $CF$ , concevons une ligne courbe  $DM$  telle qu'ayant mené à discrétion  $PQM$  perpendiculaire sur  $CF$ , l'appliqué  $QM$  exprime la quantité donnée: il est clair

que le point  $P$  tombant au point  $E$ , l'appliquée  $QM$  qui devient  $OD$ , doit être la moindre ou la plus grande de toutes ses semblables. Il faudra donc que sa différence soit alors égale à zéro ou à l'infini : c'est pourquoi si la quantité donnée est par exemple  $au + zx$ , l'on aura  $adu + 2zdx = 0$ , & par conséquent  $du - dz : 2x . a$ . D'où l'on voit déjà que  $dz$  doit être négative par rapport à  $du$  ; c'est à dire que la position des droites  $CE$ ,  $EF$  doit être telle que  $x$  croissant,  $z$  diminue.

Maintenant si l'on mène  $EG$  perpendiculaire à la ligne  $AEB$ , & d'un de ses points quelconques  $G$  les perpendiculaires  $GL$ ,  $GI$  sur  $CE$ ,  $EF$  ; & qu'ayant tiré par le point  $e$  pris infiniment près de  $E$ , les droites  $CKe$ ,  $FeH$ , on décrive des centres  $C$ ,  $F$  les petits arcs de cercle  $EK$ ,  $EH$  : on formera les triangles rectangles  $ELG$  &  $EKe$ ,  $EIG$  &  $EHe$ , qui seront semblables entr'eux ; car si l'on ôte des angles droits  $GEe$ ,  $LEK$  le même angle  $LEe$ , les restes  $LEG$ ,  $KEe$  seront égaux ; on prouvera de même que les angles  $IEG$ ,  $HHe$  seront égaux. On aura donc  $GL . GI : Ke (du) . He (-dz) : 2x . a$ . D'où il suit que la position des droites  $CE$ ,  $EF$  doit être telle qu'ayant mené la perpendiculaire  $EG$  sur la ligne  $AEB$  ; le sinus  $GL$  de l'angle  $GEC$  soit au sinus  $GI$  de l'angle  $GEF$ , comme les quantités qui multiplient  $dz$  sont à celles qui multiplient  $du$ . Ce qu'il falloit trouver.

## COROLLAIRE.

57. SI l'on veut à présent que la droite  $CE$  soit donnée de position & de grandeur, que la droite  $EF$  le soit de grandeur seulement, & qu'il faille trouver sa position, il est clair que l'angle  $GEC$  étant donné, son sinus  $GL$  le sera aussi, & par conséquent le sinus  $GI$  de l'angle cherché  $GEF$ . Donc si l'on décrit un cercle du diamètre  $EG$ , & que l'on porte la valeur de  $GI$  sur sa circonférence de  $G$  en  $I$  ; la droite  $EF$  qui passe par le point  $I$  aura la position requise.

Soit  $au + bx$  la quantité donnée, on trouvera  $GI = \frac{a \times GL}{b}$  ; d'où l'on voit que quelque longueur qu'on donne

ne à  $EC$  & à  $EF$ , la position de cette dernière sera toujours la même, puisqu'elles n'entrent point dans la valeur de  $GI$ , qui par conséquent ne change point. Si  $a = b$ , il est clair que la position de  $EF$  doit être sur  $CE$  prolongée du côté de  $E$ ; puisque  $GL = GI$ , lorsque les points  $C, F$  tombent de part & d'autre de la ligne  $AEB$ : mais lorsqu'ils tombent du même côté, l'angle  $FEG$  doit être pris égal à l'angle  $CEG$ . FIG. 42.

## EXEMPLE X.

58. LE cercle  $AEB$  étant donné de position avec les points  $C, F$  hors de ce cercle; trouver sur sa circonférence le point  $E$  tel que la somme des droites  $CE, EF$  soit la moindre qu'il est possible. FIG. 43.

Supposant que le point  $E$  soit celui que l'on cherche, & menant par le centre  $O$  la ligne  $OEG$ , il est clair qu'elle sera perpendiculaire sur la circonférence  $AEB$ ; & partant \* que les angles  $FEG, CEG$  seront égaux entr'eux. Si donc \* Art. 37.

l'on mène  $EH$  en sorte que l'angle  $EH O$  soit égal à l'angle  $CE O$ , & de même  $EK$  en sorte que l'angle  $EKO$  soit égal à l'angle  $FEO$ , & les parallèles  $ED, EL$  à  $OF, OC$ ; on formera les triangles semblables  $OCE$  &  $OE H, OFE$  &  $OE K, HDE$  &  $KLE$ ; & en nommant les connues  $OE$  ou  $OA$  ou  $OB, a$ ;  $OC, b$ ;  $OF, c$ ; & les inconnues  $OD$  ou  $LE, x$ ;

$DE$  ou  $OL, y$ ; l'on aura  $OH = \frac{aa}{b}, OK = \frac{aa}{c},$  &  $HD$

$(x - \frac{aa}{b}). DE (y) :: KL (y - \frac{aa}{c}). LE (x).$  Donc

$xx - \frac{aax}{b} = yy - \frac{aay}{c},$  qui est une équation à une hyperbole que l'on construira facilement, & qui coupera le cercle au point cherché  $E$ .

## EXEMPLE XI.

59. UN voyageur partant du lieu  $C$  pour aller au lieu  $F$ , doit traverser deux campagnes séparées par la ligne droite  $AEB$ . On suppose qu'il parcourt dans la campagne du côté  $C$  l'espace  $a$  dans le tems  $c$ , & dans l'autre du

G

côté de  $F$  l'espace  $b$  dans le même tems  $c$  : on demande par quel point  $E$  de la droite  $AEB$  il doit passer, afin qu'il employe le moins de tems qu'il est possible pour parvenir de  $C$  en  $F$ . Si l'on fait  $a \cdot CE(u) :: c \cdot \frac{cu}{a}$ . Et  $b \cdot EF(x) :: c \cdot \frac{cx}{b}$ . Il est clair que  $\frac{cu}{a}$  exprime le tems que le voyageur employe à parcourir la droite  $CE$ , & de même que  $\frac{cx}{b}$  exprime celui qu'il employe à parcourir  $EF$ ; de sorte que  $\frac{cu}{a} + \frac{cx}{b}$  doit être un *moindre*. D'où il suit

\* Art. 56. \* qu'ayant mené  $EG$  perpendiculaire sur la ligne  $AB$ ; le sinus de l'angle  $GEC$  doit être au sinus de l'angle  $GEF$ , comme  $a$  est à  $b$ .

Cela posé, si l'on décrit du point cherché  $E$  comme centre de l'intervalle  $EC$  le cercle  $CGH$ , & qu'on mene sur la droite  $AEB$  les perpendiculaires  $CA, HD, FB$ , & sur  $CE, EF$  les perpendiculaires  $GL, GI$ ; l'on aura  $a \cdot b :: GL \cdot GI$ . Or  $GL = AE$ , &  $GI = ED$ , parce que les triangles rectangles  $GEI$  &  $EHD$  sont égaux & semblables entr'eux, comme il est facile à prouver. C'est pourquoi si l'on nomme l'inconnue  $AE, x$ ; on trouvera  $ED = \frac{bx}{a}$ ; & nommant les connues  $AB, f$ ;  $AC, g$ ;  $BF, h$ ; les triangles semblables  $EBF, EDH$  donneront  $EB(f-x) \cdot BF(h) :: ED(\frac{bx}{a})$ .  
 $DH = \frac{bfx}{af - ax}$ . Mais à cause des triangles rectangles  $EDH, EAC$ , qui ont leurs hypoténuses  $EH, EC$  égales, l'on aura  $\overline{ED}^2 + \overline{DH}^2 = \overline{EA}^2 + \overline{AC}^2$ , c'est à dire en termes analytiques,  $\frac{b^2 x^2}{a^2} + \frac{b^2 b f x}{a^2 f - a^2 x} = x^2 + g^2$ : De sorte que ôtant les fractions, & ordonnant ensuite l'égalité, il viendra  $a^2 x^4 - 2a^2 f x^3 + a^2 f f x x - 2a^2 f g x + a^2 f f g = 0$ .  

$$\begin{array}{r} -bb \\ + 2bbf \\ + augg \\ - bbf \\ - bbb \end{array}$$

On peut encore trouver cette équation de la manière qui suit, sans avoir recours à l'exemple 9.

Ayant nommé comme auparavant les connues  $AB$ ,  $g$ ;  $AC$ ,  $g$ ;  $BF$ ,  $b$ ; & l'inconnue  $AE$ ,  $x$ ; on fera  $a$ .  $CE$   $(\sqrt{gg+xx}) :: c$ .  $\frac{c\sqrt{gg+xx}}{a} =$  au tems que le voyageur employe à parcourir la droite  $CE$ . Et de même  $b$ .  $EF$   $(\sqrt{ff-2fx+xx+bb}) :: c$ .  $\frac{c\sqrt{ff-2fx+xx+bb}}{b} =$  au tems que le voyageur employe à parcourir la droite  $EF$ . Ce qui fera  $\frac{c\sqrt{gg+xx}}{a} + \frac{c\sqrt{ff-2fx+xx+bb}}{b} =$  à un moindre; & partant sa différence  $\frac{cdx}{a\sqrt{gg+xx}} + \frac{c\sqrt{ff-2fx+xx+bb} - cfdx}{b\sqrt{ff-2fx+xx+bb}}$   $= 0$ ; d'où l'on tire, en divisant par  $cdx$  & en ôtant les incommensurables, la même égalité que ci devant, dont l'une des racines fournira pour  $AE$  la valeur qu'on cherche.

## EXEMPLE XII.

60. SOIT une poulie  $F$  qui pend librement au bout d'une corde  $CF$  attachée en  $C$ , avec un plomb  $D$  suspendu par la corde  $DFB$  qui passe au dessus de la poulie  $F$ , & qui est attachée en  $B$ , en sorte que les points  $C$ ,  $B$  sont situés dans la même ligne horizontale  $CB$ . On suppose que la poulie & les cordes n'ayent aucune pesanteur; & l'on demande en quel endroit le plomb  $D$  ou la poulie  $F$  doit s'arrêter. FIG. 44.

Il est clair par les principes de la Mécanique que le plomb  $D$  descendra le plus bas qu'il lui sera possible, au dessous de l'horizontale  $CB$ ; d'où il suit que la ligne à plomb  $DFE$  doit être un *plus grand*. C'est pourquoi nommant les données  $CF$ ,  $a$ ;  $DFB$ ,  $b$ ;  $CB$ ,  $c$ ; & l'inconnue  $CE$ ,  $x$ ; l'on aura  $EF = \sqrt{aa-xx}$ ,  $FB = \sqrt{aa+cc-2cx}$ , &  $DFE = b - \sqrt{aa+cc-2cx} + \sqrt{aa-xx}$  qui doit être un *plus grand*; & partant sa différence  $\frac{cdx}{\sqrt{aa+cc-2cx}} - \frac{xdx}{\sqrt{aa-xx}} = 0$ , d'où l'on tire  $2cx^3 - 2ccxx - aaxx + aacc = 0$ , &

G ij

divisant par  $x - c$ , il vient  $2cxx - ax - ac = 0$ , dont l'une des racines fournit pour  $CE$  une valeur telle que la perpendiculaire  $ED$  passe par la poulie  $F$  & le plomb  $D$  lorsqu'ils sont en repos.

On pourroit encore résoudre cette question d'une autre manière que voici.

Nommant  $EF, y$ ;  $BF, x$ ; l'on aura  $b - x + y =$  à un plus grand; & partant  $dy = dx$ . Or il est clair que la poulie  $F$  décrit le cercle  $CFA$  autour du point  $C$  comme centre; & partant si du point  $f$  pris infiniment près de  $F$ , l'on mène  $fR$  parallèle à  $CB$ , &  $fS$  perpendiculaire sur  $BF$ , l'on aura  $FR = dy$ , &  $FS = dx$ . Elles seront donc égales entr'elles; & par conséquent les petits triangles rectangles  $FRf, FSf$ , qui ont de plus l'hypoténuse  $Ff$  commune, seront égaux & semblables; d'où l'on voit que l'angle  $RFf$  est égal à l'angle  $SFf$ , c'est à dire que le point  $F$  doit être tellement situé dans la circonférence  $FA$ , que les angles faits par les droites  $EF, FB$  sur les tangentes en  $F$  soient égaux entr'eux: ou bien (ce qui revient au même) que les angles  $BFC, DFC$  soient égaux.

Cela posé, si l'on mène  $FH$ , en sorte que l'angle  $FHC$  soit égal à l'angle  $CFB$  ou  $CFD$ ; les triangles  $CBF, CFH$  seront semblables; comme aussi les triangles rectangles  $ECF, EFH$ , puisque l'angle  $CFE$  est égal à l'angle  $FHE$ , étant l'un & l'autre le complément à deux droits, des angles égaux  $FHC, CFD$ ; & par conséquent on aura  $CH = \frac{ac}{x}$ , &  $HE (x - \frac{ac}{x})$ .

$EF (y) :: EF (y) . EC (x)$ . Donc  $xx - \frac{ax}{c} = yy = ac - xx$  par la propriété du cercle, d'où l'on tire la même égalité que ci-devant.

### EXEMPLE XIII.

FIG. 45. 61. L'ELEVATION du pole étant donnée, trouver le jour du plus petit crépuscule.

Soit  $C$  le centre de la sphère;  $APTOBHQ$  le méridien;  $HDdO$  l'horizon;  $QeT$  le cercle crépusculaire parallèle

à l'horison ;  $AMNB$  l'équateur ;  $FEDG$  la portion du parallèle à l'équateur , que décrit le Soleil le jour du plus petit crépuscule , renfermée entre les plans de l'horison & du cercle crépusculaire ;  $P$  le pôle austral ;  $PEM$ ,  $PDN$  des quarts de cercles de déclinaison. L'arc  $HQ$  ou  $OT$  du méridien compris entre l'horison & le cercle crépusculaire , & l'arc  $OP$  de l'élevation du pôle sont donnés , & par conséquent leurs sinus droits  $CI$  ou  $FL$  ou  $QX$ , &  $OV$ . L'on cherche le sinus  $CK$  de l'arc  $EM$  ou  $DN$  de la déclinaison du Soleil lorsqu'il décrit le parallèle  $ED$ .

S'imaginant une autre portion  $fedg$  d'un parallèle à l'équateur , infiniment proche de  $FEDG$ , avec les quarts de cercles  $Pem$ ,  $Pdn$  ; il est clair que le temps que le Soleil employe à parcourir l'arc  $ED$ , devant être un *moindre*, la différence de l'arc  $MN$  qui en est la mesure , & qui devient  $mn$  lorsque  $ED$  devient  $ed$ , doit être nulle ; d'où il suit que les petits arcs  $Mm$ ,  $Nn$ , & par conséquent les petits arcs  $Re$ ,  $Sd$ , seront égaux entr'eux. Or les arcs  $RE$ ,  $SD$  étant renfermés entre les mêmes parallèles  $ED$ ,  $ed$ , sont aussi égaux, & les angles en  $S$  & en  $R$  sont droits. Donc les petits triangles rectangles  $ERE$ ,  $DSd$  ( que l'on considère comme réctilignes \* à cause de l'infinie petitesse de leurs \* *Art. 3.* côtés ), seront égaux & semblables ; & par conséquent les hypoténuses  $Ee$ ,  $Dd$  seront aussi égales entr'elles.

Cela posé, les droites  $DG$ ,  $EF$ ,  $dg$ ,  $ef$  communes sections des plans  $FEDG$ ,  $fedg$  parallèles à l'équateur , avec l'horizon & le cercle crépusculaire , seront perpendiculaires sur les diamètres  $HO$ ,  $QT$ , puisque les plans de tous ces cercles sont perpendiculaires chacun sur le plan du méridien ; & les petites droites  $Gg$ ,  $Ff$  seront égales entr'elles , puisque les droites  $FG$ ,  $fg$  sont parallèles. Donc  $\sqrt{Dd^2 - Gg^2}$  ou  $DG - dg = \sqrt{Ee^2 - Ff^2}$  ou  $fe - FE$ . Or il est clair par ce que l'on a démontré dans l'article 30. que si l'on mène à discrétion dans un demi-cercle deux appliquées infiniment proches, le petit arc qu'elles renferment, sera

à leur différence, comme le rayon est à la coupée depuis le centre, ce qui donne ici (à cause des cercles  $HDO$ ,  $QET$ )  $CO . CG :: Dd$  ou  $Ee . DG - dg$  ou  $fe - FE :: 1Q . IF :: CO + 1Q$  ou  $OX . CG + IF$  ou  $GL$ . Mais à cause des triangles rectangles semblables  $CVO$ ,  $CKG$ ,  $FLG$ , l'on aura  $CO . CG :: OV . GK$ . Et  $GK . GL :: CK . FL$  ou  $QX$ . Donc  $OV . CK :: OX . XQ :: XQ . XH$  par la propriété du cercle : c'est à dire que si l'on prend  $QX$  pour le rayon ou sinus total dans le triangle rectangle  $QXH$ , dont l'angle  $HQX$  est de 9 degrés, parceque les Astronomes font l'arc  $HQ$  de 18 degrés, l'on aura comme le sinus total est à la tangente de 9 degrés, de même le sinus de l'elevation du pole est au sinus de la déclinaison australe du Soleil dans le temps du plus petit crépuscule. D'où il suit que si l'on ôte 0.8002875 du logarithme du sinus de l'elevation du pole, le reste sera le logarithme du sinus cherché. Ce qu'il falloit trouver.



## SECTION IV.

*Usage du calcul des différences pour trouver les points d'inflexion & de rebroussement.*

COMME l'on se servira dans la suite des différences secondes, troisièmes, &c. il est nécessaire d'en donner une idée avant que d'aller plus loin.

## DÉFINITION I.

La portion infiniment petite dont la différence d'une quantité variable augmente ou diminue continuellement, est appelée la *différence de la différence* de cette quantité, ou bien la *différence seconde*. Ainsi si l'on imagine une troisième appliquée  $nq$  infiniment proche de la seconde  $mp$ , FIG. 46. & qu'on mene  $mS$  parallèle à  $AB$ , &  $mH$  parallèle à  $RS$ ; on appellera  $Hn$  la *différence de la différence*  $Rm$ , ou bien la *différence seconde* de  $PM$ .

De même si l'on imagine une quatrième appliquée  $of$  infiniment proche de la troisième  $nq$ , & qu'on mene  $nT$  parallèle à  $AB$ , &  $nL$  parallèle à  $ST$ ; on appellera la différence des petites droites  $Hn$ ,  $Lo$ , la *différence de la différence seconde*, ou bien la *différence troisième* de  $PM$ . Et ainsi des autres.

## AVERTISSEMENT.

On marquera dans la suite chaque différence par un nombre de  $d$  qui en exprime l'ordre ou le genre. Par exemple, on marquera par  $dd$  la différence seconde ou du second genre; par  $ddd$ , la différence troisième ou du troisième genre; par  $dddd$ , la différence quatrième ou du quatrième genre, & de même des autres. Ainsi  $ddy$  exprimera  $Hn$ ;  $dddy$ ,  $Lo - Hn$  ou  $Hn - Lo$ , &c.

Quant aux puissances de ces différences, on les marquera par des chiffres postérieurs mis au dessus, comme l'on fait ordinairement celles des grandeurs entières. Par exemple, le quarré, ou le cube de  $dy$  sera  $dy^2$ , ou  $dy^3$ ; le quarré, ou le cube de  $ddy$  sera  $ddy^2$ , ou

$ddy^3$ , celui de  $ddd y$  sera  $ddd y^2$ , ou  $ddd y^3$ , celui de  $dddd y$  sera  $dddd y^2$ , ou  $dddd y^3$ , &c.

## COROLLAIRE I.

62. S i l'on nomme chacune des coupées  $AP, Ap, Aq, Af$ ,  $x$  ; chacune des appliquées  $PM, pm, qn, fo, y$  ; & chacune des portions courbes  $AM, Am, An, Ao, u$  ; il est clair que  $dx$  exprimera les différences  $Pp, pq, qf$  des coupées ;  $dy$  les différences  $Rm, Sn, To$  des appliquées ; &  $du$  les différences  $Mm, mn, no$  des portions de la courbe  $AMD$ . Or afin de prendre, par exemple, la différence seconde  $Hn$  de la variable  $PM$ , il faut imaginer sur l'axe deux petites parties  $Pp, pq$  & sur la courbe deux autres  $Mm, mn$  pour avoir les deux différences  $Rm, Sn$  ; & partant si l'on suppose que les petites parties  $Pp, pq$  soient égales entr'elles ; il est clair que  $dx$  sera constante par rapport à  $dy$  & à  $du$ , puisque  $Pp$  qui devient  $pq$  demeure la même pendant que  $Rm$  qui devient  $Sn$ , &  $Mm$  qui devient  $mn$ , varient. On pourroit supposer que les petites parties de la courbe  $Mm, mn$  seroient égales entr'elles, & alors  $du$  seroit constante par rapport à  $dx$  & à  $dy$  ; & enfin si l'on supposoit que  $Rm$  &  $Sn$  fussent égales,  $dy$  seroit constante par rapport à  $dx$  & à  $du$ , & la différence  $Hn$  ( $ddy$ ) seroit nulle.

De même pour prendre la différence troisième de  $PM$ , ou la différence de la différence seconde  $Hn$ , il faut imaginer sur l'axe trois petites parties  $Pp, pq, qf$  ; sur la courbe trois autres  $Mm, mn, no$  ; & sur les appliquées aussi trois autres  $Rm, Sn, To$ , & alors on aura  $dx$  ou  $du$  ou  $dy$  pour constante, selon qu'on supposera que les petites parties  $Pp, pq, qf$ , ou  $Mm, mn, no$ , ou  $Rm, Sn, To$  sont égales entr'elles. Il en est de même des différences quatrièmes, cinquièmes, &c.

FIG. 47. Tout ceci se doit aussi entendre des courbes  $AMD$ , dont les appliquées  $BM, Bm, Bn$  partent toutes d'un point fixe  $B$  ; car pour avoir, par exemple, la différence seconde de  $BM$ , il faut imaginer deux autres appliquées  $Bm, Bn$  qui fassent des angles  $MBm, mBn$  infiniment petits, & ayant décrit du centre  $B$  les petits arcs de cercle  $MR, mS$  ; la différence des

des petites droites  $Rm, Sn$ , sera la différence seconde de  $BM$ ; & l'on pourra prendre pour constants les petits arcs  $MR, mS$ , ou les petites portions de la courbe  $Mm, mn$ , ou enfin les petites droites  $Rm, Sn$ . Il en va de même pour les différences troisièmes, quatrièmes, &c. de l'appliquée  $BM$ .

## REMARQUE.

63. ON doit bien remarquer, 1<sup>o</sup>. Qu'il y a différens or- FIG. 46.  
dres d'infiniment petits: que  $Rm$ , par exemple, est infiniment petite par rapport à  $PM$ , & infiniment grande par rapport à  $Hn$ ; de même que l'espace  $MPpm$  est infiniment petit par rapport à l'espace  $APM$ , & infiniment grand par rapport au triangle  $MRm$ .

2<sup>o</sup>. Que la différence entière  $Pf$  est encore infiniment petite par rapport à  $AP$ ; parceque toute quantité qui est la somme d'un nombre fini de quantités infiniment petites telles que  $Pp, pq, qf$  par rapport à une autre  $AP$ , demeure toujours infiniment petite par rapport à cette même quantité: & qu'afin qu'elle devienne du même ordre, il faut que le nombre des quantités de l'ordre inférieur qui la compose, soit infini.

## COROLLAIRE II.

64. ON peut marquer en cette sorte les différences secondes dans toutes les suppositions possibles.

1<sup>o</sup>. Dans les courbes où les appliquées  $mR, nS$  sont pa- FIG. 47.  
rallèles entr'elles, on prolongera la petite droite  $Mm$  en  $H$  où elle rencontre l'appliquée  $Sn$ ; & ayant décrit du centre  $m$ , de l'intervalle  $mn$ , l'arc  $nk$ , on tirera les petites droites  $nl, li, kcg$  parallèles à  $mS$  & à  $Sn$ . Cela posé, si l'on veut que  $dx$  soit constante, c'est à dire que  $MR$  soit égale à  $mS$ ; il est clair que le triangle  $mSH$  est semblable & égal au triangle  $MRm$ , & qu'ainsi  $Hn$  est  $ddy$ , c'est à dire la différence de  $Rm$  &  $Sn$ , &  $Hk = ddu$ . Mais si l'on suppose que  $du$  soit constante, c'est à dire que  $Mm = mn$  ou à  $mk$ ; il est évident alors que le triangle  $mgk$  est semblable & égal au triangle  $MRm$ , & qu'ainsi  $kc = ddy$ , &

H

*Sg* ou  $cn = ddx$ . Enfin si l'on prend  $dy$  pour constante, c'est à dire  $mR = nS$ , il s'ensuit que le triangle  $mil$  est égal & semblable au triangle  $MRm$ , & qu'aini  $iS$  ou  $nl = ddx$ , &  $lk = ddu$ .

FIG. 50. 51. 2°. Dans les courbes dont les appliquées  $BM, Bm, Bn$  partent d'un même point  $B$ , l'on décrira du centre  $B$  les arcs

\* *Art.* 3.  $MR, mS$ , que l'on regardera \* comme de petites droites perpendiculaires sur  $Bm, Bn$ ; & ayant prolongé  $Mm$  en  $E$ , & décrit du centre  $m$ , de l'intervalle  $mn$ , le petit arc  $nkE$ , on fera l'angle  $EmH = mBn$ , & l'on tirera les petites droites  $nl, li, kg$  parallèles à  $mS$  & à  $Sn$ . Cela posé, à cause du triangle  $BSm$  rectangle en  $S$ , l'angle  $BmS + mBn$ , ou  $+ EmH$  vaut un droit, & partant l'angle  $BmE$  vaut un droit  $+ SmH$ ; il vaut aussi le droit  $MRm + RMm$ , puisqu'il est externe au triangle  $RMm$ . Donc l'angle  $SmH = RMm$ .

Il suit de ceci, 1°. Que si l'on veut que  $dx$  soit constante, c'est à dire que les petits arcs  $MR, mS$  soient égaux entr'eux, le triangle  $SmH$  sera semblable & égal au triangle  $RMm$ , & qu'aini  $Hn = ddy$ , &  $Hk = ddu$ . 2°. Que si l'on prend  $du$  pour constante, le triangle  $gmK$  sera semblable & égal au triangle  $RMm$ , & qu'aini  $kg$  exprimera  $ddy$  &  $kg$  ou  $cn, ddx$ . Enfin, 3°. Que si l'on prend  $dy$  pour constante, les triangles  $iml, RMm$  seront égaux & semblables; & qu'aini  $iS$  ou  $ln = ddx$ , &  $lk = ddu$ .

## PROPOSITION I.

### Problème.

65. PRENDRE la différence d'une quantité composée de différences quelconques.

On prendra pour constante la différence que l'on voudra, & traitant les autres comme des quantités variables, on se servira des regles prescrites dans la Section premiere.

La différence de  $\frac{ydy}{dx}$ , en prenant  $dx$  pour constante, sera  $\frac{dy^2 + yddy}{dx}$ , &  $\frac{2xdy - ydyddx}{dx^2}$  en prenant  $dy$  pour constante.

Celle de  $\frac{z\sqrt{dx^2+dy^2}}{dx}$ , en prenant  $dx$  pour constante, sera  $dz\sqrt{dx^2+dy^2} + \frac{zdyddy}{\sqrt{dx^2+dy^2}}$ , le tout divisé par  $dx$ , c'est à dire  $\frac{dzdx^2+dx dy^2+zdyddy}{dx\sqrt{dx^2+dy^2}}$ ; & en prenant  $dy$  pour constante, elle sera  $dzdx\sqrt{dx^2+dy^2} + \frac{zdx^2ddx}{\sqrt{dx^2+dy^2}} - zddx\sqrt{dx^2+dy^2}$ , le tout divisé par  $dx^2$ , c'est à dire  $\frac{dzdx^2+dzdx dy^2-zdy^2ddx}{dx^2\sqrt{dx^2+dy^2}}$ .

La différence de  $\frac{ydy}{\sqrt{dx^2+dy^2}}$ , en prenant  $dx$  pour constante, sera  $\frac{ydy^2ddy}{\sqrt{dx^2+dy^2}} - \frac{ydy^2ddy}{\sqrt{dx^2+dy^2}}$ , le tout divisé par  $dx^2+dy^2$ , c'est à dire  $\frac{dx^2dy^2+dy^4+ydx^2ddy}{dx^2+dy^2\sqrt{dx^2+dy^2}}$ ; & en prenant  $dy$  pour constante, elle sera  $\frac{dx^2dy^2+dy^4-ydydxddx}{dx^2+dy^2\sqrt{dx^2+dy^2}}$ .

La différence de  $\frac{dx^2+dy^2\sqrt{dx^2+dy^2}}{dxddy}$  ou  $\frac{dx^2+dy^2}{dxddy}$ , en prenant  $dx$  pour constante, sera  $-\frac{ydxddy^2dx^2+dy^2}{dx^2ddy^2} + \frac{dxddydx^2+dy^2}{dx^2ddy^2}$ .

Mais il faut observer que dans ce dernier cas il n'est pas libre de prendre  $dy$  pour constante, car dans cette supposition la différence  $ddy$  seroit nulle; & par conséquent elle ne devroit pas se rencontrer dans la quantité proposée.

## DÉFINITION II.

Lorsqu'une ligne courbe  $AFK$  est en partie concave & en partie convexe vers une ligne droite  $AB$  ou vers un point fixe  $B$ ; le point  $F$  qui sépare la partie concave de la convexe, & qui par conséquent est la fin de l'une & le commencement de l'autre, est appelé point d'*inflexion*, lorsque la courbe étant parvenue en  $F$  continue son chemin vers le même côté: & point de *rebroussement* lorsqu'elle rebrousse chemin du côté de son origine.

Fig. 52. 53.  
34-55.

## PROPOSITION II.

## Problème général.

66. LA nature de la ligne courbe  $AFK$  étant donnée, déterminer le point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ .

FIG. 52. 53.

Supposons en premier lieu que la ligne courbe  $AFK$  ait pour diamètre une ligne droite  $AB$ , & que ses appliquées  $PM, EF$ , &c. soient toutes parallèles entr'elles. Si l'on mène par le point  $F$ , l'appliquée  $FE$  avec la tangente  $FL$ ; & par un point quelconque  $M$  de la partie  $AF$ , une appliquée  $MP$  avec une tangente  $MT$ : il est clair,

1<sup>o</sup>. Dans les courbes qui ont un point d'inflexion, que la coupée  $AP$  croissant continuellement, la partie  $AT$  du diamètre, interceptée entre l'origine des  $x$  & la rencontre de la tangente, croît aussi jusqu'à ce que le point  $P$  tombe en  $E$ , après quoi elle va en diminuant; d'où l'on voit que  $AT$  étant appliquée en  $P$ , doit devenir un *plus grand*  $AL$  lorsque le point  $P$  tombe sur le point cherché  $E$ .

2<sup>o</sup>. Dans celles qui ont un point de rebroussement, que la partie  $AT$  croissant continuellement, la coupée  $AP$  croît aussi jusqu'à ce que le point  $T$  tombe en  $L$ , après quoi elle va en diminuant; d'où l'on voit que  $AP$  étant appliquée en  $T$  doit devenir un *plus grand*  $AE$  lorsque le point  $T$  tombe en  $L$ .

Or si l'on nomme  $AE, x$ ;  $EF, y$ ; l'on aura  $AL = \frac{ydy}{dy} - x$ , dont la différence, qui est  $\frac{dy^2 dx - y dx dy}{dy^2} - dx$  (en supposant  $dx$  constante), étant divisée par  $dx$  différence de  $AE$ , doit

\* Art. 47. être \* nulle ou infinie; ce qui donne  $-\frac{yddy}{dy^2} = 0$  ou à l'infini: de sorte que multipliant par  $dy^2$ , & divisant par  $-y$ , il vient  $ddy = 0$  ou à l'infini; ce qui servira dans la suite de formule générale pour trouver le point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ . Car la nature de la courbe  $AFK$  étant donnée, l'on aura une valeur de  $dy$  en  $dx$ ; & prenant la différence de cette valeur, en supposant  $dx$  constante, on trouvera une valeur de  $ddy$  en  $dx^2$ , laquelle étant égale d'abord à zero, & ensuite à l'infini, servira

dans l'une ou l'autre de ces suppositions à trouver pour  $AE$  une valeur telle que l'appliquée  $EF$  aille couper la courbe  $AFK$  au point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ .

L'origine  $A$  des  $x$  peut être tellement situé que  $AL = x - \frac{y dx}{dy}$ , au lieu de  $\frac{y dx}{dy} - x$ , & que  $AL$  ou  $AE$  soit un *moindre* au lieu d'être un *plus grand*: mais comme la conséquence est toujours la même, & que cela ne peut faire aucune difficulté, je ne m'y arrêterai pas. Il est à remarquer que  $AL$  ne peut jamais être  $= x + \frac{y dx}{dy}$ , car lorsque le point  $T$  tombe de l'autre côté du point  $P$ , par rapport à l'origine  $A$  des  $x$ , la valeur de  $\frac{y dx}{dy}$  sera négative suivant l'article 10, & par conséquent celle de  $-\frac{y dx}{dy}$  sera positive, de sorte qu'on aura encore en ce cas  $AE + EL$ . ou  $AL = x - \frac{y dx}{dy}$ .

La même chose se peut encore trouver de cette autre manière. Il est clair qu'en prenant  $dx$  pour constante, & supposant que l'appliquée  $y$  augmente,  $Sn$  est moindre que  $SH$  ou que  $Rm$  dans la partie concave, & plus grande dans la convexe. D'où l'on voit que la valeur de  $Hn$  ( $ddy$ ) doit devenir de positive négative sous le point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ ; & partant \* qu'elle y doit être ou nulle ou infinie. \* Art. 47.

Supposons en second lieu que la courbe  $AFK$  ait pour appliquées les droites  $BM, BF, BM$ , qui partent toutes d'un même point  $B$ . Si l'on mène telle appliquée  $BM$  qu'on voudra, avec une tangente  $MT$  qui rencontre  $BT$  perpendiculaire à  $BM$  au point  $T$ ; & qu'ayant pris le point  $m$  infiniment près de  $M$ , l'on tire l'appliquée  $Bm$ , la tangente  $mr$ , & la perpendiculaire  $Bt$  sur  $Bm$ , qui rencontre  $MT$  en  $O$ ; il est visible (en supposant que l'appliquée  $BM$ , qui devient  $Bm$ , augmente) que dans la partie concave,  $Bt$  surpasse  $BO$ , & qu'au contraire elle est moindre dans la partie convexe; de sorte que sous le point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ , la valeur de  $Or$  doit devenir de positive négative.

Cela posé, si l'on décrit du centre  $B$  les petits arcs de cercle  $MR, TH$ , on formera les triangles semblables  $mRM, MBT, THO$ , & les petits secteurs semblables  $BMR, BTH$ . Nommant donc  $BM, y$ ;  $MR, dx$ ; l'on aura  $mR$  ( $dy$ ).  $RM$

FIG. 48. 49.

FIG. 54. 55.

FIG. 56. 57.

FIG. 56.

$(dx) :: BM(y) . BT = \frac{ydx}{dy} :: MR(dx) . TH = \frac{dx^2}{dy} :: TH$   
 $(\frac{dx^2}{dy}) . HO = \frac{dx^3}{dy^2}$ . Or si l'on prend la différence de  $BT$  ( $\frac{ydx}{dy}$ )  
 en supposant  $dx$  constante, il vient  $Bt - BT$  ou  $Ht =$   
 $\frac{dx dy^2 - y^2 dx dy}{dy^3}$ ; & partant  $OH + Ht$  ou  $Ot = \frac{dx^2 + dx dy^2 - y^2 dx dy}{dy^3}$ .

D'où il suit en multipliant par  $dy^2$ , & divisant par  $dx$ , que  
 la valeur de  $dx^2 + dy^2 - yddy$  sera nulle ou infinie sous le  
 point d'inflexion ou de rebroussement  $F$ . Or la nature de  
 la ligne  $AFK$  étant donnée, l'on aura des valeurs de  $dy$  en  
 $dx$ , & de  $ddy$  en  $dx^2$ , lesquelles étant substituées dans  $dx^2$   
 $+ dy^2 - yddy$ , formeront une quantité, qui étant égalee  
 d'abord à zero, & ensuite à l'infini, servira à trouver pour  
 $BF$  une valeur telle que décrivant du centre  $B$ , & de ce  
 rayon un cercle, il coupera la courbe  $AFK$  au point d'in-  
 flexion ou de rebroussement  $F$ . Ce qui étoit proposé.


FIG. 50. 51. Pour trouver encore la même chose d'une autre manière,  
 il faut considérer que dans la partie concave l'angle  $BmE$   
 surpasse l'angle  $Bmn$ , & qu'au contraire dans la convexe il

FIG. 50. est moindre; & partant que l'angle  $EmE - Bmn$  ou  $Emn$ ,  
 c'est à dire l'arc  $En$  qui en est la mesure, devient de positif  
 négatif sous le point cherché  $F$ . Or prenant  $dx$  pour con-  
 stante, les triangles rectangles semblables  $HmS$ ,  $Hnk$ ,  
 donneront  $Hm(du) . mS(dx) :: Hn(-ddy) . nk = -\frac{dx ddy}{dy}$ .  
 ou l'on doit observer que la valeur de  $Hn$  est négative,  
 parceque  $Bm(y)$  croissant,  $Rm(dy)$  diminue. Mais à cause  
 des secteurs semblables  $BmS$ ,  $mEk$ , l'on aura  $Bm(y) . mS$   
 $(dx) :: mE(du) . Ek = \frac{dx du}{dy}$ , & partant  $Ek + kn$  ou  $En =$





FIG. 54. 55.  $\frac{dx du^2 - y dx ddy}{y du}$ . D'où il suit en multipliant par  $y du$ , & divi-  
 sant par  $dx$ , que  $du^2 - yddy$  ou  $dx^2 + dy^2 - yddy$  doit de-  
 venir de positive, négative sous le point cherché  $F$ .

Si l'on suppose que  $y$  devienne infinie, les termes  $dx^2$   
 &  $dy^2$  seront nuls par rapport au terme  $yddy$ ; & par consé-  
 quent la formule  $dx^2 + dy^2 - yddy = 0$  ou à l'infini, se  
 changera en cette autre  $-yddy = 0$  ou à l'infini, c'est à  
 dire en divisant par  $-y$ ,  $ddy = 0$  ou à l'infini, qui est la  
 formule du premier cas. Ce qui doit aussi arriver, puisque



37.



39.



49.



50.



Gravé par Berrey



COROLLAIRE.

67. LORSQUE  $ddy = 0$ , il est clair que la différence FIG. 52.  
 de  $AL$  doit être nulle par rapport à celle de  $AE$ ; & par-  
 tant que les deux tangentes infiniment proches  $FL$ ,  $fL$  doi-  
 vent tomber l'une sur l'autre, en ne faisant qu'une seule li-  
 gne droite  $fFL$ . Mais lorsque  $ddy = \infty$ , la différence FIG. 53.  
 de  $AL$  doit être infiniment grande par rapport à celle de  
 $AE$ , ou ( ce qui est la même chose ) la différence de  $AE$   
 est infiniment petite par rapport à celle de  $AL$ ; & par con-  
 séquent l'on peut mener par le même point  $F$  deux tan-  
 gentes  $FL$ ,  $Ff$  qui fassent entr'elles un angle infiniment  
 petit  $LFL$ .

De même lorsque  $dx^2 + dy^2 - yddy = 0$ , il est visible que FIG. 56. 57.  
 $Or$  doit devenir nulle par rapport à  $MR$ ; & qu'ainsi les deux  
 tangentes infiniment proches  $MT$ ,  $mt$ , doivent tomber  
 l'une sur l'autre, lorsque le point  $M$  devient un point d'in-  
 flexion ou de rebroussement : mais au contraire lorsque  
 $dx^2 + dy^2 - yddy = \infty$ ,  $Or$  doit être infinie par rap-  
 port à  $MR$ , ou ( ce qui est la même chose )  $MR$  infini-  
 ment petite par rapport à  $Or$ ; & par conséquent le point  $m$   
 doit tomber sur le point  $M$ , c'est à dire qu'on peut me-  
 ner par le même point  $M$  deux tangentes qui fassent en-  
 tr'elles un angle infiniment petit, lorsque ce point devient  
 un point d'inflexion ou de rebroussement.

Il est évident que la tangente au point d'inflexion ou  
 de rebroussement  $F$ , étant prolongée, touche & coupe  
 la courbe  $AFK$  dans ce même point.

EXEMPLE I.

68. SOIT une ligne courbe  $AFK$  qui ait pour diame- FIG. 58.  
 tre la ligne droite  $AB$ ; & qui soit telle que la relation de  
 la coupée  $AE$  ( $x$ ) à l'appliquée  $EF$  ( $y$ ), soit exprimée par  
 l'équation  $axx = xy + aay$ . Il s'agit de trouver pour  $AE$   
 une valeur telle que l'appliquée  $EF$  rencontre la courbe  
 $AFK$  au point d'inflexion  $F$ .

L'équation à la courbe est  $y = \frac{axx}{xx+aa}$ ; & partant  $dy = \frac{2a^1 x dx}{xx+aa}$ , & prenant la différence de cette quantité en supposant  $dx$  constante, & l'égalant ensuite à zero, on trouve  $\frac{2a^1 dx^2 \times xx + aa^1 - 8a^1 xx dx^2 \times \frac{xx+aa}{xx+aa}}{xx+aa} = 0$ ; ce qui multiplié par  $xx+aa^4$ , & divisé par  $2a^1 dx^2 \times \frac{xx+aa}{xx+aa}$ , donne  $xx+aa-4xx=0$ , d'où l'on tire  $AE(x) = a\sqrt{\frac{1}{3}}$ .

Si l'on met à la place de  $xx$  sa valeur  $\frac{1}{3}aa$  dans l'équation à la courbe  $y = \frac{axx}{xx+aa}$ , on trouve  $EF(y) = \frac{1}{4}a$ ; de sorte qu'on peut déterminer le point d'inflexion  $F$  sans supposer que la courbe  $AFK$  soit décrite.

Si l'on mène  $AC$  parallèle aux appliquées  $EF$ , & égale à la droite donnée  $a$ , & qu'on tire  $CG$  parallèle à  $AB$ , elle sera asymptote de la courbe  $AFK$ . Car si l'on suppose  $x$  infinie, on pourra prendre  $xx$  pour  $xx+aa$ ; & partant l'équation à la courbe  $y = \frac{axx}{xx+aa}$  se changera en celle-ci  $y = a$ .

#### EXEMPLE II.

69. SOIT  $y-a = \sqrt{x-a^{\frac{1}{3}}}$ . Donc  $dy = \frac{1}{3}\sqrt{x-a}^{-\frac{2}{3}}dx$ , &  $ddy = -\frac{2}{3}\sqrt{x-a}^{-\frac{5}{3}}dx = \frac{-6dx^2}{25\sqrt{x-a}^7}$ , en prenant  $dx$  pour constante. Or si l'on suppose cette fraction égale à zero, on trouve  $-6dx^2 = 0$ ; ce qui ne faisant rien connoître, il la faut supposer infiniment grande; & par conséquent son dénominateur  $25\sqrt{x-a}^7$  infiniment petit ou zero. D'où l'inconnue  $AE(x) = a$ .

#### EXEMPLE III.

FIG. 59. 70. SOIT une demi-roulette allongée  $AFK$  dont la base  $BK$  surpasse la demi-circonférence  $ADB$  du cercle générateur qui a pour centre le point  $C$ . Il s'agit de déterminer sur

sur le diamètre  $AB$ , le point  $E$ , en sorte que l'appliquée  $EF$  aille rencontrer la roulette au point d'inflexion  $F$ .

Ayant nommé les connues  $ADB$ ,  $a$ ;  $BK$ ,  $b$ ;  $AB$ ,  $2c$ ; & les inconnues  $AE$ ,  $x$ ;  $ED$ ,  $z$ ; l'arc  $AD$ ,  $u$ ;  $EF$ ,  $y$ ; l'on aura par la propriété de la roulette  $y = z + \frac{bu}{a}$ ; & par-tant  $dy = dz + \frac{bdu}{a}$ . Or par la propriété du cercle l'on aura

$$z = \sqrt{2cx - xx}, dz = \frac{cdx - xdx}{\sqrt{2cx - xx}}, \& du (\sqrt{dx^2 + dz^2}) = \frac{cdx}{\sqrt{2cx - xx}}.$$

Donc mettant pour  $dz$  &  $du$  leurs valeurs, on trouve  $dy = \frac{acdx - axdx + bcdx}{a\sqrt{2cx - xx}}$ , dont la différence (en prenant  $dx$  pour

constante) donne  $\frac{bcx - acc - bcc \times dx^2}{2cx - xx \times \sqrt{2cx - xx}} = 0$ ; d'où l'on tire  $AE$

$$(x) = c + \frac{ac}{b}, \& CE = \frac{ac}{b}.$$

Il est clair qu'afin qu'il y ait un point d'inflexion  $F$ , il faut que  $b$  surpasse  $a$ ; car s'il étoit moindre,  $CE$  surpasse-roit  $CB$ .

## EXEMPLE IV.

71. ON demande le point d'inflexion  $F$  de la Con. FIG. 60. choïde  $AFK$  de *Nicomede*, laquelle a pour pole le point  $P$ , & pour asymptote la droite  $BC$ . Sa propriété est telle; qu'ayant mené du pole  $P$  à un de ses points quelconques  $F$  la droite  $PF$ , qui rencontre l'asymptote  $BC$  en  $D$ ; la partie  $DF$  est toujours égale à une même droite donnée  $a$ .

Ayant mené  $PA$  perpendiculaire, &  $FE$  parallèle à  $BC$ , on nommera les connues  $AB$  ou  $FD$ ,  $a$ ;  $BP$ ,  $b$ ; & les inconnues  $BE$ ,  $x$ ;  $EF$ ,  $y$ ; & tirant  $DL$  parallèle à  $BA$ , les triangles semblables  $DLF$ ,  $PEF$  donneront  $DL(x)$ .  $LF$

$$(\sqrt{aa - xx}) :: PE(b + x). EF(y) = \frac{b + x\sqrt{aa - xx}}{x}.$$

dont la différence est  $dy = \frac{x^2dx + aabdx}{xx\sqrt{aa - xx}}$ . Si donc on

prend la différence de cette quantité, & qu'on l'égalé à zero, on formera l'égalité  $\frac{2a^2b - aax^2 - 2aabxx \times dx^2}{aax^2 - x^2\sqrt{aa - xx}} = 0$ .

qui se réduit à  $x^3 + 3bxx - 2aab = 0$ , dont l'une des racines fournit pour  $BE$  la valeur cherchée.

Si  $a = b$ , l'équation précédente se changera en cette autre  $x^3 + 3axx - 2a^3 = 0$ , laquelle étant divisée par  $x + a$ , donne  $xx + 2ax - 2aa = 0$ ; & partant  $BE(x) = -a + \sqrt{3aa}$ .

*Autrement.*

En prenant pour appliquées les lignes  $PF$  qui partent  
 \* Art. 66. du pole  $P$ , & en se servant de la formule  $* ydy = dx^2 + dy^2$ , dans laquelle  $dx$  a été supposée constante. Ayant imaginé une autre appliquée  $Pf$  qui fasse avec  $PF$  l'angle  $FPf$  infiniment petit, & décrit du centre  $P$  les petits arcs  $FG, DH$ , on nommera les connues  $AB, a$ ;  $BP, b$ ; & les inconnues  $PF, y$ ;  $PD, z$ ; & l'on aura par la propriété de la conchoïde  $y = z + a$ , ce qui donne  $dy = dz$ . Or à cause du triangle rectangle  $DBP$ ,  $DB = \sqrt{zz - bb}$ ; & à cause des triangles semblables  $DBP$  &  $dHD$ ,  $PDH$  &  $PFH$ , l'on aura  $DB(\sqrt{zz - bb})$ .  $BP(b) :: dH(dz)$ .  $HD = \frac{b dz}{\sqrt{zz - bb}}$ . Et  $PD(z)$ .  $PF(z + a) :: HD(\frac{b dz}{\sqrt{zz - bb}})$ .  $FG(dx) = \frac{b dz + ab dz}{z \sqrt{zz - bb}}$ . D'où l'on tire  $dz$  ou  $dy = \frac{z dx \sqrt{zz - bb}}{bz + ab}$ , dont la différence est (en supposant  $dx$  constante)  $ddy = \frac{bz^2 + 2abz - ab^2 \times dz}{bz + ab \sqrt{zz - bb}} = \frac{bz^2 + 2abz - ab^2 \times dx}{bz + ab}$  en mettant pour  $dz$  sa valeur. Donc si l'on substitue dans la

\* Art. 66. formule générale  $* ydy = dx^2 + dy^2$  à la place de  $y$  sa valeur  $z + a$ , & de  $dy$  &  $ddy$  les valeurs que l'on vient de trouver en  $dx$  &  $dx^2$ ; on formera cette équation

$$\frac{z^4 + 2az^3 - abbz \times dx}{bz + ab} = \frac{z^4 + 2abz^2 + aabb \times dx}{bz + ab} \text{ qui se réduit à}$$

$2z^3 - 3bbz - abb = 0$ , dont l'une des racines augmentée de  $a$  fournit la valeur de l'inconnue  $PF$ .

Si  $a = b$ , l'on aura  $2z^3 - 3aa z - a^3 = 0$ , qui étant divisée par  $z + a$ , donne  $zz - az - \frac{aa}{2} = 0$ , dont la résolution fournit  $PF(z + a) = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}a\sqrt{3} = \frac{1+a\sqrt{3}}{2}$ .

## EXEMPLE V.

72. Soit une autre espèce de Conchoïde  $AFK$ , telle Fig. 60. qu'ayant mené d'un de ses points quelconques  $F$  au pôle  $P$  la droite  $PF$  qui coupe l'asymptote  $BC$  en  $D$ , le rectangle  $PD \times DF$  soit toujours égal au même rectangle  $PB \times BA$ . On demande le point d'inflexion  $F$ .

Si l'on nomme les inconnues  $BE, x$ ;  $EF, y$ ; & les connues  $AB, a$ ;  $BP, b$ ; on aura  $PD \times DF = ab$ ; & les parallèles  $BD, EF$  donneront  $PD \times DF (ab) \cdot PB \times BE (bx) :: \overline{PF}^3 (bb + 2bx + xx + yy) \cdot \overline{PE}^3 (bb + 2bx + xx)$ . Donc  $bbx + 2bxx + x^3 + yyx = abb + 2abx + axx$ , ou  $yy = \frac{abb + 2abx + axx - bbx - 2bxx - x^3}{x}$ , &  $y = b + x\sqrt{\frac{a-x}{x}}$   
 $= \sqrt{ax - xx} + b\sqrt{\frac{a-x}{x}}$ , dont la différence donne  $dy$   
 $= \frac{-axdx + 2xxdx + abdx}{2x\sqrt{ax - xx}}$ ; & prenant encore la différence, on forme l'égalité  $\frac{3ab - axx - 4abx \times dx}{4axx - 4x^2 \times \sqrt{ax - x^2}} = 0$ , qui se réduit à  $x = \frac{3ab}{a + 4b}$  valeur de l'inconnue  $BE$ .

Si l'on fait  $\frac{-axdx + 2xxdx + abdx}{2x\sqrt{ax - xx}}$  valeur de  $dy$  égal à zero, l'on aura  $xx - \frac{1}{4}ax + \frac{1}{4}ab = 0$ , dont les deux racines  $a + \sqrt{aa - 8ab}$  &  $a - \sqrt{aa - 8ab}$  fournissent, lorsque  $a$  surpasse  $8b$ , deux valeurs de  $BH$  &  $BL$ , telles que l'appliquée Fig. 61.  $HM$  est moindre que ses voisines, & l'appliquée  $LN$  plus grande, c'est à dire que les tangentes en  $M$  &  $N$  seront parallèles à l'axe  $AB$ ; & alors le point  $E$  tombera entre les points  $H$  &  $L$ .

Mais lorsque  $a = 8b$ , les lignes  $BH, BE, BL$  seront éga. Fig. 62. les chacune à  $\frac{1}{4}a$ ; & alors la tangente au point d'inflexion  $F$  fera parallèle à l'axe  $AB$ . Et enfin lorsque  $a$  est moindre que  $8b$ , les deux racines seront imaginaires, & par conséquent il n'y aura aucune tangente qui puisse être parallèle à l'axe.

On pourroit encore résoudre cette question en prenant pour appliquées les lignes  $PF$ ,  $Pf$ , qui partent du pôle  $P$ , & en se servant de la formule  $yddy = dx^2 + dy^2$ , comme l'on a fait dans l'exemple précédent.

## EXEMPLE VI.

FIG. 63. 73. SOIT un cercle  $AED$  qui ait pour centre le point  $B$ , avec une ligne courbe  $AFK$  telle qu'ayant mené à discrétion le rayon  $BFE$ , le carré de  $FE$  soit égal au rectangle de l'arc  $AE$  par une droite donnée  $b$ . Il faut déterminer dans cette courbe le point d'inflexion  $F$ .

Ayant nommé l'arc  $AE$ ,  $z$ ; le rayon  $BA$  ou  $BE$ ,  $a$ ; & l'appliquée  $BF$ ,  $y$ ; on aura  $bz = aa - 2ay + yy$ , & (en prenant les différences)  $\frac{ydy - 2ady}{b} = dz = Ee$ . Or à cause des sécateurs semblables  $BEe$ ,  $BFG$ , on fera  $BE (a) \cdot BF (y) :: Ee (\frac{ydy - 2ady}{b}) \cdot FG (dx) = \frac{ydy - 2ady}{ab}$ . dont la différence, en supposant  $dx$  constante, donne  $4ydy^2 - 2ady^2 + 2yyddy - 2ayddy = 0$ ; & partant  $yddy = \frac{ady^2 - ydy^2}{y - a}$ .

Si donc on substitue à la place de  $dx^2$  &  $yddy$  leurs valeurs en  $dy$  dans la formule générale  $yddy = dx^2 + dy^2$ , on formeral'équation  $\frac{ady^2 - ydy^2}{y - a} = \frac{4y^4dy^2 - 2ay^3dy^2 + 2aayydy^2 + aabbdy^2}{aabbb}$  qui se réduit à  $4y^4 - 12ay^3 + 12aay^2 - 4a^2yy + 3aabby - 2a^2bb = 0$ , dont la résolution fournira pour  $BF$  la valeur cherchée.

Il est évident que la courbe  $AFK$ , que l'on peut appeler une *Spirale parabolique*, doit avoir un point d'inflexion  $F$ . Car la circonférence  $AED$  ne différant pas d'abord sensiblement de la tangente en  $A$ , il suit de la nature de la parabole qu'elle doit d'abord être concave vers cette tangente, & qu'ensuite la courbure de la circonférence autour de son centre devenant sensible, elle doit devenir concave vers ce centre.

## EXEMPLE VII.

74. Soit une ligne courbe *AFK* qui ait pour axe la droite *AB*, dont la propriété soit telle qu'ayant mené une tangente quelconque *FB* qui rencontre *AB* au point *B*, la partie interceptée *AB* soit toujours à la tangente *BF* en raison donnée de *m* à *n*. Il est question de déterminer le point de rebroussement *F*. FIG. 64.

Ayant nommé les inconnues & variables *AE*, *x*; *EF*, *y*; l'on aura  $EB = -\frac{ydx}{dy}$  (parce que *x* croissant, *y* diminue),  $FB = \frac{y\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dy}$ . Or par la propriété de la courbe,  $AE + EB$  ou  $AB \left( \frac{x dy - y dx}{dy} \right) \cdot BF \left( \frac{y\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dy} \right) :: m . n$ . Donc  $m\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{nx dy}{y} - ndx$ , & la différence donne  $\frac{m dy ddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \frac{-ny dx dy + nx y ddy - n x dy^2}{y^2}$  en supposant *dx* constante & négative; d'où l'on tire  $ddy = \frac{-ny dx dy - n x dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{m y dy - n x y \sqrt{dx^2 + dy^2}}$ .

Maintenant si l'on fait cette fraction égale à zéro, on trouvera  $-y dx - x dy = 0$ ; ce qui ne fait rien connaître. C'est pourquoi il faut supposer cette fraction égale à l'infini, c'est à dire son dénominateur égal à zéro; ce qui donne  $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{my dy}{nx} = \frac{nx dy - ny dx}{my}$  à cause de l'équation à la courbe, d'où l'on tire  $dx = \frac{nn x dy - m m y dy}{nn x y}$ . Or quarrant chaque membre de l'équation  $my dy = nx \sqrt{dx^2 + dy^2}$ , on trouve encore  $dx = \frac{dy \sqrt{m m y y - n n x x}}{n x} = \frac{nn x dy - m m y dy}{nn x y}$ . d'où l'on tire enfin  $y \sqrt{m m - n n} = n x$ ; ce qui donne cette construction.

Soit décrit du diamètre *AD* = *m*, un demi-cercle *AID*; & ayant pris la corde *DI* = *n*, soit tirée l'indéfinie *AI*. Je dis qu'elle rencontrera la courbe *AFK* au point de rebroussement *F*.

Car ayant mené  $IH$  perpendiculaire à  $AB$ , les triangles rectangles semblables  $DIA$ ,  $IHA$ ,  $FEA$  donneront  $DI(n) \cdot IA(\sqrt{mm} - nn) :: IH.HA :: FE(y) \cdot EA(x)$ . & partant  $y\sqrt{mm} - nn = nx$  qui étoit le lieu à construire.

Il est clair que  $BF$  est parallèle à  $DI$ , puisque  $AB.BF :: AD(m) \cdot DI(n)$ . d'où il suit que l'angle  $AFB$  est droit; & partant que les lignes  $AB, BF, BE$  sont en proportion continue.

On peut trouver cette même propriété sans aucun calcul, si l'on imagine \* au même point de rebroussement  $F$  deux tangentes  $FB, Fb$  qui fassent entr'elles un angle  $BFb$  infiniment petit. Car décrivant du centre  $F$  le petit arc  $BL$ , on aura  $m.n :: Ab.bF :: AB.BF :: Ab - AB$  ou  $Bb.bF - BF$  ou  $bL :: BF.BE$ . à cause des triangles rectangles semblables  $BbL, FBE$ . Donc, &c.

Si  $m = n$ , il est évident que la droite  $AF$  deviendra perpendiculaire sur l'axe  $AB$ ; & qu'ainsi la tangente  $FB$  sera parallèle à cet axe; ce que l'on sçait d'ailleurs devoir arriver, puisqu'en ce cas la courbe  $AF$  doit être un demi-cercle qui ait son diamètre perpendiculaire sur l'axe  $AB$ . Mais si  $m$  étoit moindre que  $n$ , il est évident qu'il n'y auroit aucun point de rebroussement, parcequ'alors l'équation  $y\sqrt{mm} - nn = nx$  renfermeroit une contradiction.



## SECTION V.

*Usage du calcul des différences pour trouver  
les Développées.*

## DÉFINITION.

**S**I l'on conçoit qu'une ligne courbe quelconque  $BDF$  Fig. 65. concave vers le même côté, soit enveloppée ou entourée d'un fil  $ABDF$ , dont l'une des extrémités soit fixe en  $F$ , & l'autre soit tendue le long de la tangente  $BA$ , & que l'on fasse mouvoir l'extrémité  $A$  en la tenant toujours tendue & en développant continuellement la courbe  $BDF$ ; il est clair que l'extrémité  $A$  de ce fil décrira dans ce mouvement une ligne courbe  $AHK$ .

Cela posé, la courbe  $BDF$  sera nommée la *Développée* de la courbe  $AHK$ .

Les parties droites  $AB$ ,  $HD$ ,  $KF$  du fil  $ABDF$  seront nommées les *rayons de la développée*.

## COROLLAIRE I.

75. **D**E ce que la longueur du fil  $ABDF$  demeure toujours la même, il suit que la portion de courbe  $BD$  est égale à la différence des rayons  $DH$ ,  $BA$  qui partent de ses extrémités; de même la portion  $DF$  sera égale à la différence des rayons  $FK$ ,  $DH$ ; & la courbe entière  $BDF$  à la différence des rayons  $FK$ ,  $BA$ . D'où l'on voit que si le rayon  $BA$  de la courbe étoit nul, c'est à dire que si l'extrémité  $A$  du fil tomboit sur l'origine  $B$  de la courbe  $BDF$ , alors les rayons de la développée  $DH$ ,  $FK$  seroient égaux aux portions  $BD$ ,  $BDF$  de la courbe  $BDF$ .

## COROLLAIRE II.

76. **S**I l'on considère la courbe  $BDF$  comme un polygone Fig. 66.  $BCDEF$  d'une infinité de côtés, il est clair que l'extrémité  $A$  du fil  $ABCDEF$  décrit le petit arc  $AG$  qui a pour

centre le point  $C$ , jusqu'à ce que le rayon  $CG$  ne fasse plus qu'une ligne droite avec le petit côté  $CD$  voisin de  $CB$ ; & de même qu'elle décrit le petit arc  $GH$  qui a pour centre le point  $D$ , jusqu'à ce que le rayon  $DH$  ne fasse plus qu'une droite avec le petit côté  $DE$ ; & ainsi de suite jusqu'à ce que la courbe  $BCDEF$  soit entièrement développée. La courbe  $AHK$  peut être donc considérée comme l'assemblage d'une infinité de petits arcs de cercle  $AG, GH, HI, IK$ , &c. qui ont pour centre les points  $C, D, E, F$ , &c. D'où il suit,

1°. Que les rayons de la développée la touchent continuellement comme  $DH$  en  $D$ ,  $KF$  en  $F$ , &c. Et qu'ils sont tous perpendiculaires à la courbe  $AHK$  qu'ils décrivent, comme  $DH$  en  $H$ ,  $FK$  en  $K$ , &c. Car  $DH$ , par exemple, est perpendiculaire sur le petit arc  $GH$  & sur le petit arc  $HI$ , puisqu'elle passe par leurs centres  $D, E$ . D'où

FIG. 65. l'on voit, 1°. que la développée  $BDF$  termine l'espace où tombent toutes les perpendiculaires à la courbe  $AHK$ .

2°. Que si l'on prolonge un rayon quelconque  $HD$  qui coupe le rayon  $AB$  en  $R$ , jusqu'à ce qu'il rencontre un autre rayon quelconque  $KF$  en  $S$ , l'on pourra toujours mener de tous les points de la partie  $RS$  deux perpendiculaires sur la courbe  $AHK$ , excepté du point touchant  $D$  duquel on n'en peut mener qu'une seule, sçavoir  $DH$ . Car il est clair que l'intersection  $R$  des rayons  $AB, DH$  parcourt tous les points de la partie  $RS$ , pendant que le rayon  $AB$  décrit par son extrémité  $A$  la ligne  $AHK$  sur laquelle il est continuellement perpendiculaire: & que les rayons  $AB, HD$  ne se confondent que lorsque l'intersection  $R$  tombe sur le point touchant  $D$ .

FIG. 66. 2°. Que si l'on prolonge les petits arcs  $HG$  en  $l$ ,  $IH$  en  $m$ ,  $KI$  en  $n$ , &c. vers l'origine  $A$  du développement, chaque petit arc comme  $IH$  touchera en dehors son voisin  $HG$ , parce que les rayons  $CA, DG, EH, FI$  vont toujours en augmentant, à mesure que les petits arcs qui composent la courbe  $AHK$ , s'éloignent du point  $A$ . Par la même raison si l'on prolonge les petits arcs  $AG$  en  $o$ ,  $GH$  en  $p$ ,  
HI

*HI* en *q*, vers le côté opposé au point *A*, chaque petit arc comme *HI* touchera en dessous son voisin *IK*. Or puisque les points *H* & *I*, *D* & *E* peuvent être considérés comme tombant l'un sur l'autre à cause de l'infinie petitesse tant de l'arc *HI*, que du côté *DE*; il s'ensuit que si l'on décrit d'un point quelconque moyen *D* de la développée *BDF* comme centre, & de son rayon *DH* un cercle *mHp*, il touchera en dehors la partie *HA* qui tombera toute entière au dedans de ce cercle, & en dedans de l'autre partie *HK* qui tombera toute entière au dehors de ce même cercle : c'est à dire qu'il touchera & coupera la courbe *AHK* au même point *H*, de même que la tangente au point d'inflexion coupe la courbe dans ce point.

3°. Le rayon *HD* du petit arc *HG*, ne différant des rayons *CG*, *EH* des arcs voisins *GA*, *HI*, que d'une quantité infiniment petite *CD* ou *DE*; il s'ensuit que pour peu qu'on diminue le rayon *DH*, il sera moindre que *CG*, & qu'ainsi son cercle touchera en dessous la partie *HA*; & qu'au contraire pour peu qu'on l'augmente, il surpassera *HE*, & qu'ainsi son cercle touchera en dehors la partie *HK*: de sorte que le cercle *mHp* est le plus petit de tous ceux qui touchent en dehors la partie *HA*, & au contraire le plus grand de tous ceux qui touchent en dedans la partie *HK*: c'est à dire qu'entre ce cercle & la courbe on n'en peut faire passer aucun autre.

4°. Comme la courbure des cercles augmente à proportion que leurs rayons diminuent, il s'ensuit que la courbure du petit arc *HI* sera à la courbure du petit arc *AG* réciproquement comme le rayon *BA* ou *CA* de ce dernier est à son rayon *DH* ou *EH*: c'est à dire que la courbure en *H* de la courbe *AHK* sera à sa courbure en *A* comme le rayon *BA* au rayon *DH*, & de même que la courbure en *K* est à la courbure en *H* comme le rayon *DH* est au rayon *FK*. D'où l'on voit que la courbure de la ligne *AHK* diminue continuellement à mesure que la ligne *BDF* se développe, de sorte qu'au point *A*, où commence le développement, elle est la plus grande qu'il est possible;

K

& au point  $K$ , où je suppose qu'il cesse, la plus petite.

5°. Que les points de la développée ne sont autre chose que le concours des perpendiculaires menées par les extrémités des petits arcs qui composent la courbe  $AHK$ . Par exemple, le point  $D$  ou  $E$  est le concours des perpendiculaires  $HD$ ,  $IE$  du petit arc  $HI$ ; de sorte que si la courbe  $AHK$  est donnée avec la position d'une de ses perpendiculaires  $HD$ , pour trouver le point  $D$  ou  $E$ , où elle touche la développée, il ne faut que chercher le point de concours des perpendiculaires infiniment proches  $HD$ ,  $IE$ : c'est ce qu'on va enseigner dans le Problème qui suit.

### PROPOSITION I.

#### Problème général.

FIG. 67. 77°. **L**A nature de la ligne courbe  $AMD$  étant donnée avec une de ses perpendiculaires quelconque  $MC$ ; déterminer la longueur du rayon  $MC$  de sa développée: c'est à dire le concours des perpendiculaires infiniment proches  $MC$ ,  $mC$ .

Supposons en premier lieu que la ligne courbe  $AMD$  ait pour axe la ligne droite  $AB$  sur laquelle les appliquées  $PM$  soient perpendiculaires. On imaginera une autre appliquée  $mp$ , qui sera infiniment proche de  $MP$ ; puisque le point  $m$  est supposé infiniment près de  $M$ . On mènera par le point de concours  $C$  une parallèle  $CE$  à l'axe  $AB$ , laquelle rencontre les appliquées  $MP$ ,  $mp$  aux points  $E$ ,  $e$ . Enfin menant  $MR$  parallèle à  $AB$ , on formera les triangles rectangles semblables  $MRm$ ,  $MEC$ ; car les angles  $EMR$ ,  $CMm$  étant droits, & l'angle  $CMR$  leur étant commun, l'angle  $EMC$  sera égal à l'angle  $RMm$ .

Si donc l'on nomme les données  $AP$ ,  $x$ ;  $PM$ ,  $y$ ; l'inconnue  $ME$ ,  $z$ ; l'on aura  $Ee$  ou  $Pp$  ou  $MR = dx$ ,  $Rm = dy = dz$ ,  $Mm = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ; &  $MR(dx) \cdot Mm(\sqrt{dx^2 + dy^2}) :: ME(z) \cdot MC = \frac{x\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx}$ . Or le point  $C$  étant le centre du petit arc  $Mm$ , son rayon  $CM$  qui devient  $Cm$  lors-

que  $EM$  augmente de sa différence  $Rm$ , demeure le même. Sa différence sera donc nulle : ce qui donne ( en supposant  $dx$  constante )  $\frac{dz dx^2 + dz dy^2 + z dy ddy}{dx \sqrt{dx^2 + dy^2}} = 0$  ; d'où l'on tire

$$ME(z) = \frac{dz dx^2 + dz dy^2}{-dy ddy} = \frac{dx^2 + dy^2}{-ddy} \text{ en mettant pour } dz \text{ sa valeur } dy.$$

Supposons en second lieu que les appliquées  $BM, Bm$  Fig. 68. partent toutes d'un même point  $B$ . Ayant mené du point cherché  $C$  sur les appliquées, que je suppose infiniment proches, les perpendiculaires  $CE, Ce$ , & décrit du centre  $B$  le petit arc  $MR$  ; on formera les triangles rectangles semblables  $RMm$  &  $EMC, BMR, BEG$  &  $CeG$ . C'est pourquoi nommant  $BM, y$  ;  $ME, z$  ;  $MR, dx$  ; on aura  $Rm = dy$ ,  $Mm = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ,  $CE$  ou  $Ce = \frac{z dy}{dx}$ , &  $MC = \frac{z \sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx}$ . On trouvera ensuite, comme dans le premier cas,  $z = \frac{dz dx^2 + dz dy^2}{-dy ddy}$ . Or  $BM(y) \cdot Ce(\frac{z dy}{dx}) :: MR(dx) \cdot Ge(\frac{z dy}{y})$ . &  $me - ME$  ou  $Rm - Ge = dz = \frac{y dy - z dy}{y}$ . Donc en mettant cette valeur à la place de  $dz$ , l'on aura  $ME(z) = \frac{y dx^2 + y dy^2}{dx^2 + dy^2 - y ddy}$ .

Si l'on suppose que  $y$  soit infinie, les termes  $dx^2$  &  $dy^2$  seront nuls par rapport à  $y ddy$  ; & par conséquent cette dernière formule se changera en celle du cas précédent. Ce qui doit aussi arriver ; puisque les appliquées deviennent alors parallèles entr'elles, & que l'arc  $MR$  devient une droite perpendiculaire sur les appliquées.

Maintenant la nature de la courbe  $AMD$  étant donnée, on trouvera des valeurs de  $dy^2$  &  $ddy$  en  $dx^2$ , ou de  $dx^2$  &  $ddy$  en  $dy^2$ , lesquelles étant substituées dans les formules précédentes, donneront pour  $ME$  une valeur délivrée des différences, & entièrement connue. Et menant  $EC$  perpendiculaire sur  $ME$ , elle ira couper  $MC$  perpendiculaire à la courbe, au point cherché  $C$ . Ce qui étoit proposé.

## COROLLAIRE I.

Fig. 67. 68. 78. A cause des triangles rectangles semblables  $MRm$  &  $MEC$ , l'on aura dans le premier cas  $MC = \frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dx dy}$ , & dans le second cas  $MC = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2} \sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx^2 + dx dy^2 - y dx dy}$ .

## REMARQUE.

79. Il y a encore plusieurs autres manières de trouver les rayons de la développée. J'en mettrai ici une partie, afin de donner différentes ouvertures à ceux qui ne possèdent pas encore ce calcul.

*Premier cas pour les courbes dont les appliquées sont perpendiculaires à l'axe.*

Fig. 67. Première manière. Soit prolongée  $MR$  en  $G$  où elle rencontre la perpendiculaire  $mC$ . Les angles droits  $MRm$ ,  $MmG$  donneront  $RG = \frac{dy^2}{dx}$ ; & par conséquent  $MG = \frac{dx^2 + dy^2}{dx}$ . Or à cause des triangles semblables  $MRm$ ,  $MPQ$  (les points  $Q$ ,  $q$  marquent les intersections des perpendiculaires infiniment proches  $MC$ ,  $mC$  avec l'axe  $AB$ ) il vient  $MQ = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx}$ ,  $PQ = \frac{y dy}{dx}$ ; & partant  $AQ = x + \frac{y dy}{dx}$ , dont la différence donne (en prenant  $dx$  pour constante)  $Qq = dx + \frac{dy^2 + y ddy}{dx}$ , & à cause des triangles semblables  $CMG$ ,  $CQq$ , l'on aura  $MG - Qq \left( \frac{-y ddy}{dx} \right) \cdot MG \left( \frac{dx^2 + dy^2}{dx} \right) :: MQ \left( \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx} \right) \cdot MC = \frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dx dy}$ .

Seconde manière. Ayant décrit du centre  $C$  le petit arc  $QO$ , les petits triangles rectangles  $QOq$ ,  $MRm$  seront semblables, puisque  $Mm$ ,  $QO$  &  $MR$ ,  $Qq$  sont parallèles; & partant  $Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2}) \cdot MR (dx) :: Qq \left( \frac{dx^2 + dy^2}{dx} + y ddy \right)$ .  $QO = \frac{dx^2 + dy^2 + y ddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$ . Or les sécateurs semblables  $CMm$ ,

C20 donnent  $Mm \rightarrow QO \left( \frac{-yddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \right) \cdot Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2})$ .  
 $:: MQ \left( \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx} \right) \cdot MC = \frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dxddy}$ .

Troisième maniere. Menant les tangentes infiniment proches  $MT, mt$ , on aura  $PT - AP$  ou  $AT = \frac{ydx}{y} - x$ , dont la différence donne  $Tt = -\frac{ydxddy}{dy^2}$ ; & décrivant du centre  $m$  le petit arc  $TH$ , on formera le triangle rectangle  $HTt$  semblable à  $RmM$ , car les angles  $HtT, RmM$  ou  $PTM$  sont égaux, ne différant entr'eux que de l'angle  $Tmt$  qui est infiniment petit; ce qui donne  $Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2}) \cdot mR(dy) :: Tt \left( -\frac{ydxddy}{dy^2} \right) \cdot TH = \frac{-ydxddy}{dy \sqrt{dx^2 + dy^2}}$ . Or les sécateurs  $TmH, MCm$  sont semblables, car l'angle  $Tmt + MmC$  vaut un droit, & l'angle  $MmC + MCm$  vaut aussi un droit à cause du triangle  $CMm$  considéré comme rectangle en  $M$ . Donc  $TH \left( -\frac{ydxddy}{dy \sqrt{dx^2 + dy^2}} \right) \cdot Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2}) :: Tm$  ou  $TM \left( \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dy} \right) \cdot MC = \frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dxddy}$ .

Quatrième maniere. On marquera \* les différences se. \* Art. 64. condes en prenant  $dx$  pour constante; & les triangles ré- FIG. 69. ctangles semblables  $HmS, Hnk$  donneront  $Hm$  ou  $Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2}) \cdot mS$  ou  $MR(dx) :: Hn (-ddy) \cdot nk = -\frac{dxddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$ . Or l'angle  $kmn$  est égal à celui que font entr'elles les tangentes aux points  $M, m$ ; & partant comme l'on vient de prouver, égal à l'angle  $MCm$ ; d'où il suit que les sécateurs  $nmk, MCm$  sont semblables, & qu'ainsi  $nk \left( -\frac{dxddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \right) \cdot mk$  ou \*  $Mm (\sqrt{dx^2 + dy^2}) :: Mm$  \* Art. 2.  $(\sqrt{dx^2 + dy^2}) \cdot MC = \frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dxddy}$ . On prend  $mH$  ou  $Mm$  pour  $mk$ , parcequ'elles ne diffèrent entr'elles que de la petite droite  $Hk$  infiniment moindre qu'elles; de même que  $Hn$  est infiniment moindre que  $Rm$  ou  $Sn$ .

*Second cas pour les courbes dont les appliquées partent d'un même point fixe.*

FIG. 68. Première manière. Ayant mené du point fixe  $B$  les perpendiculaires  $BF, Bf$  sur les rayons infiniment proches  $CM, Cm$ ; les triangles rectangles  $mMR, BMF$ , qui sont semblables (puisque'ajoutant aux angles  $mMR, BMF$  le même angle  $FMR$ , ils composent chacun un angle droit), donneront

$$MF \text{ ou } MH = \frac{y dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}, \text{ \& } BF = \frac{y dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \text{ dont la différence (en prenant } dx \text{ pour constante) est } Bf - BF \text{ ou } Hf$$

$$= \frac{dx^2 dy^2 + dy^4 + y dx^2 dy}{dx^2 + dy^2 \times \sqrt{dx^2 + dy^2}}. \text{ Or à cause des sécateurs semblables}$$

$CMm, CHf$ , on forme cette proportion  $Mm - Hf . Mm$

$$:: MH . MC, \text{ \& partant } MC = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2} y dx^2 + dy^2}{dx^2 + dx dy^2 - y dx dy}.$$

\* Art. 64. Seconde manière. On marquera \* les différences secon-

FIG. 70. des en supposant  $dx$  constante; \& les sécateurs semblables

$$BmS, mEk \text{ donneront } Bm(y) . mS(dx) :: mE(\sqrt{dx^2 + dy^2}).$$

$$Ek = \frac{dx y dx^2 + dy^2}{y}. \text{ Or à cause des triangles rectangles}$$

semblables  $HmS, Hnk$ , l'on aura  $Hm$  ou  $Mm(\sqrt{dx^2 + dy^2}).$

$$mS \text{ ou } MR(dx) :: Hn(-ddy) . nk = -\frac{dx ddy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}. \text{ Et}$$

$$\text{partant } En = \frac{dx^2 + dx dy^2 - y dx ddy}{y \sqrt{dx^2 + dy^2}}; \text{ \& prenant une troisié-}$$

me proportionnelle à  $En, Em$  ou  $Mm$ , les sécateurs semblables  $Emn, MCm$  donneront pour  $MC$  la même valeur qu'auparavant.

Si l'on nomme  $Mm(\sqrt{dx^2 + dy^2}), du$ ; \& qu'on prenne  $dy$  pour constante au lieu de  $dx$ , on trouvera dans

le premier cas  $MC = \frac{du^2}{dy ddx}$ , \& dans le second  $MC$

$$= \frac{y du^2}{dx du^2 + y dy ddx}. \text{ Et enfin si l'on prend } du \text{ pour constan-}$$

te, il vient dans le premier cas  $MC = \frac{dx du}{-ddy}$  ou  $\frac{dy du}{u dx}$

(parceque la différence de  $dx^2 + dy^2 = du^2$  est  $dx ddx$

+  $dydy = 0$ , & qu'ainsi  $\frac{dx}{dy} = \frac{dy}{dx}$ ; & dans le second,

$$MC = \frac{ydxdu}{dx^2 - ydy} \text{ ou } \frac{ydydu}{dxdy + yaux}.$$

## COROLLAIRE II.

80. COMME l'on ne trouve pour  $ME$  ou  $MC$  qu'une seule valeur, il s'ensuit qu'une ligne courbe  $AMD$  ne peut avoir qu'une seule développée  $BCG$ .

## COROLLAIRE III.

81. SI la valeur de  $ME$  ( $\frac{dx^2 + dy^2}{-dy}$ ) ou ( $\frac{ydx^2 + ydy^2}{dxx^2 + dy^2 - ydy}$ ) est positive, il faudra prendre le point  $E$  du même côté de l'axe  $AB$  ou du point  $B$ , comme l'on a supposé en faisant le calcul; d'où l'on voit que la courbe sera alors concave vers cet axe ou ce point. Mais si la valeur de  $ME$  est négative, il faudra prendre le point  $E$  du côté opposé; d'où l'on voit que la courbe sera alors convexe. De sorte qu'au point d'inflexion ou de rebroussement qui separe la partie concave de la convexe, la valeur de  $ME$  doit devenir de positive négative; & partant les perpendiculaires infiniment proches ou contigues doivent devenir de convergentes divergentes. Or cela ne se peut faire qu'en deux manières. Car ou elles vont en croissant à mesure qu'elles approchent du point d'inflexion ou de rebroussement; & il faudra pour lors qu'elles deviennent parallèles, c'est à dire que le rayon de la développée soit infini: ou elles vont en diminuant; & il faudra nécessairement alors qu'elles tombent l'une sur l'autre, c'est à dire que le rayon de la développée soit zero. Tout ceci s'accorde parfaitement avec ce que l'on a démontré dans la section précédente.

## REMARQUE.

82. COMME l'on a cru jusqu'ici que le rayon de la développée étoit toujours infiniment grand au point d'in-

flexion, il est à propos de faire voir qu'il y a, pour ainsi dire, une infinité de genres de courbes qui ont toutes dans leur point d'inflexion le rayon de la développée égal à zero; au lieu qu'il n'y en a qu'un seul genre dans lequel ce rayon soit infini.

FIG. 71. Soit  $BAC$  une des courbes qui ont dans leur point d'inflexion  $A$  le rayon de la développée infini. Si l'on développe les parties  $BA, AC$ , en commençant au point  $A$ ; il est clair qu'on formera une ligne courbe  $DAE$  qui aura aussi un point d'inflexion dans le même point  $A$ , mais dont le rayon de la développée en ce point sera égal à zero. Et si l'on forme de la même sorte une troisième courbe par le développement de la seconde  $DAE$ , & une quatrième par le développement de la troisième, & ainsi de suite à l'infini; il est clair que le rayon de la développée dans le point d'inflexion  $A$  de toutes ces courbes, seroit toujours égal à zero. Donc, &c.

## PROPOSITION II.


### Problème.

FIG. 72. 83. **T**ROUVER dans les courbes  $AMD$ , où l'axe  $AB$  fait avec la tangente en  $A$  un angle droit, le point  $B$  où cet axe touche la développée  $BCG$ .


Si l'on suppose que le point  $M$  devienne infiniment près du sommet  $A$ , il est clair que la perpendiculaire  $MQ$  rencontrera l'axe au point cherché  $B$ ; d'où il suit que si l'on cherche en général la valeur de  $PQ$  ( $\frac{y^2}{2x}$ ) en  $x$  ou en  $y$ , & qu'on fasse ensuite  $x$  ou  $y = 0$ , on déterminera le point  $P$  à tomber sur le point  $A$ , & le point  $Q$  sur le point cherché  $B$ ; c'est à dire que  $PQ$  deviendra alors égale à la cherchée  $AB$ . Ceci s'éclaircira par les exemples qui suivent.

### EXEMPLE I.



FIG. 72. 84. **S**OIT la courbe  $AMD$  une Parabole qui ait pour para-



55




57




58



60



64



67



Gravé par Berry

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in the following order: the address of the member of the committee, the address of the member of the sub-committee, and the address of the member of the advisory committee.

parametre la droite donnée  $a$ . L'équation à la parabole est  $ax = yy$ , dont la différence donne  $dy = \frac{adx}{2y} = \frac{adx}{2\sqrt{ax}}$ ; & prenant la différence de cette dernière équation, en supposant  $dx$  constante, on trouve  $ddy = \frac{-adx^{\frac{1}{2}}}{4x\sqrt{ax}}$ . Substituant enfin ces valeurs à la place de  $dy$  & de  $ddy$  dans la formule  $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$ , on aura \*  $ME = \frac{a + 4x\sqrt{ax}}{a} = \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$ . \* Art. 77.

Ce qui donne cette construction.

Soit menée par le point  $T$  où la tangente  $MT$  rencontre l'axe, la ligne  $TE$  parallèle à  $MC$ ; je dis qu'elle rencontre  $MP$  prolongée au point cherché  $E$ . Car les angles droits  $MPT$ ,  $MTE$  donnent  $MP(\sqrt{ax})$ .  $PT(2x) :: PT(2x)$ .  $PE = \frac{4xx}{\sqrt{ax}} = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$ ; & par conséquent  $MP + PE = \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$ .

De plus à cause des triangles rectangles  $MPQ$ ,  $MEC$ , l'on aura  $PM(\sqrt{ax})$ .  $PQ(\frac{1}{2}a) :: ME(\sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a})$ .  $EC$  ou  $PK = \frac{1}{2}a + 2x$ . & partant  $QK = 2x$ . Ce qui donne cette nouvelle construction.

Soit prise  $QK$  double de  $AP$ , ou (ce qui revient au même) soit prise  $PK$  égale à  $TQ$ , & soit menée  $KC$  parallèle à  $PM$ . Elle rencontrera la perpendiculaire  $MC$  en un point  $C$  qui sera à la développée  $BCG$ .

Autre manière.  $yy = ax$ , &  $2ydy = adx$  dont la différence (en supposant  $dx$  constante) donne  $2dy^2 + 2yddy = 0$ ; d'où l'on tire  $-ddy = \frac{dy^2}{y}$ . Et mettant cette valeur dans la formule  $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$ , on trouve \*  $ME = \frac{ydy^2 + ydx^2}{dy^2}$ ; & partant \* Art. 77.

$EC$  ou  $PK = \frac{ydy^2 + ydx^2}{dydx} = \frac{ydy}{dx} + \frac{ydx}{dy} = PQ + PT$  ou  $TQ$ . Ce qui donne les mêmes constructions qu'auparavant. Car  $MP$ .  $PT :: dy$ .  $dx :: PT(\frac{dx}{dy})$ .  $PE = \frac{ydx^2}{dy^2} = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$ .

Pour trouver à présent le point  $B$  où l'axe  $AB$  touche la développée  $BCG$ . On a  $PQ(\frac{7dy}{dx}) = \frac{1}{2}a$ . Or comme cette quantité est constante, elle demeurera toujours la même en quelque endroit que se trouve le point  $M$ . Et ainsi, lorsqu'il tombe sur le sommet  $A$ , l'on aura encore  $PQ$  qui devient en ce cas  $AB = \frac{1}{2}a$ .

Pour trouver la nature de la développée  $BCG$  à la manière de *Descartes*. On nommera la coupée  $BK, u$ ; l'appliquée  $KC$  ou  $PE, t$ ; d'où l'on aura  $CK(t) = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$  &  $AP + PK - AB(u) = 3x$ ; mettant donc pour  $x$  sa valeur  $\frac{1}{4}u$  dans l'équation  $t = \frac{4x\sqrt{ax}}{a}$ , l'on en formera une nouvelle  $27att = 16u^3$  qui exprimera la relation de  $BK$  à  $KC$ . D'où l'on voit que la développée  $BCG$  de la parabole ordinaire est une seconde parabole cubique dont le paramètre est égal à  $\frac{17}{16}$  du paramètre de la parabole donnée.

FIG. 73. Il est visible que la développée  $CBC$  de la parabole commune entière  $MAM$  a deux parties  $CB, BC$  qui ont leurs convexités opposées l'une à l'autre, de sorte qu'elles forment en  $B$  un point de rebroussement.

#### AVERTISSEMENT.

FIG. 71. On entend par courbes géométriques  $AMD, BCG$  celles dont la relation des coupées  $AP, BK$  aux appliquées  $PM, KC$ , se peut exprimer par une équation où il ne se rencontre point de différences; & on prend pour géométrique tout ce qu'on peut faire par le moyen de ces lignes. L'on suppose ici que les coupées & les appliquées soient des lignes droites.

#### COROLLAIRE.

85. LORSQUE la courbe donnée  $AMD$  est géométrique, il est clair que l'on pourra toujours trouver (comme dans cet exemple) une équation qui exprime la nature de

sa développée  $BCG$  ; & qu'ainsi cette développée sera aussi géométrique. Mais je dis de plus qu'elle sera rectifiable, c'est-à-dire qu'on pourra trouver géométriquement des lignes droites égales à une de ses portions quelconque  $BC$  ; car il est évident\* que l'on déterminera avec le secours \* Art. 73. de la ligne  $AMD$ , qui est géométrique, sur la tangente  $CM$  de la portion  $BC$ , un point  $M$  tel que la droite  $CM$  ne diffère de la portion  $BC$  que d'une droite donnée  $AB$ .

## EXEMPLE II.

86. SOIT la courbe donnée  $MDM$  une hyperbole en- Fig. 74.  
tre ses asymptotes, qui ait pour équation  $aa = xy$ .

On aura  $\frac{aa}{y} = x$ ,  $\frac{-aady}{yy} = dx$ , & supposant  $dx$  constante, \*  $\frac{-aadydy + 2aady^2}{y^3} = 0$  ; d'où l'on tire  $ddy = \frac{2dy^2}{y}$  ; & \* Art. 1.  
mettant cette valeur dans  $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$ , il vient\*  $ME = \frac{ydx^2 + ydy^2}{-2dy^2}$  : \* Art. 77.  
de sorte que  $EC$  ou  $PK = -\frac{ydy}{2dx} - \frac{ydx}{2dy}$ . Ce qui donne ces constructions.

Soit menée par le point  $T$  où la tangente  $MT$  rencontre l'asymptote  $AB$ , la ligne  $TS$  parallèle à  $MC$  & qui rencontre  $MP$  prolongée en  $S$  ; soit prise  $ME$  égale à la moitié de  $MS$  de l'autre côté de l'asymptote (que l'on regarde ici comme l'axe) parce que sa valeur est négative ; ou bien soit prise  $PK$  égale à la moitié de  $TQ$  du même côté du point  $T$  : je dis que si l'on mène  $EC$  parallèle ou  $KC$  perpendiculaire à l'axe, elles couperont la droite  $MC$  au point cherché  $C$ . Car il est clair que  $MS = \frac{ydx^2 + ydy^2}{dy^2}$ , & que  $TQ = \frac{ydy}{dx} + \frac{ydx}{dy}$ .

Si l'on fait quelque attention sur la figure de l'hyperbole  $MDM$ , on verra que sa développée  $CLC$  doit avoir un point de rebroussement  $L$ , de même que la développée de la parabole. Pour le déterminer je remarque que le rayon  $DL$  de la développée est plus petit que tout autre rayon

\* Art. 78.  $MC$  ; d'où il suit que la différence de son expression \*

\* Seél. 3.  $\frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dxdy}$  ou  $\frac{dx^2 + dy^2}{-dxdy}$  sera \* nulle ou infinie. Ce qui donne , en prenant toujours  $dx$  pour constante ,  

$$\frac{-3dxdyddy^2 dx^2 + dy^2 \frac{1}{2} + dxdddxdx^2 + dy^2 \frac{1}{2}}{dx^2 dy^2} = 0 \text{ ou } \infty ;$$
 d'où en

divisant par  $dx^2 + dy^2 \frac{1}{2}$  , & multipliant ensuite par  $dxdy^2$  , on tire cette équation  $dx^2 ddy + dy^2 ddy - 3dyddy^2 = 0$  ou  $\infty$  , qui servira à trouver pour  $x$  une valeur  $AH$  telle que menant l'appliquée  $HD$  & le rayon  $DL$  de la développée , le point  $L$  sera le point de rebroussement cherché.

On a dans cet exemple  $y = \frac{ax}{x}$  ,  $dy = \frac{-axdx}{x^2}$  ,  $ddy = \frac{2axdx^2}{x^3}$  ,  $ddy = \frac{-6axdx^2}{x^3}$  . C'est pourquoi mettant ces valeurs dans l'équation précédente , on trouve  $AH(x) = a$  . D'où il suit que le point  $D$  est le sommet de l'hyperbole , & que les lignes  $AD$  ,  $DL$  ne font qu'une même droite  $AL$  qui en est l'axe.

### EXEMPLE II.

FIG. 72. 74. 87. SOIT l'équation générale  $y^m = x$  qui exprime la nature de toutes les paraboles à l'infini lorsque l'exposant  $m$  marque un nombre positif entier ou rompu , & de toutes les hyperboles lorsqu'il marque un nombre négatif.

On aura  $my^{m-1}dy = dx$  dont la différence donne , en prenant  $dx$  pour constante ,  $mm - my^{m-1}dy + my^{m-1}ddy = 0$  ; & en divisant par  $my^{m-1}$  , il vient  $-ddy = \frac{m-1dy^2}{y}$  ;

\* Art. 77. d'où mettant cette valeur dans  $\frac{dx^2 + dy^2}{-dxdy}$  , on tirera \*  $ME = \frac{ydx^2 + ydy^2}{m-1dy^2}$  ; & partant  $EC$  ou  $PK = \frac{ydy}{m-1dx} + \frac{ydx}{m-1dy}$  .

Ce qui donne ces constructions générales.

Soit menée par le point  $T$  où la tangente  $MT$  rencontre l'axe  $AP$  , la ligne  $TS$  parallèle à  $MC$  & qui rencontre

$MP$  prolongée au point  $S$ ; soit prise  $ME = \frac{1}{m-1}MS$ , ou bien soit prise  $PK = \frac{1}{m-1}TQ$ : il est clair que si l'on mène par le point  $E$  une parallèle, ou par le point  $K$  une perpendiculaire à l'axe, elles rencontreront  $MC$  au point cherché  $C$ .

Si  $m$  est négatif, comme il arrive dans les hyperboles, la valeur de  $ME$  sera négative; & par conséquent elles seront convexes vers leur axe qui sera alors une asymptote. Mais dans les paraboles où  $m$  est positif, il peut arriver deux cas. Car ou  $m$  sera moindre que 1, & alors elles seront convexes du côté de leur axe, qui sera une tangente au sommet: ou  $m$  surpasse 1, & alors elles seront concaves vers leur axe qui sera perpendiculaire au sommet.

Pour trouver dans ce dernier cas le point  $B$  où l'axe  $AB$  touche la développée. On a  $PQ \left( \frac{ydy}{dx} \right) = \frac{2^{1-m}}{m}$ ; ce qui donne trois différens cas. Car ou  $m=2$ , ce qui n'arrive que dans la parabole ordinaire, & alors l'exposant de  $y$  étant nul, cette inconnue s'évanouit; & par conséquent  $AB = \frac{1}{2}$ , c'est-à-dire à la moitié du parametre. Ou  $m$  est moindre que 2, & alors l'exposant de  $y$  étant positif, elle se trouvera dans le numerateur, ce qui rend (en l'égalant \* à zero) la fraction nulle: c'est-à-dire que le point  $B$  tombe en ce cas sur le point  $A$  comme dans la seconde parabole cubique  $axx = y^1$ . Ou enfin  $m$  surpasse 2, & alors l'exposant de  $y$  étant négatif, elle sera dans le dénominateur, ce qui rend (lorsqu'elle devient zero) la fraction infinie: c'est-à-dire que le point  $B$  est infiniment éloigné du point  $A$ , ou (ce qui est la même chose) que l'axe  $AB$  est asymptote de la développée comme dans la première parabole cubique  $axx = y^1$ . On peut remarquer dans ce dernier cas que la développée  $CLO$  de la demi-parabole  $ADM$  a un point de rebroussement  $L$ ; de sorte que par le développement de la partie  $LO$  continuée à l'infini, le point  $D$  ne décrit que la portion déterminée  $DA$ ;

FIG. 74.

FIG. 75.

FIG. 72a

\* Art. 33.

FIG. 76.

FIG. 77.

au lieu que par le développement de l'autre partie  $LC$  continuée aussi à l'infini, il décrit la portion infinie  $DM$ .

On déterminera le point  $L$  de même que dans l'hyperbole. Soit par exemple  $axx = y^3$  ou  $y = x^{\frac{3}{2}}$ , on aura  $dy = \frac{3}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx$ ,  $ddy = -\frac{3}{4}x^{-\frac{3}{2}}dx^2$ ,  $ddy = \frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}dx^3$ ; & ces valeurs étant substituées dans l'équation  $dx^3 ddy + dy^2 ddy - 3dy ddy^2 = 0$ , on trouvera\*  $AF(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{91125}}$ . Il en est ainsi des autres.

## REMARQUE.

88. **EN** supposant que  $m$  surpasse  $r$ , afin que les paraboles soient toujours concaves du côté de leur axe, il peut arriver différens cas. Car si le numérateur de la fraction marquée par  $m$  est pair, & le dénominateur impair;
- FIG. 73. toutes les paraboles tombent de part & d'autre de leur axe dans une position semblable à celle de la parabole ordinaire. Mais si le numérateur & dénominateur sont chacun impair; elles ont une position renversée de part & d'autre de leur axe, en sorte que leur sommet  $A$  est un point d'inflexion, comme la première parabole cubique  $x = y^{\frac{3}{2}}$  ou  $axx = y^3$ . Enfin si le numérateur étant impair, le dénominateur est pair; elles ont une position renversée du même côté de leur axe, en sorte que leur sommet  $A$  est
- FIG. 76. un point de rebroussement, comme la seconde parabole cubique  $x = y^{\frac{2}{3}}$  ou  $axx = y^3$ . Tout cela suit de ce qu'une puissance paire ne peut pas avoir une valeur négative. Cela posé, il est évident,
- FIG. 77. 1°. Que dans le point d'inflexion  $A$ , le rayon de la développée peut être infiniment grand comme dans  $axx = y^3$ , ou infiniment petit comme dans  $axx^3 = y^3$ .
- FIG. 76. 2°. Que dans le point de rebroussement  $A$ , le rayon de la développée peut être ou infini comme dans  $axx = y^3$ , ou zero comme dans  $axx^3 = y^3$ .

3°. Qu'il ne s'ensuit pas de ce que le rayon de la développée est infini ou zéro, que les courbes aient alors un point d'inflexion ou de rebroussement. Car dans  $ax = y^2$  il est infini, dans  $ax^2 = y^2$  il est nul ; & cependant ces paraboles tombent de part & d'autre de leur axe dans une position semblable à celle de la parabole ordinaire.

## EXEMPLE IV.

89. Soit la courbe  $AMD$  une hyperbole ou une ellipse Fig. 78. 79. qui ait pour axe  $AH(a)$ , & pour parametre  $AF(b)$ .

On aura par la propriété de ces lignes  $y = \sqrt{\frac{abx + bxx}{ya}}$ ,  
 $dy = \frac{abdx + 2bx dx}{2\sqrt{abx + bxx}}$ , &  $ddy = \frac{-a^2 b b dx^2}{4a^2 abx + 4abxx \sqrt{abx + bxx} + abxx}$ . Si  
 donc l'on met ces valeurs dans  $\frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{dx ddy}$  expref-  
 sion générale de  $MC$ , on trouvera dans ces deux courbes  $MC$  \* Art. 78.  

$$= \frac{aabb + 4abbx + 4bbxx + 4aabbx + 4abxx \sqrt{aabb + 4abbx + 4bbxx} + 4aabbx + 4abxx}{2a^2 bb}$$
  

$$= \frac{4M^2}{bb}$$
, puisque de part & d'autre  $MQ \left( \sqrt{\frac{y^2 dx^2 + dy^2}{dx}} \right)$   

$$= \frac{y aabb + 4abbx + 4bbxx + 4aabbx + 4abxx}{2a}$$
. Ce qui donne  
 cette construction qui sert aussi pour la parabole.

Soit prise  $MC$  quadruple de la quatrième continuelement proportionnelle au parametre  $AF$  & à la perpendiculaire  $MQ$  terminée par l'axe ; le point  $C$  sera à la développée.

Si l'on fait  $x = 0$ , on aura  $AB = \frac{1}{2}b$ . Et si l'on fait dans \* Art. 83. l'ellipse  $x = \frac{1}{2}a$ , on trouvera  $DG = \frac{a^2 y ab}{2b}$ , c'est-à-dire Fig. 79. égal à la moitié du parametre du petit axe. D'où l'on voit que dans l'ellipse la développée  $BCG$  se termine en un point  $G$  du petit axe  $DO$  où elle forme un point de rebroussement ; au lieu que dans la parabole & l'hyperbole elle s'étend à l'infini.

Si  $a = b$  dans l'ellipse, il vient  $MC = \frac{1}{2}a$ ; d'où il suit que tous les rayons de la développée sont égaux entr'eux, & qu'elle ne sera par conséquent qu'un point: c'est à-dire que l'ellipse devient en ce cas un cercle qui a pour développée son centre. Ce que l'on sçait d'ailleurs être véritable.

## EXEMPLE V.

FIG. 80. 90. SOIT la courbe  $AMD$  une logarithmique ordinaire, dont la nature est telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconque  $M$  la perpendiculaire  $MP$  sur l'asymptote  $KP$ , & la tangente  $MT$ ; la sous-tangente  $PT$  soit toujours égale à la même droite donnée  $a$ .

On a donc  $PT(\frac{ydx}{dy}) = a$ , d'où l'on tire  $dy = \frac{ydx}{a}$ , dont la différence donne, en prenant  $dx$  pour constante,  $ddy = \frac{ydx}{a}$

\* Art. 77.  $= \frac{ydx^2}{aa}$ ; & mettant ces valeurs dans  $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy}$ , on trouve \*

$ME = \frac{-aa - yy}{y}$ ; & partant  $EC$  ou  $PK = \frac{-aa - yy}{a}$ . Ce qui donne cette construction.

Soit prise  $PK$  égale à  $TQ$  du même côté de  $T$ , parce que sa valeur est négative; & soit menée  $KC$  parallèle à  $PM$ : je dis qu'elle rencontrera la perpendiculaire  $MC$  au point cherché  $C$ . Car  $TQ = \frac{aa + yy}{a}$ .

Si l'on veut que le point  $M$  soit celui de la plus grande courbure, on se servira de la formule  $dx^2 dddy + dy^2 ddd$   
 \* Art. 86.  $- 3dyddy^2 = 0$ , que l'on a trouvée \* dans l'exemple second; & mettant pour  $dy$ ,  $ddy$ ,  $ddd$ , leurs valeurs  $\frac{ydx}{a}$ ,  $\frac{ydx^2}{aa}$ ,  $\frac{ydx^3}{a^3}$ , on trouvera  $PM(y) = a\sqrt{\frac{1}{2}}$ .

Il est clair, en prenant  $dx$  pour constante, que les appliquées  $y$  sont entr'elles comme leurs différences  $dy$  ou  $\frac{ydx}{a}$ ; d'où il suit qu'elles sont aussi une progression géométrique. Car si l'on conçoit que l'asymptote ou l'axe  $PK$  soit divisé en un nombre infini de petites parties égales  $Pp$  ou  $MR$ ,  $pf$  ou  $mS$ ,  $fg$  ou  $nH$ , &c. comprises entre les appli-

appliquées  $PM, pm, fn, go, &c.$  l'on aura  $PM . pm :: Rm . Sn :: PM + Rm$  ou  $pm . pm + Sn$  ou  $Fn$ . On prouve de même que  $pm . fn :: fn . go, &c.$  ainsi de suite. Les appliquées  $PM, pm, fn, go, &c.$  feront donc entr'elles une progression géométrique.

## EXEMPLE VI.

91. **S**oit la courbe  $AMD$  une logarithmique spirale, Fig. 81.  
dont la nature est telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconque  $M$  au point fixe  $A$ , qui en est le centre, la droite  $MA$  & la tangente  $MT$ ; l'angle  $AMT$  soit par tout le même.

L'angle  $AMT$  ou  $AmM$  étant constant, la raison de  $mR$  ( $dy$ ) à  $Rm$  ( $dx$ ) sera aussi constante. Il faut donc que la différence de  $\frac{dy}{dx}$  soit nulle; ce qui donne (en supposant  $dx$  constante)  $ddy = 0$ . C'est pourquoi effaçant le terme  $yddy$  dans  $\frac{ydx^2 + ydy^2}{dx^2 + dy^2 - yddy}$  expression \* générale de  $ME$  lorsque \* Art. 77. les appliquées partent toutes d'un même point, on trouve  $ME = y$ , c'est-à-dire  $ME = AM$ . Ce qui donne cette construction.

Soit menée  $AC$  perpendiculaire sur  $AM$ , & qui rencontre en  $C$  la droite  $MC$  perpendiculaire à la courbe; le point  $C$  sera à la développée  $ACB$ .

Les angles  $AMT, ACM$  sont égaux, puisqu'étant joints l'un & l'autre au même angle  $AMC$  ils font un angle droit. La développée  $ACB$  sera donc la même logarithmique spirale que la donnée  $AMD$ , & elle n'en différera que par sa position.

Si l'on suppose que le point  $C$  de la développée  $ACB$  étant donné, il faille déterminer la longueur  $CM$  de son rayon en ce point, qui \* est égal à la portion  $AC$  qui fait une infinité de retours avant que de parvenir en  $A$ ; il est clair qu'il n'y a qu'à mener  $AM$  perpendiculaire sur  $AC$ . De sorte que si l'on mène  $AT$  perpendiculaire sur

M

*AM*, la tangente *MT* sera aussi égale à la portion *AM* de la logarithmique spirale donnée *AMD*.

Si l'on conçoit une infinité d'appliquées *AM*, *Am*, *An*, *Ao*, &c. qui fassent entr'elles des angles infiniment petits & égaux ; il est clair que les triangles *MAM*, *mAn*, *nAo*, &c. seront semblables, puisque les angles en *A* sont égaux, & que par la propriété de la logarithmique, les angles en *m*, *n*, *o*, &c. le sont aussi. Et partant *AM*. *Am* :: *Am*. *An*. Et *Am*. *An* :: *An*. *Ao*. & ainsi de suite. D'où l'on voit que les appliquées *AM*, *Am*, *An*, *Ao*, &c. font une progression géométrique lorsqu'elles font entr'elles des angles égaux.

#### EXEMPLE VII.

FIG. 82. 92. SOIT la courbe *AMD* une des spirales à l'infini, formée dans le secteur *BAD* avec une propriété telle qu'ayant mené un rayon quelconque *AMP*, & ayant nommé l'arc entier *BPD*, *b* ; la partie *BP*, *z* ; le rayon *AB* ou *AP*, *a* ; & la partie *AM*, *y* ; on ait cette proportion *b*. *z* :: *a*<sup>*m*</sup>. *y*<sup>*m*</sup>.

L'équation à la spirale *AMD* est  $y^m = \frac{a^m z}{b}$ , dont la différence donne  $my^{m-1}dy = \frac{a^m dz}{b}$ . Or à cause des secteurs semblables *AMR*, *APp*, l'on aura *AM*(*y*). *AP*(*a*) :: *MR*(*dx*). *Pp*(*dz*) =  $\frac{a dx}{y}$ . Mettant donc cette valeur à la place de *dz* dans l'équation que l'on vient de trouver, on aura  $my^m dy = \frac{a^{m+1} dx}{b}$  dont la différence ( en prenant *dx* pour

\* Art. 77. *Art. 77.* Soit par  $my^{m-1}dy^2 + my^m ddy = 0$  ; d'où en divisant par  $my^{m-1}$ , l'on tire  $-yddy = mdy^2$  ; & partant  $ME^* \left( \frac{y dx^2 + y dy^2}{dx^2 + dy^2 - y ddy} \right) = \frac{y dx^2 + y dy^2}{dx^2 + m + 1 dy^2}$  ; ce qui donne cette construction.

Soit menée par le centre *A* la droite *TAQ* perpendiculaire sur *AM*, & qui rencontre en *T* la tangente *MT*, & en *Q* la perpendiculaire *MQ* ; soit fait *TA* + *m* + *TAQ*.

$TQ :: MA \cdot ME$ . Je dis que menant  $EC$  parallèle à  $TQ$ , elle ira rencontrer  $MQ$  en un point  $C$  qui sera à la développée.

Car à cause des parallèles  $MGR, TAQ$ , l'on aura  $MR(dx) + m + 1RG(\frac{dy^2}{dx}) \cdot MG(dx + \frac{dy^2}{dx}) :: TA + m + 1AQ, TQ$   
 $:: AM(y) \cdot ME = \frac{y dx^2 + y dy^2}{dx^2 + m + 1 dy^2}$ .

## EXEMPLE VIII.

93. Soit  $AMD$  une demi roulette simple, dont la base   $BD$  est égale à la demi-circonférence  $BEA$  du cercle générateur.

Ayant nommé  $AP, x$ ;  $PM, y$ ; l'arc  $AE, u$ ; & 1e diametre  $AB, 2a$ ; l'on aura par la propriété du cercle  $PE = \sqrt{2ax - xx}$ ; & par celle de la roulette  $y = u + \sqrt{2ax - xx}$ , dont la différence donne  $dy = du + \frac{adx - xdx}{\sqrt{2ax - xx}}$   
 $= \frac{2adx - xdx}{\sqrt{2ax - xx}}$  ou  $dx \sqrt{\frac{2a - x}{x}}$ , en mettant pour  $du$  sa valeur  $\frac{adx}{\sqrt{2ax - xx}}$ ; en supposant  $dx$  constante,  $ddy = \frac{-adx^2}{x \sqrt{2ax - xx}}$ ;

& en mettant ces valeurs dans  $\frac{dx^2 + dy^2}{dx ddy}$ , il vient \* *Art. 78.*

$MC = 2\sqrt{4aa - 2ax}$ , c'est-à-dire  $2BE$  ou  $2MG$ .

Si l'on fait  $x = 0$ , l'on aura  $AN = 4a$  pour rayon de la développée dans le sommet  $A$ . Mais si l'on fait  $x = 2a$ , on trouvera que le rayon de la développée au point  $D$  devient nul ou zero; d'où l'on voit que la développée a son origine en  $D$ , & qu'elle se termine en  $N$  en sorte que  $BN = BA$ .

Pour sçavoir la nature de cette développée, il n'y a qu'à achever le rectangle  $BS$ , décrire le demi-cercle  $DIS$  qui a pour diametre  $DS$ , & mener  $DI$  parallèle à  $MC$  ou à  $BE$ . Cela fait, il est clair que l'angle  $BDI$  est égal à l'angle  $EBD$ ; & par conséquent que les arcs  $DI, BE$  sont égaux entr'eux; d'où il suit que leurs cordes  $DI, BE$  ou  $GC$  sont

M ij

aussi égales. Si donc l'on fait  $IC$ , elle sera égale & parallèle à  $DG$ , qui par la génération de la roulette est égale à l'arc  $BE$  ou  $DI$ ; & partant la développée  $DCN$  est une demi-roulette qui a pour base la droite  $NS$  égale à la demi-circonférence  $DIS$  de son cercle générateur: c'est-à-dire que c'est la demi-roulette même  $AMDB$  posée dans une situation renversée.

## COROLLAIRE.

\*Art. 75. 94. IL est clair\* que la portion de roulette  $DC$  est double de sa tangente  $CG$ , ou de la corde correspondante  $DI$ . Et la demi-roulette  $DCN$  double du diamètre  $BN$  ou  $DS$  de son cercle générateur.

## AUTRE SOLUTION.

95. ON peut encore trouver la longueur du rayon  $MC$  sans aucun calcul, en cette sorte. Ayant imaginé une autre perpendiculaire  $mC$  infiniment proche de la première, une autre parallèle  $me$ , une autre corde  $Be$ , & décrit des centres  $C, B$  les petits arcs  $GH, EF$ , on formera les triangles rectangles  $GHg, EFf$  qui seront égaux & semblables; car  $Gg = Ee$ , puisque  $BG$  ou  $ME$  est égal à l'arc  $AE$ , & de même  $Bg$  ou  $me$  est égal à l'arc  $Ae$ ; de plus  $Hg$  ou  $mg = MG = Fe$  ou  $Be - BE$ ;  $GH$  sera donc égal à  $EF$ . Or les perpendiculaires  $MC, mC$ , étant parallèles aux cordes  $EB, eB$ , l'angle  $MCm$  sera égal à l'angle  $EBe$ . Donc puisque les arcs  $GH, EF$ , qui mesurent ces angles, sont égaux, il s'ensuit que leurs rayons  $CG, BE$  seront aussi égaux; & partant que  $MC$  doit être prise double de  $MG$  ou de  $BE$ .

## LEMME.

96. S'il y a un nombre quelconque de quantités  $a, b, c, d, e, \&c.$  soit que ce nombre soit fini ou infini, soit que ces quantités soient des lignes, ou des surfaces, ou des solides; la somme  $a - b + b - c + c - d + d - e, \&c.$  de toutes leurs différences est égale à la plus grande  $a$ , moins la plus

*petite c, ou simplement à la plus grande lorsque la plus petite est zero.* Ce qui est visible.

## COROLLAIRE I.

97. **L**es sécateurs  $CMM$ ,  $CGH$ , étant semblables, il est clair que  $Mm$  est double de  $GH$  ou de son égale  $EF$ ; & comme cela arrive toujours en quelque endroit que l'on suppose le point  $M$ , il s'ensuit que la somme de tous les petits arcs  $Mm$ , c'est-à-dire la portion  $Am$  de la demi-roulette  $AMD$ , est double de la somme de tous les petits arcs  $EF$ . Or le petit arc  $EF$  fait partie de la corde  $AE$  perpendiculaire sur  $BE$ , & est la différence des cordes  $AE$ ,  $Ae$ , parceque la petite droite  $eF$  perpendiculaire sur  $Ae$  peut être considérée comme un petit arc décrit du centre  $A$ ; & partant la somme de tous les petits arcs  $EF$  dans l'arc  $AZE$  sera la somme des différences de toutes les cordes  $AE$ ,  $Ae$ , &c. dans cet arc, c'est-à-dire par le Lemme qu'elle sera égale à la corde  $AE$ . Il est donc évident que la portion  $AM$  de la demi-roulette  $AMD$  est double de la corde correspondante  $AE$ .

## COROLLAIRE II.

98. **L'**ESPACE  $MGgm$  \* ou le trapèze  $MGHm$  \* *Art. 1.*  
 $= \frac{1}{2} Mm + \frac{1}{2} GH \times MG = \frac{1}{2} EF \times BE$ , c'est à dire qu'il est triple du triangle  $EBF$  ou  $EBe$ ; d'où il suit que l'espace  $MGBA$  somme de tous ces trapèzes, est triple de l'espace circulaire  $BEZA$  somme de tous ces triangles.

## EXEMPLE III.

99. **N**OMMANT  $BP$ ,  $z$ ; l'arc  $AZE$  ou  $EM$  ou  $BG$ ,  $u$ ; & le rayon  $KA$ ,  $a$ ; l'on aura le parallélogramme  $MGBE = uz$ . Or l'espace de la roulette  $MGBA = 3BEZA = 3EKB + \frac{1}{2} au$ ; & partant l'espace  $AMEB$  renfermé par la portion de roulette  $AM$ , la parallèle  $ME$ , la corde  $BE$  & le diamètre  $AB$ , est  $= 3EKB + \frac{1}{2} au - uz$ . D'où il

suivait que si l'on prend  $BP(x) = \frac{1}{2}a$ , l'espace  $AMEB$  sera triple du triangle correspondant  $EKB$ ; & aura par conséquent sa quadrature indépendante de celle du cercle. Ce que *M. Hugens* a remarqué le premier. Voici encore une autre sorte d'espace qui a la même propriété.

Si l'on retranche de l'espace  $AMEB$  le segment  $BEZA$ , il restera l'espace  $AZEM = 2EKB + au - ux$ ; d'où l'on voit que si le point  $P$  tombe au centre  $K$ , l'espace  $AZEM$  sera égal au carré du rayon. Il est évident qu'entre tous les espaces  $AMEB$  &  $AZEM$ , il n'y a que les deux que l'on vient de déterminer qui aient leur quadrature absolue indépendante de celle du cercle.

### EXEMPLE IX.






FIG. 84. 100. SOIT la demi-roulette  $AMD$  décrite par la révolution du demi-cercle  $AEB$  autour d'un autre cercle immobile  $BGD$ ; & qu'il faille déterminer sur la perpendiculaire  $MG$  donnée de position, le point où elle touche la développée.

Pour se servir des formules générales il faudroit prendre pour les appliquées de la courbe  $AMD$ , des lignes droites perpendiculaires sur l'axe  $OA$ , & chercher ensuite une équation qui exprimât la relation des coupées aux appliquées, ou de leurs différences. Mais comme le calcul en seroit fort pénible, il vaut beaucoup mieux dans ces sortes de rencontres en tenter la solution en se servant de la génération même.

Lorsque le demi-cercle  $AEB$  est parvenu dans la position  $MGB$  dans laquelle il touche en  $G$  la base  $BD$ ; & que le point décrivant  $A$  tombe sur le point  $M$  de la demi-roulette  $AMD$ : il est clair,

1°. Que l'arc  $GM$  est égal à l'arc  $GD$ , comme aussi l'arc  $GB$  du cercle mobile à l'arc  $GB$  du cercle immobile.

\* Art. 43. 2°. Que  $MG$  est \* perpendiculaire sur la courbe; car considérant la demi-circonférence  $MGB$  ou  $AEB$ , & la base  $BGD$  comme l'assemblage d'une infinité de petites





droites égales chacune à sa correspondante, il est manifeste que la demi-roulette *AMD* sera l'assemblage d'une infinité de petits arcs qui auront pour centres successivement tous les points touchans *G*, & qui seront décrits chacun par le même point *M* ou *A*.

3°. Que si l'on décrit du centre *O* du cercle immobile l'arc concentrique *ME*; les arcs *MG*, *EB* du cercle mobile seront égaux entr'eux, aussi bien que leurs cordes *MG*, *EB* & les angles *OGM*, *OBE*. Car les droites *OK*, *OK* qui joignent les centres des deux cercles sont égales, puisqu'elles passent par les points touchans *B*, *G*; c'est pourquoi menant les rayons *OM*, *OE*, & *KE*, on formera les triangles *OKM*, *OKE* égaux & semblables. L'angle *OKM* étant donc égal à l'angle *OKE*; les arcs *MG*, *BE* des demi-cercles égaux *MGB*, *BEA*, qui mesurent ces angles, seront égaux, comme aussi leurs cordes *MG*, *EB*; d'où il suit que les angles *OGM*, *OBE* le seront aussi.

Cela posé, soit entenduë une autre perpendiculaire *mC* Fig. 85. infiniment proche de la première, un autre arc concentrique *me*, & une autre corde *Be*; soient décrits des centres *C*, *B*, les petits arcs *GH*, *EF*. Les triangles rectangles *GHH*, *EFf* seront égaux & semblables; car *Gg* ou *Dg* — *DG* = *Ee* ou à l'arc *Be* — l'arc *BE*, de plus *Hg* ou *mg* — *MG* = *Fe* ou à *Be* — *BE*. Le petit arc *GH* sera donc égal au petit arc *EF*; d'où il suit que l'angle *GCH* est à l'angle *EBF*, comme *BE* est à *CG*. Ainsi toute la difficulté se réduit à trouver le rapport de ces angles. Ce qui se fait en cette sorte.

Ayant mené les rayons *OG*, *Og*, *KE*, *Ke*, & nommé *OG* ou *OB*, *b*; *KE* ou *KB* ou *KA*, *a*; il est clair que l'angle *EBE* = *OBe* — *OBE* = *Ogm* — *OGM* = (en menant *GL*, *GV* parallèles à *Cm*, *Og*) *LGM* — *OGV* = *GCH* — *GOg*. On aura donc l'angle *GCH* = *GOg* + *EBF*. Or les arcs *Gg*, *Ee* étant égaux, l'on aura aussi *GOg*. *KEe* ou *EBF* :: *KE(a)*. *OG(b)*; & partant l'angle *GOg* =  $\frac{a}{b}$  *EBF*, & *GCH* =  $\frac{a+b}{b}$  *EBF*. Donc *GCH*. *EBF* ou *BE*. *CG* ::  $\frac{a+b}{b}$  . *1*.

& partant l'inconnue  $CG = \frac{b}{2a+b} BE$  ou  $MG$ . Ce qui donne cette construction.

FIG. 86. Soit fait  $OA(2a+b) \cdot OB(b) :: MG \cdot GC$ ; le point  $C$  sera à la développée.

Il est clair 1°. Que cette développée commence au point  $D$ , & qu'elle y touche la base  $BGD$ ; puisque l'arc  $GM$  devient en ce point infiniment petit. 2°. Qu'elle se termine au point  $N$ , en sorte que  $OA \cdot OB :: AB \cdot BN :: OA - AB$  ou  $OB \cdot OB - BN$  ou  $ON$ ; c'est-à-dire que  $OA$ ,  $OB$ ,  $ON$  sont continuellement proportionnelles. 3°. Si l'on décrit à présent le cercle  $NSQ$  du centre  $O$ , je dis que la développée  $DCN$  est formée par la révolution du cercle mobile  $GCS$ , qui a pour diamètre  $GS$  ou  $BN$ , autour de l'immobile  $NSQ$ ; c'est à dire qu'elle est une demi-roulette semblable à la proposée, ou de même espèce (parceque les diamètres  $AB$ ,  $BN$  des cercles mobiles ont entr'eux le même rapport que les rayons  $OB$ ,  $ON$  des cercles immobiles), & posée dans une situation renversée en sorte que son sommet est en  $D$ . Pour le prouver, supposons que les diamètres des cercles mobiles se trouvent sur la droite  $OT$  menée à discrétion du centre  $O$ ; elle passera par les points touchans  $S$ ,  $G$ ; & faisant  $AB$  ou  $TG \cdot BN$  ou  $GS :: MG \cdot GC$ , le point  $C$  sera à la développée, & de plus à la circonférence du cercle  $GCS$ ; car l'angle  $GMT$  étant droit, l'angle  $GCS$  le sera aussi. Or à cause des angles égaux  $MGT$ ,  $CGS$ , l'arc  $TM$  ou  $GB$  est à l'arc  $CS$ , comme le diamètre  $GT$  au diamètre  $GS :: OG \cdot OS :: GB \cdot NS$ ; & partant les arcs  $CS$ ,  $SN$  sont égaux. Donc, &c.

#### COROLLAIRE I.

\*Art. 75. 101. IL est clair\* que la portion de roulette  $DC$  est égale à la droite  $CM$ ; & partant que  $DC$  est à sa tangente  $CG :: AB + BN \cdot BN :: OB + ON \cdot ON$ ; c'est à dire comme la somme des diamètres des deux cercles générateurs, ou des cercles mobile & immobile, est au rayon du cercle immobile. Cette vérité se découvre encore de la manière

nière qui suit. A cause des triangles semblables  $CMm$ ,  $CGH$ , Fig. 85. l'on aura  $Mm.GH$  ou  $EF::MC.GC::OA+OB(2a+2b).OB(b)$ . D'où il suit (comme dans l'art. 97.) que la portion de roulette  $AM$  est à la corde correspondante  $AE$ , comme la somme des diamètres du cercle générateur & de la base, est au rayon de la base.

## COROLLAIRE II.

102. Le trapèze  $MGHm = \frac{1}{2}GH + \frac{1}{2}Mm \times MG$ . Or Fig. 85.

$$CG(\frac{b}{2a+b}MG).CM(\frac{2a+2b}{2a+b}MG)::GH.Mm = \frac{2a+2b}{b}GH.$$

Donc puisque  $GH=EF$ , &  $MG=EB$ , l'on aura  $MGHm = \frac{2a+2b}{b}EF \times EB$ : c'est à dire que le trapèze  $MGHm$  sera toujours au triangle correspondant  $EBF::2a+3b.b$ .

D'où il suit que l'espace  $MGBA$  renfermé par  $MG$ ,  $AB$  perpendiculaires à la roulette, par l'arc  $BG$  & par la portion de roulette  $MA$ , est au segment de cercle correspondant  $BEZA::2a+3b.b$ .

## COROLLAIRE III.

103. Il est visible que la quadrature indéfinie de la rou. Fig. 87.

lette dépend de la quadrature du cercle; mais si l'on prend  $OQ$  moyenne proportionnelle entre  $OK$ ,  $OA$ , & qu'on décrive de ce rayon l'arc  $QEM$ ; je dis que l'espace  $ABEM$  renfermé par le diamètre  $AB$ , la corde  $BE$ , l'arc  $EM$ , & par la portion de roulette  $AM$ , est au triangle  $EKB::2a+3b.b$ . Car nommant l'arc  $AE$  ou  $GB$ ,  $n$ ; le rayon  $OQ$ ,  $x$ ; l'on aura  $OB(b).OQ(x)::GB(n).RQ$  ou  $ME = \frac{nx}{b}$ . & partant l'espace  $RGBQ$  ou  $MGBE$ , c'est à dire  $\frac{1}{2}GB + \frac{1}{2}RQ \times BQ = \frac{nxn-bbn}{2b}$ . Or \* l'espace de \* Art. 101.

la roulette  $MGBA = \frac{2a+2b}{b} \times BEZA = \frac{2a+2b}{b} \times EKB + \frac{2a+2b}{b} \times KEZA(\frac{nx}{b})$ . Si donc l'on retranche le précédent espace de celui-ci, il restera  $ABEM = \frac{2an+2bn+bbn-nn}{2b} + \frac{2a+2b}{b} \times EKB$

N

$= \frac{2a+1b}{6} EKB$ , puisque par la construction  $zz = 2aa + 3ab + bb$ . D'où l'on voit que cet espace a sa quadrature indépendante de celle du cercle, & qu'il est le seul parmi tous les semblables.

En voici encore un autre qui a la même propriété. Si l'on retranche de l'espace  $ABEM$  le segment  $BEZA$  ( $\frac{1}{2}au + EKB$ ), il restera l'espace  $AZEM = \frac{2aa+2ab+bb-zz}{1b} + \frac{2a+1b}{6} EKB = \frac{2a+1b}{6} EKB$  en faisant  $zz = 2aa + 2ab + bb$ : c'est à dire que si l'on divise la demi-circonférence en deux également au point  $E$ , l'espace  $AZEM$  sera au double du triangle  $EKB$ , c'est à dire au quarré du rayon  $:: OK (a+b) \cdot OB (b)$ .

## COROLLAIRE IV.

FIG. 88. 104. SI le cercle mobile  $AEB$  roule au dedans de l'immobile  $BGD$ , son diamètre  $AB$  devient négatif de positif qu'il étoit auparavant; & partant il faut changer de signes les termes où il se rencontre avec une dimension impaire. D'où il suit, 1°. Que si l'on mène à discrétion la perpendiculaire  $MG$  à la roulette, & que l'on fasse  $OA$

\* Art. 100.  $(b-2a) \cdot OB (b) :: MG \cdot GC$ , le point  $C$  sera \* à la développée  $DCN$  décrite par la révolution du cercle qui a pour diamètre  $BN$ , au dedans de la circonférence  $NS$  concentrique à  $BD$ . 2°. Que si l'on décrit du centre  $O$  l'arc  $ME$ , la portion de roulette  $AM$  sera \* à la corde  $AE :: 2b-2a \cdot b$ .

\* Art. 101. 3°. Que l'espace  $MGBA$  est \* au segment  $BEZA :: 3b-2a \cdot b$ .

\* Art. 102. 4°. Que si l'on prend  $OQ = \sqrt{2aa - 3ab + bb}$ , c'est à dire moyenne proportionnelle entre  $OK, OA$ ; l'espace  $ABEM$  renfermé par la portion de roulette  $AM$ , l'arc  $ME$ , la corde  $EB$ , & le diamètre  $AB$ , sera \* au triangle  $EKB :: 3b-2a \cdot b$ .

\* Art. 103. Mais que si l'on fait  $OQ$  ou  $OE = \sqrt{2aa - 2ab + bb}$ , c'est à dire que l'arc  $AE$  soit le quart de la circonférence, l'espace  $AZEM$  renfermé par la portion  $AM$  de roulette & \* *Ibid.* par les deux arcs  $ME, AE$ , sera \* au triangle  $EKB$  qui est en ce cas la moitié du quarré du rayon  $:: 2b - 2a \cdot b$ .

## COROLLAIRE V.

105. **S**i l'on conçoit que le rayon  $OB$  du cercle immobile devienne infini, l'arc  $BGD$  deviendra une ligne droite, & la courbe  $AMD$  deviendra la roulette ordinaire. Or comme dans ce cas le diamètre  $AB$  du cercle mobile est nul par rapport à celui de l'immobile; il s'ensuit, 1°. Que  $MG.GC :: b.b$ . Puisque  $b \pm za = b$ , c'est à dire que  $MG = GC$ ; & partant que si l'on prend  $BN = AB$ , & qu'on mène la droite  $NS$  parallèle à  $BD$ , la développée  $DCN$  sera formée par la révolution du cercle, qui a pour diamètre  $BN$ , sur la base  $NS$ . 2°. Que la portion de roulette  $AM$  est à la corde correspondante  $AE :: zb.b$ . 3°. Que l'espace  $MGBA$  est au segment  $BEZA :: zb.b$ . 4°. Puisque  $BQ$  ou  $\pm OQ \mp OB$ , que j'appelle  $x$ , est  $= \mp b \pm \sqrt{2aa \mp 3ab + bb}$ , d'où l'on tire (en ôtant les incommensurables)  $xx \pm 2bx = 2aa \pm 3ab$ ; l'on aura  $x = \frac{1}{2}a$ , en effaçant les termes où  $b$  ne se rencontre point, parcequ'ils sont nuls par rapport aux autres. C'est à dire que si l'on prend dans la roulette ordinaire  $BP = \frac{1}{2}AB$ , & qu'on mène la droite  $PEM$  parallèle à la base  $BD$ ; l'espace  $AMEB$  sera triple du triangle  $EKB$ . On trouvera en opérant de la même manière, que si le point  $P$  tombe au centre  $K$ , l'espace  $AZEM$  renfermé par la portion de roulette  $AM$ , la droite  $ME$ , & l'arc  $AE$ , sera égal au carré du rayon. Ce que l'on a déjà démontré ci devant art. 99.

## REMARQUE.

106. **C**OMME les arcs  $DG$ ,  $GM$  sont toujours égaux entr'eux, il s'ensuit que l'angle  $DOG$  est aussi toujours à l'angle  $GKM :: GK.OG$ . C'est pourquoi l'origine  $D$  de la roulette  $DMA$ , les rayons  $OG, GK$  des cercles générateurs, & le point touchant  $G$  étant donnés, si l'on veut déterminer dans cette position le point  $M$  qui décrit la roulette, il ne faut que

N ij

tirer le rayon  $KM$  en sorte que l'angle  $GKM$  soit à l'angle donné  $DOG :: OG . GK$ . Or je dis maintenant que cela se peut toujours faire géométriquement lorsque le rapport de ces rayons se peut exprimer par nombres, & partant que la roulette  $DMA$  est alors géométrique.

Car supposant, par exemple, que  $OG . GK :: 13 . 5$  ; il est clair que l'angle  $MKG$  doit contenir deux fois l'angle donné  $DOG$  & de plus  $\frac{1}{5}$  de cet angle. Toute la difficulté se réduit donc à diviser l'angle  $DOG$  en cinq parties égales. Or c'est une chose connue par les Géomètres, qu'on peut toujours diviser géométriquement un angle ou un arc donné en tant de parties égales qu'on voudra ; puisqu'on arrive toujours à quelque équation qui ne renferme que des lignes droites. Donc , &c.

Je dis de plus que la roulette  $DMA$  est mécanique, ou ce qui est la même chose, qu'on ne peut déterminer géométriquement les points  $M$  lorsque la raison de  $OG$  à  $KG$  ne se peut exprimer par nombres, c'est à dire lorsqu'elle est fourde.

Car toute ligne, soit mécanique soit géométrique, où rentre en elle-même ou s'étend à l'infini ; puisqu'on peut toujours en continuer la génération. Si donc le cercle mobile  $ABC$  décrit par son point  $A$  dans sa première révolution la roulette  $ADE$ , cette roulette ne sera pas encore finie, & continuant toujours de rouler il décrira la seconde  $EFG$ , puis la troisième  $GHI$ , & ainsi de suite jusqu'à ce que le point décrivant  $A$  retombe après plusieurs révolutions dans le même point d'où il étoit parti. Et pour lors si on recommence à rouler le cercle mobile  $ABC$ , il décrira derechef la même ligne courbe, de sorte que toutes ces roulettes prises ensemble ne composent qu'une seule courbe  $ADEFGHI$ , &c. Or les rayons des cercles, générateurs étant incommensurables, leurs circonférences le seront aussi, & par conséquent le point décrivant  $A$  du cercle mobile  $ABC$  ne pourra jamais retomber dans le point  $A$  de l'immobile, d'où il étoit parti, si grand que

FIG. 89.

puisse être le nombre des révolutions. Il y aura donc une infinité de roulettes qui ne formeront cependant qu'une même ligne courbe *ADEFGHI*, &c. Maintenant si l'on mène au travers du cercle immobile une ligne droite indéfinie, il est clair qu'elle coupera la courbe continuée à l'infini en une infinité de points. Or comme l'équation qui exprime la nature d'une ligne géométrique doit avoir au moins autant de dimensions que cette ligne peut être coupée en de différens points par une droite, il s'ensuit que l'équation qui exprimeroit la nature de cette courbe auroit une infinité de dimensions. Ce qui ne pouvant être, on voit évidemment que la courbe doit être mécanique ou transcendente.

## PROPOSITION III.

## Problème.

107. **L**A ligne courbe *BFC* étant donnée, trouver une infinité de lignes *AM*, *BN*, *EFO*, dont elle soit la développée commune. FIG. 90.

Si l'on développe la courbe *BFC* en commençant par le point *A*, il est clair que tous les points *A*, *B*, *F*, du fil *ABFC* décriront dans ce mouvement des lignes courbes *AM*, *BN*, *FO*, qui auront toutes pour développée commune la courbe donnée *BFC*. Mais il faut observer que la ligne *FO* n'ayant pour développée que la partie *FC*, son origine n'est pas en *F*; & que pour la trouver, il faut développer la partie restante *BF* en commençant au point *F* pour décrire la portion *EF* de la courbe *EFO* dont l'origine est en *E*, & qui a pour développée la courbe entière *BFC*.

Si l'on veut trouver les points *M*, *N*, *O* sans se servir du fil *ABFC*, il n'y a qu'à prendre sur une tangente quelconque *CM* autre que *BA*, les parties *CM*, *CN*, *CO* égales à *ABFC*, *BFC*, *FC*.

## COROLLAIRE.

108. IL est évident, 1°. Que les courbes  $AM$ ,  $BN$ ,  $EFO$  sont d'une nature très différente entr'elles; puisque la courbe  $AM$  a dans son sommet  $A$  le rayon de sa développée égal à  $AB$ , au lieu que celui de la courbe  $BN$  est nul. Il est visible aussi par la figure même de la courbe  $EFO$  qu'elle est très différente des courbes  $AM$ ,  $BN$ .

2°. Que les courbes  $AM$ ,  $BN$ ,  $EFO$  ne sont géométriques que lorsque la donnée  $BFC$  est géométrique & de plus rectifiable. Car si elle n'est pas géométrique, en prenant  $BK$  pour la coupée, on ne trouvera point géométriquement l'appliquée  $KC$ : & si elle n'est pas rectifiable, ayant mené la tangente  $CM$ , on ne pourra déterminer géométriquement les points  $M$ ,  $N$ ,  $O$  des courbes  $AM$ ,  $BN$ ,  $EFO$ ; puisqu'on ne peut trouver géométriquement des lignes droites égales à la ligne courbe  $BFC$ , & à ses portions  $BF$ ,  $FC$ .

## REMARQUE.

FIG. 91. 109. Si l'on développe une ligne courbe  $BAC$  qui ait un point d'inflexion en  $A$ , en commençant par le point  $D$  autre que le point d'inflexion; on formera par le développement de la partie  $BAD$  la partie  $DEF$ ; & par celui de la partie  $DC$ , la partie restante  $DG$ : de sorte que  $FEDG$  sera la courbe entière formée par le développement de  $BAC$ . Or il est visible que cette courbe rebrousse chemin aux points  $D$  &  $E$ , avec cette différence qu'au point de rebroussement  $D$  les parties  $DE$ ,  $DG$  ont leur convexité opposée l'une à l'autre; au lieu qu'au point  $E$  les parties  $DE$ ,  $EF$  sont concaves vers le même côté. On a enseigné dans la section précédente à trouver les points de rebroussement tels que  $D$ : il est question maintenant de déterminer les points  $E$ , qu'on peut appeler points de rebroussement de la seconde sorte, & que personne, que je sçache, n'a encore considéré.

Pour en venir à bout, on menera à discrétion sur la

partie *DE* deux perpendiculaires *MN, mn*, terminées par la développée aux points *N, n*, par lesquels on tirera deux autres perpendiculaires *NH, nH* sur les premières *NM, nm*; ce qui formera deux petits secteurs *MNm, NHn* qui seront semblables, puisque les angles *MNm, NHn* sont égaux. On aura donc *Nn.Mm :: NH.NM*. Or dans le point d'inflexion *A* le rayon *NH* devient \* infini ou zero; \* Art. 81. & le rayon *MN*, qui devient *AE*, demeure d'une grandeur finie. Il faut donc qu'au point de rebroussement *E* de la seconde sorte, la raison de la différence *Nn* du rayon *MN* de la développée, à la différence *Mm* de la courbe, devienne ou infiniment grande ou infiniment petite. Et partant

puisque \*  $Nn = \frac{-3dx dy ddy^2 dx^2 + dy^2 \frac{1}{2} + dx ddd dy dx^2 + dy^2 \frac{1}{2}}{dx^2 ddy^2}$ , & \* Art. 86.

$Mm = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ , l'on aura  $\frac{dx^2 ddd dy + dy^2 ddd dy - 3dy ddy^2}{dx ddy^2} = 0$  ou  $\infty$ ; & multipliant par  $dx ddy^2$ , on trouvera la formule  $dx^2 ddd dy + dy^2 ddd dy - 3dy ddy^2 = 0$  ou  $\infty$ , qui servira à déterminer les points de rebroussement de la seconde sorte.

On peut encore concevoir qu'une rebrousante *DEF* Fig. 92. 93. ou *HDEFG* de la seconde sorte, ait pour développée une autre rebrousante *BAC* de la seconde sorte, telle que son point de rebroussement *A* réponde au point de rebroussement *E*, c'est à dire qu'il soit situé sur le rayon de la développée qui part du point *E*. Or il est clair dans cette supposition, que le rayon *EA* de la développée sera toujours un *plus petit* ou un *plus grand*; & partant que la

différence de  $\frac{dx^2 + dy^2 \frac{1}{2}}{dx ddy^2}$  expression générale \* des rayons \* Art. 78. de la développée, doit être nulle ou infinie au point cherché *E*; ce qui donne la même formule qu'auparavant: de sorte qu'elle est générale pour trouver les points de rebroussement de la seconde sorte.



## SECTION VI.

*Usage du calcul des différences pour trouver les  
Cauistiques par réflexion.*

## DÉFINITION.

FIG. 94. 95. **S** I l'on conçoit qu'une infinité de rayons  $BA, BM, BD$ , qui partent d'un point lumineux  $B$ , se réfléchissent à la rencontre d'une ligne courbe  $AMD$ , en sorte que les angles de réflexion soient égaux aux angles d'incidence ; la ligne  $HFN$ , que touchent les rayons réfléchis ou leur prolongemens  $AH, MF, DN$ , est appelée *Cauistique par réflexion*.

## COROLLAIRE I.

- FIG. 94. 110. **S** I l'on prolonge  $HA$  en  $I$ , de sorte que  $AI = AB$ , & que l'on développe la cauistique  $HFN$  en commençant au point  $I$  ; on décrira la courbe  $ILK$  telle que la tangente  $FL$  sera \* continuellement égale à la portion  $FH$  de la cauistique plus à la droite  $HI$ . Et si l'on conçoit deux rayons incident & réfléchi  $Bm, mF$  infiniment près de  $BM, MF$ , & qu'ayant prolongé  $Fm$  en  $I$ , on décrive des centres  $F, B$  les petits arcs  $MO, MR$  : on formera les petits triangles rectangles  $MOm, MRm$ , qui seront semblables & égaux ; car puisque l'angle  $OmM = FmD = RmM$ , & que de plus l'hypoténuse  $Mm$  est commune, les petits côtés  $Om, Rm$  seront égaux entr'eux. Or puisque  $Om$  est la différence de  $LM$ , &  $Rm$  celle de  $BM$ , & que cela arrive toujours en quelque endroit qu'on prenne le point  $M$ , il
- \* Art. 96. s'ensuit que  $ML - IA$  ou  $AH + HF - MF$  somme \* de toutes les différences  $Om$  dans la portion de courbe  $AM$ ,
- \* Art. 96. est  $= BM - BA$  somme \* de toutes les différences  $Rm$  dans la même portion  $AM$ . Donc la portion  $HF$  de la cauistique  $HFN$  sera égale à  $BM - BA + MF - AH$ .
- Il peut arriver différens cas, selon que le rayon incident  $BA$  est plus grand ou moindre que  $BM$ , & que le réfléchi

réfléchi  $AH$  développe ou enveloppe la portion  $HF$  pour parvenir en  $MF$  : mais l'on prouvera toujours, commel'on vient de faire, que la différence des rayons incidens est égale à la différence des rayons réfléchis, en joignant à l'un d'eux la portion de la caustique qu'il développe avant que de tomber sur l'autre. Par exemple,  $BM - BA = MF$  Fig. 95.  
 $+ FH - AH$  ; d'où l'on tire  $FH = BM - BA + AH - MF$ .

Si l'on décrit du centre  $B$  l'arc de cercle  $AP$  ; il est clair Fig. 94. 95. que  $PM$  sera la différence des rayons incidens  $BM, BA$ . Et si l'on suppose que le point lumineux  $B$  devienne infiniment éloigné de la courbe  $AMD$  ; les rayons incidens  $BA$ , Fig. 96.  $BM$  deviendront parallèles, & l'arc  $AP$  deviendra une ligne droite perpendiculaire sur ces rayons.

## COROLLAIRE II.

III. S l'on conçoit que la figure  $BAMD$  soit renver. Fig. 94. sée sur le même plan, en sorte que le point  $B$  tombe sur le point  $I$ , & qu'ainsi la tangente en  $A$  de la courbe  $AMD$  dans sa première situation, la touche encore dans cette nouvelle ; & qu'on fasse rouler la courbe  $aMd$  sur  $AMD$ , c'est à dire sur elle même, en sorte que les portions  $aM, AM$  soient toujours égales : je dis que le point  $B$  décrira dans ce mouvement une espece de roulette  $ILK$  qui aura pour développée la caustique  $HFN$ .

Car il suit de la génération, 1°. Que la ligne  $LM$  tirée du point décrivant  $L$  au point touchant  $M$  sera \* perpen. \* Art. 43. diculaire à la courbe  $ILK$ . 2°. Que  $La$  ou  $IA = BA$ , &  $LM = BM$ . 3°. Que les angles faits par les droites  $ML, BM$  sur la tangente commune en  $M$  sont égaux, & partant que si l'on prolonge  $LM$  en  $F$ , le rayon  $MF$  sera le réfléchi de l'incident  $BM$ . D'où l'on voit que la perpendiculaire  $ZF$  touche la caustique  $HFN$  : & comme cela arrive toujours en quelque endroit qu'on prenne le point  $Z$ , il s'ensuit que la courbe  $ILK$  est formée par le développement de la caustique  $HFN$ , plus la droite  $HI$ .

Il suit de ceci que la portion  $FH$  ou  $FL - HI = BM$ .

Q

+  $MF - BA - AH$ . Ce que l'on vient de démontrer d'une autre manière dans le Corollaire précédent.

### COROLLAIRE III.

112.  $S_1$  la tangente  $DN$  devient infiniment proche de la tangente  $FM$ ; il est clair que le point touchant  $N$ , & celui d'intersection  $K$  se confondront avec l'autre point touchant  $F$ : de sorte que pour trouver le point  $F$  où le rayon réfléchi  $MF$  touche la caustique  $HFN$ , il ne faut que chercher le point de concours des rayons réfléchis infiniment proches  $MF, mF$ . Et en effet, si l'on imagine une infinité de rayons d'incidence infiniment proches les uns des autres, on verra naître par les intersections des réfléchis un polygone d'une infinité de côtés dont l'assemblage composera la caustique  $HFN$ .

### PROPOSITION I.

#### Problème général.

FIG. 97. 113. *La nature de la courbe AMD, le point lumineux B, & le rayon incident BM étant donnés; trouver sur le réfléchi MF donné de position, le point F où il touche la caustique.*

Ayant trouvé par la section précédente la longueur  $MC$  du rayon de la développée au point  $M$ , & pris l'arc  $Mm$  infiniment petit, on tirera les droites  $Bm, Cm, Fm$ ; on décrira des centres  $B, F$  les petits arcs  $MR, MO$ ; on menera les perpendiculaires  $CE, Ce, CG, Cg$  sur les rayons incidents & réfléchis; ensuite on nommera les données  $BM, y; ME$  ou  $MG, a$ .

Cela posé, on prouvera, comme dans le Corollaire premier\*, que les triangles  $MRm, MOm$  sont semblables & égaux; & qu'ainsi  $MR = MO$ . Or à cause de l'égalité des angles d'incidence & de réflexion, l'on a aussi  $CE = CG, Ce = Cg$ ; & partant  $CE - Ce$  ou  $EQ = CG - Cg$  ou  $SG$ . Donc à cause des triangles semblables  $BMR$  &  $BEQ, FMO$  &  $FGS$ , l'on aura  $BM + BE(2y - a). BM(y) :: MR + EQ$

\* Art. 110.

DES INFINIMENT PETITS. I. Part. 107  
 ou  $MO + GS$ .  $MR$  ou  $MO :: MG (a)$ .  $MF = \frac{ay}{2y - a}$ .

Si le point lumineux  $B$  tomboit de l'autre côté du point  $E$  par rapport au point  $M$ , ou ( ce qui est la même chose ) si la courbe  $AMD$  étoit convexe vers le point lumineux  $B$  ;  $y$  deviendrait négative de positive qu'elle étoit, & l'on auroit par conséquent  $MF = \frac{-ay}{-2y - a}$  ou  $\frac{ay}{2y + a}$ .

Si l'on suppose que  $y$  devienne infinie, c'est à dire que le point  $B$  soit infiniment éloigné de la courbe  $AMD$  ; les rayons incidens seront parallèles entr'eux, & l'on aura  $MF = \frac{1}{2}a$ , parceque  $a$  est nulle par rapport à  $2y$ . Fig. 96.

#### COROLLAIRE I.

114. COMME l'on ne trouve pour  $MF$  qu'une seule valeur dans laquelle entre le rayon de la développée ; il s'ensuit qu'une ligne courbe  $AMD$  ne peut avoir qu'une seule caustique  $HFN$  par réflexion, puisqu'elle n'a qu'une seule développée. Fig. 94. 95.

#### COROLLAIRE II.

115. LORSQUE  $AMD$  est géométrique, il est clair \* que sa développée l'est aussi, c'est à dire que l'on trouve géométriquement tous les points  $C$ . D'où il suit que tous les points  $F$  de la caustique seront aussi déterminés géométriquement, c'est à dire que la caustique  $HFN$  sera géométrique. Mais je dis de plus, que cette caustique sera toujours réctifiable ; puisqu'il est évident \* que l'on peut trouver avec le secours de la courbe  $AMD$ , qu'on suppose géométrique, des lignes droites égales à une de ses portions quelconque. \* Art. 85. Fig. 97. Fig. 94. 95. \* Art. 110.

#### COROLLAIRE III.

116. SI la courbe  $AMD$  est convexe vers le point lumineux  $B$  ; la valeur de  $MF (\frac{ay}{2y + a})$  sera toujours positive ; & il faudra prendre par conséquent le point  $F$  du Fig. 97.  
 Oij

côté du point  $C$ , par rapport au point  $M$ , comme l'on a supposé en faisant le calcul. D'où l'on voit que les rayons réfléchis infiniment proches seront divergens.

Mais si la courbe  $AMD$  est concave vers le point lumineux  $B$ , la valeur de  $MF$  ( $\frac{xy}{y-a}$ ) sera positive lorsque  $y$  surpasse  $\frac{1}{2}a$ , négative lorsqu'il est moindre, & infinie lorsqu'il est égal. D'où il suit que si l'on décrit un cercle qui ait pour diamètre la moitié du rayon  $MC$  de la développée, les rayons réfléchis infiniment proches seront convergens lorsque le point lumineux  $B$  tombe au dehors de sa circonférence, divergens lorsqu'il tombe au dedans, & enfin parallèles lorsqu'il tombe dessus.

#### COROLLAIRE IV.

117. Si le rayon incident  $BM$  touche la courbe  $AMD$  au point  $M$ , l'on aura  $ME(a) = 0$ ; & partant  $MF = 0$ . Or comme le rayon réfléchi est alors dans la direction de l'incident, & que la nature de la caustique consiste à toucher tous les rayons réfléchis; il s'ensuit qu'elle touchera aussi le rayon incident  $BM$  au point  $M$ : c'est à dire que la caustique & la donnée auront la même tangente dans le point  $M$  qui leur sera commun.

Si le rayon  $MC$  de la développée est nul, on aura encore  $ME(a) = 0$ ; & partant  $MF = 0$ . D'où l'on voit que la donnée & la caustique font entr'elles dans le point  $M$  qui leur est commun, un angle égal à l'angle d'incidence.

Si le rayon  $CM$  de la développée est infini, le petit arc  $Mm$  deviendra une ligne droite, & l'on aura  $MF = +y$ ; puisque  $ME(a)$  étant infinie,  $y$  sera nul par rapport à  $a$ . Or comme cette valeur est négative lorsque le point  $B$  tombe du côté du point  $C$  par rapport à la ligne  $AMD$ , & positive lorsqu'il tombe du côté opposé; il s'ensuit que les rayons réfléchis infiniment proches seront toujours divergens lorsque la ligne  $AMD$  est droite.

## COROLLAIRE V.

118. IL est évident que deux quelconques des trois points  $B, C, F$ , étant donnés, on trouvera facilement le troisième.

Soit, 1°. la courbe  $AMD$  une parabole qui ait pour foyer Fig. 98.  
le point lumineux  $B$ . Il est clair par les élémens des sections coniques, que tous les rayons réfléchis seront parallèles à l'axe; & partant que  $MF$  sera toujours infinie en quelque endroit que l'on suppose le point  $M$ . On aura donc  $a = zy$ : d'où il suit que si l'on prend  $ME$  double de  $MB$ , & qu'on mene la perpendiculaire  $EC$ ; elle ira couper  $MC$  perpendiculaire à la courbe  $AMD$ , en un point  $C$  qui sera à la développée de cette courbe.

Soit 2°. la courbe  $AMD$  une ellipse qui ait pour un de Fig. 99.  
ses foyers le point lumineux  $B$ . Il est encore clair que tous les rayons réfléchis  $MF$  se rencontreront dans un même point  $F$  qui sera l'autre foyer. Et si l'on nomme  $MF, z$ ; l'on aura  $*z = \frac{zy}{zy-a}$ ; d'où l'on tire la cherchée  $ME(a) = \frac{zyz}{y+z}$  \* *Art. 113.*  
Mais si la courbe  $AMD$  est une hyperbole, le foyer  $F$  tom- Fig. 110.  
bera de l'autre côté; & partant  $MF(z)$  deviendra négative: d'où il suit qu'on aura alors  $ME(a) = \frac{-zyz}{y-z}$  ou  $\frac{zyz}{z-y}$ . Ce qui donne cette construction qui sert aussi pour l'ellipse.

Soit prise  $ME$  quatrième proportionnelle au demi-axe Fig. 99. 100.  
traversant, & aux rayons incident & réfléchi; soit menée la perpendiculaire  $EC$ : elle ira couper la ligne  $MC$  perpendiculaire à la section, en un point  $C$  qui sera à la développée.

## EXEMPLE I.

119. SOIT la courbe  $AMD$  une parabole, dont les rayons Fig. 101.  
incidents  $PM$  soient perpendiculaires sur son axe  $AP$ . Il faut trouver sur les réfléchis  $MF$  les points  $F$  où ils touchent la caustique  $AFK$ .

- Il est clair que si l'on mène le rayon  $MC$  de la développée, & qu'on tire la perpendiculaire  $CG$  sur le rayon réfléchi  $MF$ , il faudra \* prendre  $MF$  égale à la moitié de  $MG$ . Mais cette construction se peut abréger, en considérant que si l'on mène  $MN$  parallèle à l'axe  $AP$ , & la droite  $ML$  au foyer  $L$ ; les angles  $LMP$ ,  $FMN$  seront égaux, puisque par la propriété de la parabole  $LMQ = QMN$ , & par la supposition  $PMQ = QMF$ . Si donc l'on ajoute de part & d'autre le même angle  $PMF$ , l'angle  $LMF$  sera égal à l'angle  $PMN$ , c'est à dire droit. Or l'on vient de démontrer \* que  $LH$  perpendiculaire sur  $ML$  rencontre le rayon  $MC$  de la développée en son milieu  $H$ . Si donc l'on mène  $MF$  parallèle & égale à  $LH$ , elle sera un des rayons réfléchis, & touchera en  $F$  la caustique  $AFK$ . Ce qu'il falloit trouver.

\* Art. 118.  
num. 1.




Si l'on suppose que le rayon réfléchi  $MF$  soit parallèle à l'axe  $AP$ , il est évident que le point  $F$  de la caustique sera le plus éloigné qu'il est possible de l'axe  $AP$ , puisque la tangente en ce point sera parallèle à l'axe. Afin donc de déterminer ce point dans toutes les caustiques, telles que  $AFK$ , formées par des rayons incidens perpendiculaires à l'axe de la courbe donnée, il n'y a qu'à considérer que  $MP$  doit être alors égale à  $PQ$ . Ce qui donne  $dy = dx$ .

Soit  $ax = yy$ , on aura  $dy = \frac{adx}{2\sqrt{ax}} = dx$ , d'où l'on tire

$AP(x) = \frac{1}{2}a$  : c'est à dire que si le point  $P$  tombe au foyer  $L$ , le rayon réfléchi  $MF$  sera parallèle à l'axe. Ce qui est d'ailleurs visible; puisque dans ce cas  $MP$  se confondant avec  $LM$ , il faut aussi que  $MF$  se confonde avec  $MN$ , &  $LH$  avec  $LQ$ . D'où l'on voit que  $MF$  est alors égale à  $ML$ ; & partant que si l'on mène  $FR$  perpendiculaire sur l'axe, on aura  $AR$  ou  $AL + MF = \frac{1}{2}a$ . On voit aussi que la portion  $AF$  de la caustique est égale en ce cas au paramètre, puis-

- \* Art. 110. qu'elle est toujours \* égale à  $PM + MF$ .

Pour déterminer le point  $K$  où la caustique  $AFK$  rencontre l'axe  $AP$ , il faut chercher la valeur de  $MO$ , & l'é-



[illegible]

galer à celle de  $MF$ ; car il est visible que le point  $F$  tombant en  $K$ , les lignes  $MF$ ,  $MO$  deviennent égales entr'elles. Nommant donc l'inconnue  $MO$ ,  $t$ ; l'angle  $PMO$  coupé en deux également par  $MQ$  perpendiculaire à la courbe, donnera  $MP(y) \cdot MO(t) :: P Q \left( \frac{ydy}{dx} \right)$ .

$OQ = \frac{tdy}{dx}$ . & partant  $OP = \frac{tdy + ydy}{dx} = \sqrt{tt - yy}$ , à cause du triangle rectangle  $MPO$ ; & divisant de part & d'autre par  $t + y$ , on trouve  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{t-y}{t+y}}$ , d'où l'on tire

$$MO(t) = \frac{ydx^2 + ydy^2}{dx^2 - dy^2} = MF\left(\frac{1}{2}a\right) = \frac{dx^2 + dy^2}{-2ddy}, \text{ puisque } ** \text{ Art. 77.}$$

$ME(a) = \frac{dx^2 + dy^2}{-2ddy}$ . Ce qui donne  $dy^2 - 2yddy = dx^2$ , qui servira à trouver le point  $P$  tel que menant le rayon incident  $PM$  & le réfléchi  $MF$ , ce dernier touche la caustique  $AFK$  au point  $K$  où elle rencontre l'axe  $AP$ .

On a dans la parabole  $y = x^{\frac{1}{2}}$ ,  $dy = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx$ ,  $ddy = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}dx^2$ ; & mettant ces valeurs dans l'équation précédente, on trouve  $\frac{1}{4}x^{-1}dx^2 + \frac{1}{2}x^{-1}dx^2 = dx^2$ ; d'où l'on tire  $AP(x) = \frac{1}{4}$  du parametre.

Pour trouver la nature de la caustique  $AFK$  à la manière de *Descartes*, il faut chercher une équation qui exprime la relation de la coupée  $AR(u)$ , à l'appliquée  $RF(z)$ ; ce qui se fait en cette sorte. Puisque  $MO(t) = \frac{ydx^2 + ydy^2}{dx^2 - dy^2}$ , l'on aura  $PO\left(\frac{tdy + ydy}{dx}\right) = \frac{2yddy}{dx^2 - dy^2}$ , & à cause des triangles semblables  $MPO$ ,  $MSF$ , on formera ces proportions  $MO\left(\frac{ydx^2 + ydy^2}{dx^2 - dy^2}\right) \cdot MF\left(\frac{dx^2 + dy^2}{-2ddy}\right)$  ou  $-2yddy \cdot dx^2 - dy^2 :: MP(y) \cdot MS(y - r) = \frac{dx^2 - dy^2}{-2ddy} :: PO\left(\frac{2yddy}{dx^2 - dy^2}\right) \cdot SF$  ou  $PR(u - x) = \frac{dx dy}{-ddy}$ . On aura donc ces deux

équations  $z = y + \frac{dy^2 - dx^2}{2ddy}$ , &  $u = x + \frac{xdy}{2dy}$ , qui serviront avec celle de la courbe donnée à en former une nouvelle où  $x$  &  $y$  ne se trouveront plus, & qui exprimera par conséquent la relation de  $AR(u)$  à  $FR(z)$ .

Lorsque la courbe  $AMD$  est une parabole, comme l'on a supposé dans cet exemple, on trouvera  $z = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$  —  $2x^{\frac{1}{2}}$ , ou (en quarrant chaque membre)  $\frac{1}{4}x - 6xx + 4x^3 = zz$ , &  $u = 3x$ ; d'où l'on tire l'équation cherchée  $azz = \frac{4}{27}u^3 - \frac{2}{3}auu + \frac{1}{4}aau$  qui exprime la nature de la caustique  $AFK$ . On peut remarquer que  $PR$  est toujours double de  $AP$ , puisque  $AR(u) = 3x$ ; ce qui fournit encore une nouvelle manière de déterminer sur le rayon réfléchi  $MF$  le point cherché  $F$ .

### EXEMPLE II.

FIG. 102. 120. SOIT la courbe  $AMD$  un demi-cercle qui ait pour diamètre la ligne  $AD$ , & pour centre le point  $C$ ; soient les rayons incidens  $PM$  perpendiculaires sur  $AD$ .

Comme la développée du cercle se réunit en un seul point qui en est le centre, il s'ensuit\* que si l'on coupe le rayon  $CM$  en deux également au point  $H$ , & qu'on mene  $HF$  perpendiculaire sur le rayon réfléchi  $MF$ , il coupera ce rayon en un point  $F$ , où il touche la caustique  $AFK$ . Il est clair que le rayon réfléchi  $MF$  est égal à la moitié de l'incident  $PM$ ; d'où il suit, 1°. Que le point  $P$  tombant en  $C$ , le point  $F$  tombe en  $K$  milieu de  $CB$ . 2°. Que la portion  $AF$  est triple de  $MF$ , & la caustique  $AFK$  triple de  $BK$ . On voit aussi que si l'on fait l'angle  $ACM$  demi-droit, le rayon réfléchi  $MF$  sera parallèle à  $AC$ ; & partant que le point  $F$  sera plus élevé au dessus du diamètre  $AD$ , que tout autre point de la caustique.

Le cercle qui a pour diamètre  $MH$ , passe par le point  $F$ ; puisque l'angle  $HFM$  est droit. Et si l'on décrit du centre

tre  $C$  & du rayon  $CK$  ou  $CH$ , moitié de  $CM$ , le cercle  $KHG$ ; l'arc  $HF$  sera égal à l'arc  $HK$ : car l'angle  $CMF$  étant égal à  $CMP$  ou  $HCK$ , les arcs  $\frac{1}{2}HF$ ,  $HK$  qui mesurent ces angles dans les cercles  $MFH$ ,  $KHG$ , seront entre eux comme les rayons  $\frac{1}{2}MH$ ,  $HC$  de ces cercles. D'où l'on voit que la caustique  $AFK$  est une roulette formée par la révolution du cercle mobile  $MFH$  autour de l'immobile  $KHG$ , dont l'origine est en  $K$ , & le sommet en  $A$ .

## EXEMPLE III.

121. SOIT la courbe  $AMD$  un cercle qui ait pour dia- Fig. 103.  
mètre la ligne  $AD$ , & pour centre le point  $C$ ; soit le point lumineux  $A$ , d'où partent tous les rayons incidents  $AM$ , l'une des extrémités de ce diamètre.

Si l'on mène du centre  $C$  sur le rayon incident  $AM$  la perpendiculaire  $CE$ : il est clair par la propriété du cercle, que le point  $E$  coupe en deux parties égales la corde  $AM$ ; & qu'ainsi  $ME(a) = \frac{1}{2}y$ . On aura donc  $MF(\frac{ay}{2y-a}) = \frac{1}{2}y$ : c'est à dire qu'il faut prendre le rayon réfléchi  $MF$  égal au tiers de l'incident  $AM$ . D'où l'on voit que  $DK = \frac{1}{3}AD$ ,  $CK = \frac{1}{3}CD$ , & que \* la caustique  $AFK$  \* Art. 110.  
 $= \frac{2}{3}AD$ , de même que la portion  $AF = \frac{2}{3}AM$ . Si l'on prend  $AM = AC$ , le rayon réfléchi  $MF$  sera parallèle au diamètre  $AD$ ; & par conséquent le point  $F$  sera le plus élevé qu'il soit possible au dessus de ce diamètre.

Si l'on prend  $CH = \frac{1}{3}CM$ , & qu'on tire  $HF$  perpendiculaire sur  $MF$ ; le point  $F$  sera à la caustique: car menant  $HL$  perpendiculaire sur  $AM$ , il est clair que  $ML = \frac{2}{3}ME = \frac{1}{3}AM$ , puisque  $MH = \frac{2}{3}CM$ . Le cercle qui a pour diamètre  $MH$ , passera donc par le point  $F$  de la caustique; & si l'on décrit un autre cercle  $KHG$  du centre  $C$ , & du rayon  $CK$  ou  $CH$ , il lui sera égal, & l'arc  $HK$

sera égal à l'arc  $HF$  : car dans le triangle isoscele  $CMA$  l'angle externe  $KCH = 2CMA = AMF$  ; & partant les arcs  $HK$ ,  $HF$  mesures de ces angles dans des cercles égaux , seront aussi égaux. D'où il suit que la caustique  $AFK$  est encore une roulette décrite par la révolution du cercle mobile  $MFH$  autour de l'immobile  $KHG$  , dont l'origine est en  $K$ , & le sommet en  $A$ .

On pourroit encore prouver ceci de cette autre manière. Si l'on décrit une roulette par la révolution d'un cercle égal au cercle  $AMD$  autour de celui ci, en commençant au point  $A$  ; l'on a démontré dans le Corollaire  
 § \* Art. 111. second \* qu'elle aura pour développée la caustique  $AFK$ . Or  
 \* Art. 100. \* cette développée est une roulette de même espece, c'est à dire que les diamètres des cercles générateurs en seront égaux ; & on déterminera le point  $K$  en prenant  $CK$  troisième proportionnelle à  $CD + DA$  & à  $CD$ , c'est à dire égale à  $\frac{1}{3} CD$ . Donc, &c.

#### EXEMPLE IV.

FIG. 104. 122. SOIT la courbe  $AMD$  une demi-roulette ordinaire décrite par la révolution du demi cercle  $NGM$  sur la droite  $BD$ , dont le sommet est en  $A$ , & l'origine en  $D$  ; soient les rayons incidens  $KM$  parallèles à l'axe  $AB$ .

\* Art. 95. Puisque \*  $MG$  est égale à la moitié du rayon de la développée, il s'ensuit \* que si l'on mene  $GF$  perpendiculaire sur le rayon réfléchi  $MF$ , le point  $F$  sera à la caustique  $DFB$ . D'où l'on voit que  $MF$  doit être prise égale à  $KM$ .

Si l'on mene du centre  $H$  du cercle générateur  $MGN$  au point touchant  $G$ , & au point décrivant  $M$ , les rayons  $HG$ ,  $HM$  ; il est clair que  $HG$  sera perpendiculaire sur  $BD$ , & que l'angle  $GMH = MGH = GMK$  : d'où l'on voit que le rayon réfléchi  $MF$  passe par le centre  $H$ . Or le cercle qui a pour diamètre  $GH$ , passe aussi par le point  $F$  ; puisque l'angle  $GFH$  est droit. Donc les arcs  $GN$ ,  $\frac{1}{2}GF$ , mesures du même angle  $GHN$ , seront entr'eux comme les diamètres

$MN, GH$  de leurs cercles; & partant l'arc  $GF = GN = GB$ . Il est donc évident que la caustique  $DFB$  est une roulette décrite par la révolution entière du cercle  $GFH$  sur la droite  $BD$ .

## EXEMPLE V.

123. SOIT encore la courbe  $AMD$  une demi roulette FIG. 105.  
ordinaire, dont la base  $BD$  est égale à la demi-circonférence  $ANB$  du cercle générateur. Et soient à présent les rayons incidens  $PM$  parallèles à la base  $BD$ .

Si l'on mène  $GQ$  perpendiculaire sur  $PM$ , les triangles rectangles  $GQM, BPN$  seront égaux & semblables; & partant  $MQ = PN$ . D'où l'on voit \* qu'il faut prendre \* *Art. 95.*  
 $MF$  égale à l'appliquée correspondante  $PN$  dans le demi-cercle générateur  $ANB$ . 113.

Afin que le point  $F$  soit le plus éloigné qu'il est possible de l'axe  $AB$ , il faut que la tangente  $MF$  en ce point soit parallèle à cet axe. L'angle  $PMF$  sera donc alors droit, sa moitié  $PMG$  ou  $PNB$  demi droit; & partant le point  $P$  tombera dans le centre du cercle  $AND$ .

C'est une chose digne de remarque, que le point  $P$  approchant ensuite continuellement de l'extrémité  $B$ , le point  $F$  approche aussi de l'axe  $AB$  jusqu'à un certain point  $K$ , après quoi il s'en éloigne jusqu'en  $D$ ; de sorte que la caustique  $AFKFD$  a un point de rebroussement en  $K$ .

Pour le déterminer, je remarque \* que la portion  $AF$  \* *Art. 110.*  
 $= PM + MF$ , la portion  $AFK = HL + LK$ , & la portion 111.  
 $KF$  de la partie  $KFD$ , est  $= HL + LK - PM - MF$ : d'où l'on voit que  $HL + LK$  doit être un *plus grand*. C'est pourquoi nommant  $AH, x$ ;  $HI, y$ ; l'arc  $AI, u$ ; l'on aura  $HL + LK = u + 2y$ , dont la différence donne  $du + 2dy = 0$ , &  $\frac{adx}{y} + 2dy = 0$ , en mettant pour  $du$  sa valeur  $\frac{adx}{y}$ : d'où l'on tire  $adx = -2ydy = xdx - 2adx$  à cause du cercle; & partant  $AH(x) = \frac{1}{2}a$ .

## COROLLAIRE.

124. L'ESPACE  $AFM$  ou  $AFKFM$  renfermé par les portions de courbes  $AF$  ou  $AFKE$ ,  $AM$ , & par le rayon réfléchi  $MF$ , est égal à la moitié de l'espace circulaire  $APN$ . Car la différence, qui est le secteur  $FMO$ , est égale à la moitié du rectangle  $PpSN$ , différence de l'espace  $APN$ ; puisque les triangles rectangles  $MOm$ ,  $MRm$  étant égaux & semblables,  $MO$  sera égale à  $MR$  ou  $NS$  ou  $Pp$ , & que de plus  $MF = PN$ .

## EXEMPLE VI.

FIG. 106. 125. SOIT la courbe  $AMD$  une demi-roulette formée par la révolution du cercle  $MGN$  autour de son égal  $AGK$ , dont l'origine est en  $A$ , & le sommet en  $D$ ; soient les rayons inciens  $AM$  qui partent tous du point  $A$ . La ligne  $BH$  qui joint les centres des deux cercles générateurs, passe continuellement par le point touchant  $G$ , & les arcs  $GM$ ,  $GA$  comme aussi leurs cordes, sont toujours égaux; ainsi l'angle  $HGM = BGA$ , & l'angle  $GMA = GAM$ . Or l'angle  $HGM + BGA = GMA + GAM$ ; puisqu'ajoutant de part & d'autre le même angle  $AGM$ , on en forme deux droits. Donc l'angle  $HGM$  sera toujours égal à l'angle  $GMA$ ; & partant aussi à l'angle de réflexion  $GMF$ : d'où il suit que  $MF$  passe toujours par le centre  $H$  du cercle mobile.

Maintenant si l'on mène les perpendiculaires  $CE$ ,  $GO$  sur le rayon incident  $AM$ : il est clair que  $MO = OA$ , & que

\* Art. 100.  $OE = \frac{1}{3}OM$ ; puisque\* le point  $C$  étant à la développée,  $GC = \frac{1}{3}GM$ . On aura donc  $ME = \frac{2}{3}AM$ , c'est à dire  $a = \frac{2}{3}y$ ; & par conséquent  $MF \left( \frac{ay}{\frac{2}{3}y - a} \right) = \frac{1}{3}y$ : d'où l'on voit que si l'on mène  $GF$  perpendiculaire sur  $MF$ , le point  $F$  sera à la caustique  $AFK$ .

Le cercle qui a pour diamètre  $GH$ , passe par le point  $F$ ; & les arcs  $GM$ ,  $\frac{1}{2}GF$ , mesures du même angle  $GHM$ , étant

entr'eux comme les diamètres  $MN$ ,  $GH$  de leurs cercles, l'arc  $GF$  sera égal à l'arc  $GM$ , & par conséquent à l'arc  $GA$ . D'où il est évident que la caustique  $AFK$  est une roulette décrite par la révolution du cercle mobile  $HFG$  autour de l'immobile  $AGK$ .

## COROLLAIRE.

126. **S**i l'on décrit un cercle qui ait pour centre le point  $B$ , & pour rayon une droite égale à  $BH$  ou  $AK$ ; & qu'il y ait une infinité de droites parallèles à  $BD$  qui tombent sur sa circonférence: il est visible \* qu'elles formeront en se réfléchissant la même caustique  $AFK$ . \* Art. 110.

## EXEMPLE VII.

127. **S**oit la courbe  $AMD$  une logarithmique spirale, avec les rayons incidens  $AM$  qui partent tous du centre  $A$ . FIG. 107.

Si l'on mène par l'extrémité  $C$  du rayon de la développée la droite  $CA$  perpendiculaire sur le rayon incident  $AM$ , elle le rencontrera \* dans le centre  $A$ . C'est \* Art. 91.

pourquoi  $AM(y) = a$ ; & partant  $MF\left(\frac{ay}{y-a}\right) = y$ . Le triangle  $AMF$  sera donc isoscele; & comme les angles d'incidence & de réflexion  $AMT$ ,  $FMS$  sont égaux entre eux, il s'ensuit que l'angle  $AFM$  est égal à l'angle  $AMT$ . D'où il est clair que la caustique  $AFK$  sera une logarithmique spirale qui ne différera de la proposée  $AMD$  que par sa position.

## PROPOSITION II.

## Problème.

128. **L**a caustique  $HF$  par réflexion étant donnée avec le point lumineux  $B$ ; trouver une infinité de courbes telles que  $AM$ , dont elle soit caustique par réflexion. FIG. 108.

Ayant pris à discrétion sur une tangente quelconque  $HA$  le point  $A$  pour un des points de la courbe cherchée  $AM$ ;

on décrira du centre  $B$ , de l'intervalle  $BA$  l'arc de cercle  $AP$ , & d'un autre intervalle quelconque  $BM$ , un autre arc de cercle. Et ayant pris  $AH + HE = BM - BA$  ou  $PM$ , on développera la caustique  $HF$  en commençant au point  $E$ ; & l'on décrira dans ce mouvement une ligne courbe  $EM$  qui coupera l'arc de cercle décrit du rayon

\* Art. 110.  $BM$ , en un point  $M$  qui sera \* à la courbe  $AM$ . Car par construction  $PM = MF = AH + HF$ .

Ou bien ayant attaché un fil  $BMF$  par ses extrémités en  $B$  & en  $F$ , on fera tendre ce fil par le moyen d'un stile placé en  $M$ , que l'on fera mouvoir en sorte que l'on enveloppera par la partie  $MF$  de ce fil la caustique  $HF$ ; il est clair que ce stile décrira dans ce mouvement la courbe cherchée  $MA$ .

#### AUTRE SOLUTION.

129. **A**YANT tiré à discrétion une tangente  $FM$  autre que  $HA$ , on cherchera sur elle un point  $M$ , tel que  $BM + MF = BA + AH + HF$ . Ce qui se fera en cette sorte.

Soit prise  $FK = BA + AH + HF$ , & divisant  $BK$  par le milieu en  $G$ , soit tirée la perpendiculaire  $GM$ : elle rencontrera la tangente  $FM$  au point cherché  $M$ . Car  $BM = MK$ .

FIG. 109. Si le point  $B$  étoit infiniment éloigné de la courbe  $AM$ , c'est à dire que les rayons incidents  $BA$ ,  $BM$  fussent parallèles à une ligne droite donnée de position; la première construction auroit toujours lieu, en considérant que les arcs de cercles décrits du centre  $B$  deviennent des lignes droites perpendiculaires sur les rayons incidents. Mais cette dernière deviendrait inutile; c'est pourquoi il faudroit lui substituer celle qui suit.

Soit prise  $FK = AH + HF$ . Ayant trouvé le point  $M$  tel que  $MP$  parallèle à  $AB$  perpendiculaire sur  $AP$ , soit égale à  $MK$ : il est clair \* que ce point sera à la courbe cherchée  $AM$ ; puisque  $PM + MF = AH + HF$ . Or cela se fait ainsi.

\* Art. 110.

Soit menée  $KG$  perpendiculaire sur  $AP$ ; & ayant pris  $KO = KG$ , soient tirées  $KP$  parallèle à  $OG$ , &  $PN$  parallèle à  $GK$ : je dis que le point  $M$  sera celui qu'on cherche.

Car à cause des triangles semblables  $GKO$ ,  $PMK$ , l'on aura  $PM = MK$  ; puisque  $GK = KO$ .

Si la caustique  $HF$  se réunissoit en un point, la courbe  $AM$  deviendroit une section conique.

## COROLLAIRE I.

130. IL est clair que la courbe qui passe par tous les points  $K$ , est formée par le développement de la courbe  $HF$  en commençant en  $A$ , & qu'elle change de nature à mesure que le point  $A$  change de place sur la tangente  $AH$ . Donc puisque les courbes  $AM$  naissent toutes de ces courbes par la même construction, qui est géométrique ; il s'ensuit\* qu'elles sont d'une nature différente en- \* Art. 108. tr'elles, & qu'elles ne sont géométriques que lorsque la caustique  $HF$  est géométrique & rectifiable.

## COROLLAIRE II.

131. UNE ligne courbe  $DN$  étant donnée avec un point FIG. 110. lumineux  $C$  ; trouver une infinité de lignes telles que  $AM$ , en sorte que les rayons réfléchis  $DA$ ,  $NM$  se réunissent en un point donné  $B$ , après s'être réfléchis de nouveau à la rencontre de ces lignes  $AM$ .

Si l'on imagine que la courbe  $HF$  soit la caustique de la donnée  $DN$ , formée par le point lumineux  $C$  ; il est clair que cette ligne  $HF$  doit être aussi la caustique de la courbe  $AM$  ayant pour point lumineux le point donné  $B$  ; de sorte que  $FK = BA + AH + HF$ , &  $NK = BA + AH + HF + FN = BA + AD + DC - CN$ , puisque\*  $HD + DC = HF + FN + NC$ . Ce qui donne cette constru- \* Art. 112. ction.

Ayant pris à discrétion sur un rayon réfléchi quelconque le point  $A$  pour un des points de la courbe cherchée  $AM$ , on prendra sur un autre rayon réfléchi  $NM$  tel qu'on voudra, la partie  $NK = BA + AD + DC - CN$  ; & l'on trouvera le point cherché  $M$  comme ci-dessus, art. 129.

## SECTION VII.

*Usage du Calcul des différences pour trouver les  
Cautistiques par réfraction.*

## DÉFINITION.

- FIG. III. **S** I l'on conçoit qu'une infinité de rayons  $BA, BM, BD$ , qui partent d'un même point lumineux  $B$ , se rompent à la rencontre d'une ligne courbe  $AMD$ , en s'approchant ou s'éloignant de ses perpendiculaires  $MC$ , en sorte que les sinus  $CE$  des angles d'incidence  $CME$ , soient toujours aux sinus  $CG$  des angles de réfraction  $CMG$ , en même raison donnée de  $m$  à  $n$  ; la ligne courbe  $HFN$  que touchent tous les rayons rompus ou leurs prolongemens  $AH, MF, DN$ , est appelée *Cautistique par réfraction*.
- FIG. III. **S** I l'on conçoit qu'une infinité de rayons  $BA, BM, BD$ , qui partent d'un même point lumineux  $B$ , se rompent à la rencontre d'une ligne courbe  $AMD$ , en s'approchant ou s'éloignant de ses perpendiculaires  $MC$ , en sorte que les sinus  $CE$  des angles d'incidence  $CME$ , soient toujours aux sinus  $CG$  des angles de réfraction  $CMG$ , en même raison donnée de  $m$  à  $n$  ; la ligne courbe  $HFN$  que touchent tous les rayons rompus ou leurs prolongemens  $AH, MF, DN$ , est appelée *Cautistique par réfraction*.

## COROLLAIRE.

132. **S** I l'on envelope la caustique  $HFN$  en commençant au point  $A$ , l'on décrira la courbe  $ALK$  telle que la tangente  $LF$  plus la portion  $FH$  de la caustique sera continuellement égale à la même droite  $AH$ . Et si l'on conçoit une autre tangente  $Fml$  infiniment proche de  $FML$ , avec un autre rayon d'incidence  $Bm$ , & qu'on décrive des centres  $F, B$ , les petits arcs  $MO, MR$  : on formera deux petits triangles rectangles  $MRm, MOm$  qui seront semblables aux deux autres  $MEC, MGC$ , chacun à chacun ; puisque si l'on ôte des angles droits  $RME, CMm$  le même angle  $EMm$ , les angles restans  $RMm, EMC$  seront égaux ; & de même si l'on ôte des angles droits  $GMO, CMm$  le même angle  $GMm$ , les restans  $OMm, GMC$  seront égaux. C'est pourquoi  $Rm.Om :: CE.CG :: m.n$ . Or puisque  $Rm$  est la différence de  $BM$ , &  $Om$  celle de  $LM$  ; il s'ensuit\* que  $BM - BA$  somme de toutes les différences  $Rm$  dans la portion de courbe  $AM$ , est à  $ML$  ou  $AH - MF - FH$  somme de toutes les différences  $Om$  dans la même portion.
- \* Art. 96.

tion  $AM$ , comme  $m$  est à  $n$ ; & partant que la portion

$$FH = AH - MF + \frac{n}{m} BA - \frac{n}{m} BM.$$

Il peut arriver différens cas, selon que le rayon incident  $BA$  est plus grand ou moindre que  $BM$ , & que le rompu  $AH$  envelope ou dévelope la portion  $HF$ : mais on prouvera toujours, comme l'on vient de faire, que la différence des rayons incidens est à la différence des rayons rompus (en joignant à l'un d'eux la portion de la caustique qu'il dévelope avant que de tomber sur l'autre) comme  $m$  est à  $n$ . Par exemple,  $BA - BM : AH - MF = FH$  FIG. 112.

$$:: m : n. \text{ d'où l'on tire } FH = AH - MF + \frac{n}{m} BM - \frac{n}{m} BA.$$

Si l'on décrit du centre  $B$  l'arc du cercle  $AP$ ; il est clair FIG. 113. que  $PM$  sera la différence des rayons incidens  $BM, BA$ . Et si l'on suppose que le point lumineux  $B$  devienne infiniment éloigné de la courbe  $AMD$ , les rayons incidens  $BA, BM$  deviendront parallèles, & l'arc  $AP$  deviendra une ligne droite perpendiculaire sur ces rayons.

## PROPOSITION I.

### Problème général.

133. LA nature de la courbe  $AMD$ , le point lumineux  $B$ , FIG. 113. & le rayon incident  $BM$  étant donnés; trouver sur le rayon rompu  $MF$  donné de position, le point  $F$  où il touche la caustique par réfraction.

Ayant trouvé \* la longueur  $MC$  du rayon de la développée au point donné  $M$ , & pris l'arc  $Mm$  infiniment petit, on tirera les droites  $Bm, Cm, Fm$ ; on décrira des centres  $B, F$ , les petits arcs  $MR, MO$ ; on menera les perpendiculaires  $CE, Ce, CG, Cg$  sur les rayons incidens & rompus; & l'on nommera les données  $BM, y; ME, a; MG, b$ ; & le petit arc  $MR, dx$ . Cela posé,

Les triangles rectangles semblables  $MEC$  &  $MRm$ ,  $MGC$  &  $MOm$ ,  $BMR$  &  $BQe$ , donneront  $ME (a) . MG (b) :: MR (dx) . MO = \frac{b dx}{a}$ . Et  $BM (y) . BQ$  ou  $BE$

Q

\* *Sect. 5.*

$(y + a) :: MR(dx). Qe = \frac{adx + ydx}{y}$ . Or par la propriété de la réfraction  $Ce.Cg :: m.n$ . Et partant  $m.n :: Ce - CE$  ou  $Qe (\frac{adx + ydx}{y})$ .  $Cg - CG$  où  $Sg = \frac{an dx + ny dx}{my}$ . Donc à cause des triangles rectangles semblables  $FMO$  &  $FSG$ , l'on aura  $MO - Sg (\frac{bm dx + an dx - aan dx}{amy})$ .  $MO (\frac{b dx}{a}) :: MS$  ou  $MG(b)$ .  $MF = \frac{bbmy}{bmy - any - aan}$ . Ce qui donne cette construction.

FIG. III. Soit fait vers  $CM$  l'angle  $ECH = GCM$ , & soit prise vers  $B$ ,  $MK = \frac{an}{y}$ . Je dis que si l'on fait  $HK$ .  $HE :: MG$ .  $MF$ . le point  $F$  sera à la caustique par réfraction.

Car à cause des triangles semblables  $CGM, CEH$ , l'on aura  $CG.CE :: n.m :: MG(b).EH = \frac{bm}{n}$ . D'où l'on tire  $HE - ME$  ou  $HM = \frac{bm - an}{n}$ ,  $HM - MK$  ou  $HK = \frac{bmy - any - aan}{ny}$ ; & partant  $HK (\frac{bmy - any - aan}{ny})$ .  $HE (\frac{bm}{n}) :: MG(b)$ .  $MF = \frac{bbmy}{bmy - any - aan}$ .

Il est clair que si la valeur de  $HK$  est négative, celle de  $MF$  le sera aussi: d'où il suit que le point  $M$  tombe entre les points  $G, F$ , lorsque le point  $H$  se trouve entre les points  $K, E$ .

FIG. III. Si le point lumineux  $B$  tomboit du côté du point  $E$ , ou (ce qui est la même chose) si la courbe  $AMD$  étoit concave du côté du point lumineux  $B$ ;  $y$  deviendrait négative de positive qu'elle étoit auparavant, & l'on auroit par conséquent  $MF = \frac{-bbmy}{-bmy + any - aan}$  ou  $\frac{bbmy}{bmy - any + aan}$ . Et la construction demeurerait la même.

Si l'on suppose que  $y$  devienne infinie: c'est à dire que le point lumineux  $B$  soit infiniment éloigné de la courbe  $AMD$ ; les rayons incidens seront parallèles entr'eux, & l'on aura  $MF = \frac{bbm}{bm - an}$ , parceque le terme  $aan$  sera nul

par rapport aux deux autres  $bmy$ ,  $any$ ; & comme  $MK \left(\frac{aa}{y}\right)$  s'évanouit alors, il n'y aura qu'à faire  $HM:HE::MG:MF$ .

## COROLLAIRE I.

134. ON démontrera, de même que dans les caustiques par réflexion\*, qu'une ligne courbe  $AMD$  n'a qu'une \* *Art.* 114. seule caustique par réfraction, la raison de  $m$  à  $n$  étant donnée; laquelle caustique est toujours géométrique & redoublable, lorsque la courbe proposée  $AMD$  est géométrique.

## COROLLAIRE II.

135. Si le point  $E$  tombe de l'autre côté de la perpendiculaire  $MC$  par rapport au point  $G$ , & que  $CE$  soit égale à  $CG$ ; il est clair que la caustique par réfraction se changera en caustique par réflexion. En effet on aura  $MF$   $\left(\frac{bbmy}{bmy - any + aan}\right) = \frac{ay}{ay + a}$ ; puisque  $m=n$ , & que  $a$  devient négative de positive qu'elle étoit, & de plus égale à  $b$ . Ce qui s'accorde avec ce qu'on a démontré dans la section précédente.

Si  $m$  est infinie par rapport à  $n$ ; il est clair que le rayon rompu  $MF$  tombera sur la perpendiculaire  $CM$ : de sorte que la caustique par réfraction deviendra la développée. En effet on aura  $MF=b$ , qui devient en ce cas  $MC$ : c'est-à-dire que le point  $F$  tombera sur le point  $C$ , qui est à la développée.

## COROLLAIRE III.

136. Si la courbe  $AMD$  est convexe vers le point lumineux  $B$ , & que la valeur de  $MF \left(\frac{bbmy}{bmy - any - aan}\right)$  soit positive; il est clair qu'il faudra prendre le point  $F$  du même côté du point  $G$ , par rapport au point  $M$ , comme on l'a supposé en faisant le calcul: & qu'au contraire si elle est négative, il le faudra prendre du côté opposé. Il en est de même lorsque la courbe  $AMD$  est concave vers le point  $B$ ; mais il faut observer qu'on aura pour lors

Q ij

$MF = \frac{bmy}{bmy - any + aan}$ . D'où il suit que les rayons rompus infiniment proches sont convergens lorsque la valeur de  $MF$  est positive dans le premier cas, & négative dans le second; & qu'au contraire ils sont divergens lorsqu'elle est négative dans le premier cas, & positive dans le second. Cela posé, il est évident,

1°. Que si la courbe  $AMD$  est convexe vers le point lumineux  $B$ , & que  $m$  soit moindre que  $n$ ; ou que si elle est concave vers ce point, & que  $m$  surpasse  $n$ : les rayons rompus infiniment proches seront toujours divergens.

2°. Que si la courbe  $AMD$  est convexe vers le point lumineux  $B$ , & que  $m$  surpasse  $n$ ; ou que si elle est concave vers ce point, & que  $m$  soit moindre que  $n$ : les rayons rompus infiniment proches seront convergens, lorsque  $MK(\frac{aa}{y})$  est moindre que  $MH(\frac{bm}{n} - a$  ou  $a - \frac{bm}{n})$ ; divergens, lorsqu'elle est plus grande; & parallèles, lorsqu'elle est égale. Or comme  $MK = 0$ , lorsque les rayons incidens sont parallèles, il s'ensuit qu'en ce cas les rayons rompus infiniment proches seront toujours convergens.

#### COROLLAIRE IV.

137. Si le rayon incident  $BM$  touche la courbe  $AMD$  au point  $M$ , l'on aura  $ME(a) = 0$ ; & partant  $MF = b$ . Ce qui fait voir que le point  $F$  tombe alors sur le point  $G$ .

Si le rayon incident  $BM$  est perpendiculaire à la courbe  $AMD$ , les droites  $ME(a)$  &  $MG(b)$  deviendront égales chacune au rayon  $CM$  de la développée; puisqu'elles se confondent avec lui. On aura donc  $MF = \frac{bmy}{my - ny + bn}$ , qui devient  $\frac{bm}{m - n}$  lorsque les rayons incidens sont parallèles entr'eux.

Si le rayon rompu  $MF$  touche la courbe  $AMD$  au point  $M$ , l'on aura  $MG(b) = 0$ . D'où l'on voit que la caustique touche alors la courbe donnée au point  $M$ .

Si le rayon  $CM$  de la développée est nul, les droites  $ME(a)$ ,  $MG(b)$  seront aussi égales à zéro, & par conséquent les termes  $aan$ ,  $bbmy$  sont nuls par rapport aux autres  $bmy$ ,  $any$ . D'où il suit que  $MF = 0$ ; & qu'ainsi la caustique a le point  $M$  commun avec la courbe donnée.

Si le rayon  $CM$  de la développée est infini, les droites  $ME(a)$ ,  $MG(b)$  seront aussi infinies, & par conséquent les termes  $bmy$ ,  $any$  seront nuls par rapport aux autres  $aan$ ,  $bbmy$ : de sorte qu'on aura  $MF = \frac{bbmy}{+aan}$ . Or \* com \* Art. 133.

me cette quantité est négative lorsque l'on suppose que le point  $F$  tombe de l'autre côté du point  $B$  par rapport à la ligne  $AMD$ , & qu'au contraire elle est positive lorsqu'on suppose qu'il tombe du même côté; il s'ensuit \* que \* Art. 136. l'on doit prendre le point  $F$  du même côté du point  $B$ , c'est-à-dire que les rayons rompus infiniment proches sont divergens. Il est évident que le petit arc  $Mm$  devient alors une ligne droite, & que la construction précédente n'a plus de lieu. On peut lui substituer celle-ci, qui servira à déterminer les points des caustiques par réfraction lorsque la ligne  $AMD$  est droite.

Ayant mené  $BO$  perpendiculaire sur le rayon incident Fig. 114.  $BM$ , & qui rencontre en  $O$  la droite  $MC$  perpendiculaire sur  $AD$ ; on tirera  $OL$  perpendiculaire sur le rayon rompu  $MG$ , & ayant fait l'angle  $BOH$  égal à l'angle  $ZOM$ , on fera  $BM \cdot BH :: ML \cdot MF$ . Je dis que le point  $F$  sera à la caustique par réfraction.

Car les triangles rectangles  $MEC$  &  $MBO$ ,  $MGC$  &  $MYO$  seront toujours semblables de quelque grandeur que l'on suppose  $CM$ ; & partant lorsqu'elle devient infinie, l'on aura encore  $ME(a) \cdot MG(b) :: BM(y) \cdot ML = \frac{by}{a}$ . Et à cause des triangles semblables  $OLM$ ,  $OBH$ , l'on aura aussi  $OL \cdot OB(n \cdot m) :: ML(\frac{by}{a}) \cdot BH = \frac{bmy}{an}$ . D'où l'on voit que  $BM(y) \cdot BH(\frac{bmy}{an}) :: ML(\frac{by}{a}) \cdot MF(\frac{bbmy}{aan})$ .

## COROLLAIRE V.

138. IL est clair que deux quelconques des trois points  $B, C, F$ , étant donnés, on peut facilement trouver le troisième.

## EXEMPLE I.

FIG. 115. 139. SOIT la courbe  $AMD$  un quart de cercle qui ait pour centre le point  $C$ ; soient les rayons incidens  $BA, BM, BD$  parallèles entr'eux, & perpendiculaires sur  $CD$ ; soit enfin la raison de  $m$  à  $n$ , comme 3 à 2, qui est celle que souffrent les rayons de lumière en passant de l'air dans le verre. Puisque la développée du cercle  $AMD$  se réunit en un point  $C$  qui en est le centre, il s'ensuit que si l'on décrit une demi-circonférence  $MEC$  qui ait pour diamètre le rayon  $CM$ , & qu'on prenne la corde  $CG = \frac{1}{2}CE$ ; la ligne  $MG$  sera le rayon rompu, sur lequel on déterminera le point  $F$ , comme l'on a enseigné ci-devant art. 133.

Pour trouver le point  $H$  où le rayon incident  $BA$  perpendiculaire sur  $AMD$  touche la caustique par réfraction,


\* Art. 137. on aura  $*AH(\frac{bm}{m-n}) = 3b = 3CA$ . Et si l'on décrit une demi-circonférence  $CND$  qui ait pour diamètre le rayon  $CD$ , & qu'on prenne la corde  $CN = \frac{2}{3}CD$ ; il est

\* Art. 137. clair \* que le point  $N$  sera à la caustique par réfraction, puisque le rayon incident  $BD$  touche le cercle  $AMD$  au point  $D$ .


\* Art. 131. Si l'on mène  $AP$  parallèle à  $CD$ ; il est visible \* que la portion  $FH = AH - MF - \frac{2}{3}PM$ : de sorte que la caustique entière  $HFN = \frac{7}{3}CA - DN = \frac{2-\sqrt{2}}{3}CA$ .

FIG. 116. Si le quart de cercle  $AMD$  est concave vers les rayons incidens  $BM$ , & que la raison de  $m$  à  $n$  soit de 2 à 3; on prendra sur la demi-circonférence  $CEM$  qui a pour diamètre le rayon  $CM$ , la corde  $CG = \frac{1}{2}CE$ , & on tirera le rayon rompu  $MG$  sur lequel on déterminera le point  $F$  par la construction générale art. 133.


00.



105.



108.



112 .





On aura  $^*AH \left( \frac{bm}{m-n} \right) = -2b$ , c'est à dire que  $^*AH$  sera  $^*Art. 137.$

du côté  $^*$  de la convexité du quart de cercle  $AMD$ , &  $^*Art. 136.$   
double du rayon  $AC$ . Et si l'on suppose que  $CG$  ou  $\frac{1}{2} CE$   
soit égale à  $CM$ ; il est manifeste que le rayon rompu  $MF$   
touchera le cercle  $AMD$  en  $M$ , puisqu'alors le point  $G$  se  
confondra avec le point  $M$ . D'où il suit que si l'on prend  
 $CE = \frac{1}{2} CD$ , le point  $M$  tombera au point  $N$  où la cau-  
stique  $^*HFN$  touche le quart de cercle  $AMD$ . Mais lors-  $^*Art. 137.$   
que  $CE$  surpasse  $\frac{1}{2} CD$ , les rayons incidens  $BM$  ne pour-  
ront plus se rompre, c'est à dire passer du verre dans l'air;  
puisque'il est impossible que  $CG$  perpendiculaire sur le rayon  
rompu  $MG$ , soit plus grande que  $CM$ : de sorte que tous  
les rayons qui tomberont sur la partie  $ND$  se réfléchiront.

Si l'on mène  $AP$  parallèle à  $CD$ ; il est clair  $^*$  que la  $^*Art. 132.$   
portion  $FH = AH - MF + \frac{1}{2} PM$ : de sorte que menant  
 $NK$  parallèle à  $CD$ , la caustique entière  $^*HFN = 2CA$   
 $+ \frac{1}{2} AK = \frac{2-y}{2} CA$ .

## EXEMPLE II.

140. SOIT la courbe  $AMD$  une logarithmique spirale FIG. 117.  
qui ait pour centre le point  $A$ , duquel partent tous les  
rayons incidens  $AM$ .

Il est clair  $^*$  que le point  $E$  tombe sur le point  $A$ , c'est  $^*Art. 91.$   
à dire que  $a = y$ . Si donc l'on met à la place de  $a$  sa va-  
leur dans  $\frac{bby}{by - ay + aab}$  valeur  $^*$  de  $MF$  lorsque la courbe  $^*Art. 133.$

est concave du côté du point lumineux; on aura  $MF = b$ ;  
d'où l'on voit que le point  $F$  tombe sur le point  $G$ .

Si l'on mène la droite  $AG$ , & la tangente  $MT$ ; l'angle  
 $^*AGO$  complement à deux droits de l'angle  $^*AGM$ , l'angle  
à l'angle  $^*AMT$ . Car le cercle qui a pour diamètre la ligne  
 $CM$ , passant par les points  $A$  &  $G$ , les angles  $^*AGO$ ,  $^*AMT$   
ont chacun pour mesure la moitié du même arc  $AM$ . Il  
est donc évident que la caustique  $^*AGN$  est la même lo-

arithmétique spirale que la donnée  $AMD$ , & qu'elle n'en diffère que par sa position.

## PROPOSITION II.

## Problème.

FIG. 118. 141. LA caustique  $HF$  par réfraction étant donnée avec son point lumineux  $B$ , & la raison de  $m$  à  $n$ ; trouver une infinité de courbes telles que  $AM$ , dont elle soit caustique par réfraction.

Ayant pris à discrétion sur une tangente quelconque  $HA$ , le point  $A$  pour un des points de la courbe  $AM$ , on décrira du centre  $B$  & de l'intervalle  $BA$  l'arc de cercle  $AP$ , & d'un autre intervalle quelconque  $BM$  un autre arc de cercle; & ayant pris  $AE = \frac{n}{m} PM$ , on décrira en envelopant la caustique  $HF$  une ligne courbe  $EM$ , qui coupera l'arc de cercle décrit de l'intervalle  $BM$ , en un point

\* Art. 132.  $M$  qui sera à la courbe cherchée. Car  $*PM \cdot AE$  ou  $ML$  ::  $m \cdot n$ .

## AUTRE SOLUTION.

142. ON cherchera sur une tangente quelconque  $FM$ , autre que  $HA$ , le point  $M$  tel que  $HF + FM + \frac{n}{m} BM = HA + \frac{n}{m} BA$ . C'est pourquoi si l'on prend  $FK = \frac{n}{m} BA + AH - FH$ , & qu'on trouve sur  $FK$  un point  $M$  tel que

\* Art. 132.  $MK = \frac{n}{m} BM$ , il sera \* celui qu'on cherche. Or cela se

FIG. 119. peut faire en décrivant une ligne courbe  $GM$  telle que menant d'un de ses points quelconque  $M$  aux points donnés  $B, K$ , les droites  $MB, MK$ , elles aient toujours entr'elles un même rapport que  $m$  à  $n$ . Il n'est donc question que de trouver la nature de ce lieu.

Soit pour cet effet menée  $MR$  perpendiculaire sur  $BK$ , & nommée la donnée  $BK$ ,  $a$ ; & les indéterminées  $BR$ ,  $x$ ;  $RM$ ,  $y$ . Les triangles rectangles  $BRM, KRM$  donneront  $BM = \sqrt{xx + yy}$ , &  $KM = \sqrt{aa - 2ax + xx + yy}$ :  
de

de sorte que pour remplir la condition du Problème, l'on aura  $\sqrt{xx - yy} \cdot \sqrt{aa - 2ax + xx + yy} :: m.n$ . D'où l'on tire  $yy = \frac{1ammx - aamm}{mm - nn} - xx$ , qui est un lieu au cercle que l'on construira ainsi.

Soit prise  $BG = \frac{am}{m+n}$ , &  $BQ = \frac{am}{m-n}$ , & soit décrit du diametre  $GQ$  la demi-circonférence  $GMQ$ : je dis qu'elle sera le lieu requis. Car ayant  $QR$  ou  $BQ - BR = \frac{am}{m-n} - x$ , &  $RG$  ou  $BR - BG = x - \frac{am}{m+n}$ ; la propriété du cercle, qui donne  $QR \times RG = \overline{RM}^2$ , donnera en termes analytiques  $yy = \frac{1ammx - aamm}{mm - nn} - xx$ .

Si les rayons incidens  $BA, BM$  sont paralleles à une droite donnée de position, la premiere solution aura toujours lieu; mais celle ci deviendra inutile, & on pourra lui substituer la suivante. FIG. 120.

Soit prise  $FL = AH - HF$ ; & ayant mené  $LG$  parallele à  $AB$  & perpendiculaire sur  $AP$ , on prendra  $LO = \frac{n}{m} LG$ , & on tirera  $LP$  parallele à  $GO$ , &  $PM$  parallele à  $GL$ . Il est clair\* que le point  $M$  fera celui qu'on cherche; car puisque  $LO = \frac{n}{m} LG$ ,  $ML = \frac{n}{m} PM$ . \* Art. 132.

Si la caustique  $FH$  par réfraction, se réunit en un point; les courbes  $AM$  deviennent les Ouales de *Descartes*, qui ont fait tant de bruit parmi les Géometres.

## COROLLAIRE I.

143. ON démontre de même que dans les caustiques par réflexion\*, que les courbes  $AM$  sont de nature différente\* \* Art. 130. entr'elles, & qu'elles ne sont géométriques que lorsque la caustique  $FH$  par réfraction est géométrique & rectifiable.

## COROLLAIRE II.

144. UNE ligne courbe  $AM$  étant donnée avec le point lumineux  $B$ , & la raison de  $m$  à  $n$ ; trouver une infini- FIG. 121.  
R

nité de lignes telles que  $DN$ , en sorte que les rayons rompus  $MN$  se rompent de nouveau à la rencontre de ces lignes  $DN$  pour se réunir en un point donné  $C$ .

Si l'on imagine que la ligne courbe  $HF$  soit la caustique par réfraction de la courbe donnée  $AM$ , formée par le point lumineux  $B$ ; il est clair que cette même ligne  $HF$  doit être aussi la caustique par réfraction de la courbe cherchée  $DN$ , ayant pour point lumineux le point donné  $C$ .

\* Art. 132. C'est pourquoi  $\frac{n}{m}BA + AH = \frac{n}{m}BM + MF + FH$ , &  $NF + FH - \frac{n}{m}NC = HD - \frac{n}{m}DC$ ; & partant  $\frac{n}{m}BA + AH = \frac{n}{m}BM + MN + HD - \frac{n}{m}DC + \frac{n}{m}NC$ ; & transposant à l'ordinaire,  $\frac{n}{m}BA - \frac{n}{m}BM + \frac{n}{m}DC + AD = MN + \frac{n}{m}NC$ . Ce qui donne cette construction.

Ayant pris à discrétion sur un rayon rompu quelconque  $AH$  le point  $D$  pour un de ceux de la courbe cherchée  $DN$ , on prendra sur un autre rayon rompu quelconque  $MF$  la partie  $MK = \frac{n}{m}BA - \frac{n}{m}BM + \frac{n}{m}DC + AD$ ;

\* Art. 142. & ayant trouvé, comme ci-dessus \*, le point  $N$  tel que

\* Art. 132.  $NK = \frac{n}{m}NC$ , il est clair \* qu'il sera à la courbe  $DN$ .

### COROLLAIRE GÉNÉRAL.

*Pour les trois Sections précédentes.*

\* Art. 80. 145. IL est manifeste \* qu'une ligne courbe n'a qu'une seule développée, qu'une seule caustique par réflexion, & qu'une seule par réfraction, le point lumineux & le rapport des sinus étant donnés, lesquelles lignes sont toujours géométriques & rectifiables lorsque cette courbe est géométrique. Au lieu qu'une même ligne courbe peut être la développée, & l'une & l'autre caustique dans le même rapport des sinus, & dans la même position du point lumineux, commune à une infinité de lignes très différentes entr'elles, & qui ne sont géométriques que lorsque cette courbe est géométrique & rectifiable.



## SECTION VIII.

*Usage du calcul des différences pour trouver les points des lignes courbes qui touchent une infinité de lignes données de position, droites ou courbes.*

## PROPOSITION I.

## Problème.

146. SOIT donnée une ligne quelconque  $AMB$ , qui ait pour axe la droite  $AP$ ; soient de plus entendues une infinité de paraboles  $AMC$ ,  $AmC$ , qui passent toutes par le point  $A$ , & qui aient pour axes les appliquées  $PM$ ,  $pm$ . Il faut trouver la ligne courbe qui touche toutes ces Paraboles. FIG. 122.

Il est clair que le point touchant de chaque parabole  $AMC$  est le point d'intersection  $C$  où la parabole  $AmC$ , qui en est infiniment proche, la coupe. Cela posé, & ayant mené  $CK$  parallèle à  $MP$ , soient nommées les données  $AP$ ,  $x$ ;  $PM$ ,  $y$ ; & les inconnues  $AK$ ,  $u$ ;  $KC$ ,  $z$ . On aura par la propriété de la parabole,  $\overline{AP}^2 (xx) \cdot \overline{PK}^2 (uu - 2ux + xx) :: MP(y) \cdot MP - CK(y - z)$ . Ce qui donne  $zx \cdot x = 2uxy - u^2y$ , qui est l'équation commune à toutes les paraboles telles que  $AMC$ . Or je remarque que les inconnues  $AK(u)$  &  $KC(z)$  demeurent les mêmes, pendant que les données  $AP(x)$  &  $PM(y)$  varient en devenant  $Ap$  &  $pm$ ; & qu'il n'arrive que  $KC(z)$  demeure la même, que lorsque le point  $C$  est celui d'intersection: car il est visible que par tout ailleurs la droite  $KC$  coupera les deux paraboles  $AMC$ ,  $AmC$  en deux différents points, & qu'elle aura par conséquent deux valeurs qui répondront à la même de  $AK$ . C'est pourquoi si l'on traite  $u$  &  $z$  comme constantes, en prenant la différence de l'équation que l'on vient de trouver, on déterminera le point  $C$  à être celui d'intersection. On aura donc  $2zxdx = 2uxdy + 2uydx - u^2dy$ : d'où l'on tire l'inconnue

R ij

$AK(u) = \frac{1xxdy - yxdx}{xdy - ydx}$  en mettant pour  $z$  la valeur  $\frac{1uxy - uuy}{xx}$ ; & la nature de la courbe  $AMB$  étant donnée,

on trouvera une valeur de  $dy$  en  $dx$ , laquelle étant substituée dans la valeur de  $AK$ , cette inconnue sera enfin exprimée en termes entièrement connus & délivrés des différences. Ce qui étoit proposé.

Si au lieu des paraboles  $AMC$ , on proposoit d'autres lignes droites ou courbes dont la position fût déterminée, on résoudroit toujours le Problème à peu près de la même manière: & c'est ce que l'on verra dans les Propositions suivantes.

#### EXEMPLE.

147. QUE l'équation  $xx = 4ay - 4yy$  exprime la nature de la courbe  $AMB$ : elle sera une demi-ellipse qui aura pour petit axe, la droite  $AB = a$  perpendiculaire sur  $AP$ , & dont le grand axe sera double du petit.

On trouve  $xdx = 2ady - 4ydy$ ; & partant  $AK(\frac{1xxdy - yxdx}{xdy - ydx}) = \frac{ax}{y} = u$ . D'où il suit que si l'on prend  $AK$  quatrième proportionnelle à  $MP$ ,  $PA$ ,  $AB$ , & qu'on mène  $KC$  perpendiculaire sur  $AK$ ; elle ira couper la parabole  $AMC$  au point cherché  $C$ .

Pour avoir la nature de la courbe qui touche toutes les paraboles, ou qui passe par tous les points  $C$  ainsi trouvés, on cherchera l'équation qui exprime la relation de  $AK(u)$  à  $KC(z)$  en cette sorte. Mettant à la place de  $u$  la valeur  $\frac{ax}{y}$  dans  $zxx = 2uxy - uuy$ , l'on en tire  $y = \frac{ax}{1z - z}$ ; & partant  $x$  ou  $\frac{uy}{a} = \frac{ax}{1z - z}$ . Si donc l'on met ces valeurs à la place de  $x$  &  $y$  dans  $xx = 4ay - 4yy$ , on formera l'équation  $uu = 4aa - 4az$  où  $x$  &  $y$  ne se rencontrent plus, & qui exprime la relation de  $AK$  à  $KC$ . D'où l'on voit que la courbe cherchée est une parabole qui a pour axe la ligne  $BA$ , pour sommet le point  $B$ , pour foyer le point  $A$ , & dont le paramètre par conséquent est quadruple de  $AB$ .

On vient de trouver  $y = \frac{ax}{1x - z}$ , d'où l'on tire  $KC(z) = \frac{1ay - ax}{y}$ . Or comme cette valeur est positive lorsque

$zy$  surpasse  $a$ , négative lorsqu'il est moindre, & nulle lorsqu'il lui est égal: il s'ensuit que le point touchant  $C$  tombe au dessus de  $AP$  dans le premier cas, comme l'on avoit supposé en faisant le calcul; au dessous dans le second, & enfin sur  $AP$  dans le troisième.

Si l'on mène la droite  $AC$  qui coupe  $MP$  en  $G$ ; je dis que  $MG = BQ$ , & que le point  $G$  est le foyer de la parabole  $AMC$ . Car, 1°.  $AK(\frac{ax}{y}) \cdot KC(\frac{1ay - ax}{y}) :: AP(x) \cdot$

$PG = zy - a$ . & partant  $MG = a - y = BQ$ . 2°. Le parametre de la parabole  $AMC$ , est  $= 4a - 4y$  en mettant pour  $xx$  sa valeur  $4xy - 4yy$ ; & partant  $MG(a - y)$  est la quatrième partie du parametre: d'où l'on voit que le point  $G$  est le foyer de la parabole; & qu'ainsi l'angle  $BAC$  doit être divisé en deux également par la tangente en  $A$ .

Il suit de ce que le parametre de la parabole  $AMC$  est quadruple de  $BQ$ , que le sommet  $M$  tombant en  $A$ , le parametre sera quadruple de  $AB$ , & qu'ainsi la parabole, qui a pour sommet le point  $A$ , est asymptotique de celle qui passe par tous les points  $C$ .

Comme la parabole  $BC$  touche toutes les paraboles telles que  $AMC$ ; il est clair que toutes ces paraboles couperont la ligne déterminée  $AC$  en des points qui seront plus proches du point  $A$  que le point  $C$ . Or l'on démontre dans la Balistique (en supposant que  $AK$  soit horizontale) que toutes les paraboles telles que  $AMC$  marquent le chemin que décrivent en l'air des Bombes qui seroient jettées par un Mortier placé en  $A$  dans toutes les élévations possibles avec la même force. D'où il suit que si l'on mène une droite qui divise par le milieu l'angle  $BAC$ ; elle marquera la position que doit avoir le Mortier, afin que la Bombe qu'il jette, tombe sur le plan  $AC$  donné de position, en un point  $C$  plus éloigné du Mortier, qu'en toute autre élévation.

## PROPOSITION II.

## Problème.

FIG. 123. 148. *SOIT* donnée une courbe quelconque  $AM$ , qui ait pour axe la droite  $AP$ ; trouver une autre courbe  $BC$  telle qu'ayant mené à discrétion l'appliquée  $PM$ , & la perpendiculaire  $PC$  à cette courbe, ces deux lignes  $PM, PC$  soient toujours égales entr'elles.

Si l'on conçoit une infinité de cercles décrits des centres  $P, p$ , & des rayons  $PC, pC$  égaux à  $PM, pm$ ; il est clair que la courbe cherchée  $BC$  doit toucher tous ces cercles, & que le point touchant  $C$  de chaque cercle est le point d'intersection où le cercle qui en est infiniment proche, le coupe. Cela posé, soit mené  $CK$  perpendiculaire sur  $AP$ ; soient nommées les données & variables  $AP, x$ ;  $PM$  ou  $PC, y$ , les inconnues & constantes  $AK, u$ ;  $KC, z$ ; & l'on aura par la propriété du cercle  $\overline{PC}^2 = \overline{PK}^2 + \overline{KC}^2$ , c'est à dire en termes analytiques  $yy = xx - 2ux + uu + zz$ , qui est l'équation commune à tous ces cercles, dont la différence est  $2ydy = 2xdx - 2udx$ : d'où l'on tire  $PK (x - u = \frac{ydy}{dx}$ ; ce qui donne cette construction générale.

Soit menée  $MQ$  perpendiculaire à la courbe  $AM$ ; & ayant pris  $PK = PQ$ , soit tirée  $KC$  parallèle à  $PM$ : je dis qu'elle rencontrera le cercle décrit du centre  $P$  & du rayon  $PC = PM$  au point  $C$ , où il touche la courbe cherchée  $BC$ . Ce qui est évident; puisque  $PQ = \frac{ydy}{dx}$ .

On peut encore trouver la valeur de  $PK$  de cette autre manière.

Ayant mené  $PO$  perpendiculaire sur  $Cp$ , les triangles rectangles  $POp, PKC$  seront semblables; & partant  $Pp (dx). Op (dy) :: PC (y). PK = \frac{ydy}{dx}$ .

Lorsque  $PQ = PM$ , il est clair que le cercle décrit du rayon  $PC$ , touchera  $KC$  au point  $K$ : de sorte que le point

touchant  $C$  se confondra avec le point  $K$ , & tombera par conséquent sur l'axe.

Mais lorsque  $PQ$  surpassera  $PM$ , le cercle décrit du rayon  $PC$  ne pourra toucher la courbe  $BC$ ; puisqu'il ne pourra rencontrer la droite  $KC$  en aucun point.

## E X E M P L E.

149. SOIT la courbe donnée  $AM$ , une parabole qui FIG. 113.  
ait pour équation  $ax = yy$ . On aura  $PQ$  ou  $PK(x - u)$   
 $= \frac{1}{2}a$ ; & par conséquent  $x = \frac{1}{2}a + u$ , &  $yy = \frac{1}{2}aa + 2u$   
à cause du triangle rectangle  $PKC$ . Or si l'on met ces va-  
leurs dans  $ax = yy$ , on formera l'équation  $\frac{1}{2}aa + au = \frac{1}{4}aa$   
 $+ 2u$  ou  $\frac{1}{4}aa + au = 2u$ , qui exprime la nature de la  
courbe  $BC$ . D'où il est clair que cette courbe est la mê-  
me parabole que  $AM$ ; puisqu'elles ont l'une & l'autre le  
même paramètre  $a$ , & que son sommet  $B$  est éloigné du  
sommet  $A$  de la distance  $BA = \frac{1}{4}a$ .

## P R O P O S I T I O N III.

## Problème.

150. SOIT donnée une ligne courbe quelconque  $AM$ , qui FIG. 114.  
ait pour diamètre la droite  $AP$ , & dont les appliquées  $PM$ ,  
 $pm$  soient parallèles à la droite  $AQ$  donnée de position; &  
ayant mené  $MQ$ ,  $mq$  parallèles à  $AP$ , soient tirées les  
droites  $PQC$ ,  $pqC$ . On demande la courbe  $AC$  qui a pour  
tangentes toutes ces droites: on, ce qui est la même chose,  
il s'agit de déterminer sur chaque droite  $PQC$  le point son-  
chant  $C$ .

Ayant imaginé une autre tangente  $pqC$  infiniment pro-  
che de  $PQC$ , & mené  $CK$  parallèle à  $AQ$ , on nommera  
les données & variables  $AP$ ,  $x$ ;  $PM$  ou  $AQ$ ,  $y$ ; les in-  
connues & constantes  $AK$ ,  $u$ ;  $KC$ ,  $z$ ; & les triangles  
semblables  $PAQ$ ,  $PKC$  donneront  $AP(x) \cdot AQ(y)$   
 $:: PK(x + u) \cdot KC(z) = y + \frac{uy}{x}$ , qui est l'équation

commune à toutes les droites telles que  $KC$ . Sa différence est  $dy + \frac{uxdy - ydx}{xx} = 0$ , d'où l'on tire  $AK(u) = \frac{xxdy}{ydx - xdy}$ .

Ce qui donne cette construction générale.

Soit menée la tangente  $MT$ , & soit prise  $AK$  troisième proportionnelle à  $AT$ ,  $AP$  : je dis que si l'on mène  $KC$  parallèle à  $AQ$ , elle ira couper la droite  $PQC$  au point cherché  $C$ .

$$\text{Car } AT\left(\frac{ydx - xdy}{dy}\right) . AP(x) :: AP(x) . AK = \frac{xxdy}{ydx - xdy}.$$

### EXEMPLE I.

FIG. 124. 151. SOIT la courbe donnée  $AM$ , une parabole qui ait pour équation  $ax = yy$ . On aura  $AT = AP$  ; d'où il suit que  $AK(u) = x$ , c'est à dire que le point  $K$  tombe sur le point  $T$ . Si l'on veut à présent avoir une équation qui exprime la relation de  $AK(u)$  à  $KC(z)$  ; on trouvera  $KC(z) = zy$ , puisque l'on vient de trouver que  $PK$  est double de  $AP$ . Mettant donc à la place de  $x$  &  $y$  leurs valeurs  $u$  &  $\frac{1}{2}z$  dans  $ax = yy$ , on aura  $4au = zz$  ; d'où l'on voit que la courbe  $AC$  est une parabole qui a pour sommet le point  $A$ , & pour paramètre une ligne quadruple du paramètre de la parabole  $AM$ .

### EXEMPLE II.

FIG. 125. 152. SOIT la courbe donnée  $AM$ , un quart de cercle  $BMD$  qui ait pour centre le point  $A$ , & pour rayon la ligne  $AB$  ou  $AD$ , que j'appelle  $a$ . Il est clair que  $PQ$  est toujours égale au rayon  $AM$  ou  $AB$ , c'est à dire qu'elle est par-tout la même : de forte que l'on peut concevoir que ses extrémités  $P, Q$  glissent le long des côtés  $BA, AD$  de l'angle droit  $BAD$ . On aura  $AK(u) = \frac{x^2}{aa}$ , puisque  $AT = \frac{a^2}{x}$  ; & les parallèles  $KC, AQ$  donneront  $AP(x) . PQ(a) :: AK\left(\frac{x^2}{aa}\right) . QC = \frac{xx}{a}$ . D'où l'on voit que pour avoir le point touchant  $C$ , il n'y a qu'à prendre  $QC$  troisième propor-

DES INFINIMENT PETITS. I. Partie. 137  
proportionnelle à  $PQ$  &  $AP$ . Si l'on cherche l'équation  
qui exprime la nature de la courbe  $BCD$ , on trouvera  
celle-ci,  $u^4 - 3au^3 + 3a^2uu - a^3 = 0$ .

$$+ 3zz + 21aaz + 3a^2zz \\ + 3z^3 - 3aaz^2 + 3a^2z^2 - 3a^3z + 3a^4 = 0$$

### COROLLAIRE I.

153. Si l'on veut chercher le rapport de la portion  $DC$   
de la courbe  $BCD$  à sa tangente  $CP$ , l'on imaginera une  
autre tangente  $cp$  infiniment proche de  $CP$ ; & ayant dé-  
crit du centre  $C$  le petit arc  $PO$ , l'on aura  $cp - CP$  ou  $Op$   
 $- Cc = -\frac{xxdx}{a}$ , pour la différence de  $CP = \frac{aa - xx}{a}$ .  
d'où l'on tire  $Cc = Op + \frac{xxdx}{a}$ . Or à cause des triangles ré-  
ctangles semblables  $QPA, PpO$ , l'on aura  $PQ (a). AP (x)$   
 $:: Pp(dx). Op = \frac{xxdx}{a}$ . & partant  $Cc = \frac{xxdx}{a} = DC - Dc$ . Il  
est donc manifeste qu'en quelque endroit que l'on prenne  
le point  $C$ , l'on aura toujours  $DC - Dc (\frac{xxdx}{a}). CP - cp$   
 $(\frac{xxdx}{a}) :: 3. 2$ . D'où il suit que la somme de toutes les  
différences  $DC - Dc$  qui répondent à la droite  $PD$ , c'est  
à dire \* la portion  $DC$  de la courbe  $BCD$ , est à la somme \* Art. 96.  
de toutes les différences  $CP - cp$  qui répondent à la même  
droite  $PD$ , c'est à dire \* à la tangente  $CP :: 3. 2$ . Et de mê- \* Art. 96.  
me que la courbe entière  $BCD$  est à sa tangente  $BA :: 3. 2$ .

### COROLLAIRE II.

154. Si l'on développe la courbe  $BCD$  en commençant  
par le point  $D$ , on formera la ligne courbe  $DNF$  telle que  
 $CN. CP :: 3. 2$ . puisque  $CN$  est toujours égale à la portion  
 $DC$  de la courbe  $BCD$ . D'où il suit que les sécateurs sem-  
blables  $CNn, CPO$  sont entr'eux :: 9. 4. & partant que l'es-  
pace  $DCN$  renfermé par les courbes  $DC, DN$ , & par la  
droite  $CN$  qui est tangente en  $C$ , & perpendiculaire en

$N$ , est à l'espace  $DCP$  renfermé par la courbe  $DC$ , & par les deux tangentes  $DP$ ,  $CP$ , comme 9. à 4.

## COROLLAIRE III.

155. **L**e centre de pesanteur du secteur  $CNn$  doit être situé sur l'arc  $PO$ ; puisque  $CP = \frac{1}{2}CN$ . Et comme cet arc est infiniment petit, il s'ensuit que ce centre doit être sur la droite  $AD$ ; & partant que le centre de pesanteur des espaces  $DCN$ ,  $BDF$ , qui sont composés de tous ces secteurs, doit être sur cette droite  $AD$ : de sorte que si l'on décrivait de l'autre côté de  $BF$  une figure toute pareille à  $BDF$ , le centre de pesanteur de la figure entière seroit au point  $A$ .





## COROLLAIRE IV.

156. **A** cause des triangles rectangles semblables  $PQA$ ,  $pPO$ , l'on aura  $PQ(a)$ .  $AQ$  ou  $PM(\sqrt{aa - xx}) :: Pp(dx)$ .  $PO = \frac{dx\sqrt{aa - xx}}{a}$ . Et à cause des secteurs semblables  $CPO$ ,  $CNn$ , l'on aura aussi  $CP, CN$ , ou 2. 3 ::  $PO(\frac{dx\sqrt{aa - xx}}{a}) . Nn = \frac{3dx\sqrt{aa - xx}}{2a}$ . Or le rectangle  $MP \times Pp$ , c'est à dire \* le petit espace circulaire  $MPpm = dx\sqrt{aa - xx}$ . On aura donc  $AB \times Nn = \frac{1}{2}MPpm$ : d'où il suit que la portion  $ND$  de la courbe  $DNF$  étant multipliée par le rayon  $AB$ , est sesquialtère du segment circulaire  $DMP$ , & que la courbe entière  $DNF$  est égale aux trois quarts de  $BMD$  quatrième partie de la circonférence du cercle.

## PROPOSITION . IV.

## Problème.

FIG. 126. 157. **S**oit donnée, une courbe quelconque  $AM$ , qui ait pour axe la droite  $AP$ ; & soient entendues une infinité de perpendiculaires  $MC$ ,  $mC$  à cette courbe. On demande la courbe





qui a pour tangentes toutes ces perpendiculaires : ou ce qui est la même chose, il faut trouver sur chaque perpendiculaire  $MC$  le point touchant  $C$ .

Ayant imaginé une autre perpendiculaire  $mC$  infiniment proche de  $MC$ , avec une appliquee  $MP$ , l'on mène par le point d'intersection  $C$  les droites  $CK$  perpendiculaire &  $CE$  parallèle à l'axe : ayant ensuite nommé les données & variables  $AP, x$  ;  $PM, y$  ; les inconnues & constantes  $AK, u$  ;  $KC, z$  ; l'on aura  $PQ = \frac{y dy}{dx}$ ,  $PK$  ou  $CE = u - x$ ,  $ME = y + z$  ; & les triangles rectangles semblables  $MPQ, MEC$  donneront  $MP(y) \cdot PQ(\frac{y dy}{dx}) :: ME(y+z)$ .

$EC(u - x) = \frac{y dy + z dy}{dx}$ , qui est une équation commune à toutes les perpendiculaires telles que  $MC$ , & dont la différence ( en supposant  $dx$  constante ) donne  $-dx = \frac{y dy + dy^2 + z dy}{dx}$  : d'où l'on tire  $ME(z+y) = \frac{dx^2 + dy^2}{-dy}$ .

Or la nature de la courbe  $AM$  étant donnée, l'on aura des valeurs de  $dy$  &  $ddy$  en  $dx^2$ , lesquelles étant substituées dans  $\frac{dx^2 + dy^2}{-dy}$ , donneront pour  $ME$  une valeur entièrement connue & délivrée des différences. Ce qui étoit proposé.

Il est évident que la courbe qui passe par tous les points  $C$ , est la développée de la courbe  $AM$  ; & comme l'on en a traité exprès dans la Section cinquième, il seroit inutile d'en donner ici des exemples nouveaux.

## PROPOSITION V.

### Problème.

158. **DEUX** lignes quelconques  $AM, BN$  étant données avec une ligne droite  $MN$  qui demeure toujours la même, on suppose que les extrémités  $M, N$  de cette ligne glissent continuellement le long des deux autres, & l'on demande la courbe qui touche toujours dans ce mouvement.

Ayant mené les tangentes  $MT, NT$ , & imaginé une

tre droite  $mn$  infiniment proche de  $MN$ , & qui la coupe par conséquent au point  $C$  où elle touche la courbe dont il s'agit de déterminer les points. Il est clair que la droite  $MN$ , pour parvenir en  $mn$ , a parcouru par ses extrémités les petites portions  $Mm$ ,  $Nn$  des lignes  $AM$ ,  $BN$ , lesquelles sont communes à cause de leur infinie petitesse, aux tangentes  $TM$ ,  $TN$ : de sorte que l'on peut concevoir que la ligne  $MN$  pour parvenir dans la situation infiniment proche  $mn$ , ait glissé le long des droites  $TM$ ,  $TN$  données de position.

Cela bien entendu, soient menées sur  $NT$  les perpendiculaires  $MP$ ,  $CK$ ; soient nommées les données & variables  $TP$ ,  $x$ ;  $PM$ ,  $y$ ; les inconnues & constantes  $TK$ ,  $u$ ;  $KC$ ,  $z$ ; & la donnée  $MN$  qui demeure par tout la même,  $a$ . Le triangle rectangle  $MPN$  donnera  $PN = \sqrt{aa - yy}$ ; & à cause des triangles semblables  $NPM$ ,  $NKC$ , l'on aura  $NP (\sqrt{aa - yy}) \cdot PM (y) :: NK (u - x - \sqrt{aa - yy}) \cdot KC (z) = \frac{ny - xy}{\sqrt{aa - yy}} - y$ . dont la différence donne  $aady - aaxy - aaydx + y'dx = aady - ydy\sqrt{aa - yy}$ : d'où en faisant  $\sqrt{aa - yy} = m$  pour abrégér, l'on tire  $PK (u - x) = \frac{m'dy + mmydx}{aady} = \frac{m' + mmx}{aa}$  en mettant pour  $ydx$  sa valeur  $xdy$ , à cause des triangles semblables  $mRM$ ,  $MPT$ ; & partant  $MC = \frac{mm + mx}{a}$ : ce qui donne cette construction.

Soit menée  $TE$  perpendiculaire sur  $MN$ , & soit prise  $MC = NE$ : je dis que le point  $C$  sera celui qu'on cherche. Car à cause des triangles rectangles semblables  $MNP$ ,  $TNE$ , l'on aura  $MN (a) \cdot NP (m) :: NT (m + x) \cdot NE$  ou  $MC = \frac{mm + mx}{a}$ .

Autre manière. Ayant mené  $TE$  perpendiculaire sur  $MN$ , & décrit du centre  $C$  les petits arcs  $MS$ ,  $NO$ , on nommera les données  $NE$ ,  $r$ ;  $ET$ ,  $s$ ;  $MN$ ,  $a$ ; & l'inconnue  $CM$ ,  $t$ . On aura  $Sm$  ou  $On = dr$ ; & les triangles rectangles sem-

blables  $MET$  &  $mSM$ ,  $NET$  &  $nON$ ,  $CMS$  &  $CNO$  donneront  $ME(r-a)$ .  $ET(s) :: mS(dr) \cdot SM = \frac{sd}{r-a}$ . Et  $NE(r)$ .  $ET(s) :: nO(dt)$ .  $ON = \frac{sd}{r}$ . Et  $MS - NO \left( \frac{a \cdot sd}{r-r-a} \right)$ .  $MS \left( \frac{sd}{r-a} \right) :: MN(a)$ .  $MC(t) = r$ . Ce qui donne la même construction que ci-dessus.

Si l'on suppose que les lignes  $AM$ ,  $BN$  soient des droites qui fassent entr'elles un angle droit, il est visible que la courbe cherchée est la même que celle de l'article 151.

## PROPOSITION VI.

## Problème.

159. SOIENT données trois lignes quelconques  $L, M, N$ ; FIG. 128. & soient entendues de chacun des points  $L, l$  de la ligne  $L$  deux tangentes  $LM$  &  $LN$ ,  $lm$  &  $ln$ , aux deux courbes  $M$  &  $N$ , une à chacune. On demande la quatrième courbe  $C$ , qui ait pour tangentes toutes les droites  $MN, mn$  qui joignent les points touchans des courbes  $M, N$ .

Ayant tiré la tangente  $LE$ , & mené par un de ses points quelconque  $E$  les perpendiculaires  $EF, EG$  sur les deux autres tangentes  $ML, NL$ , on concevra que le point  $l$  soit infiniment près du point  $L$ ; on tirera les petites droites  $LH, LK$  perpendiculaires sur  $ml, nl$ ; comme aussi les perpendiculaires  $MP, mP, NQ, nQ$  sur les tangentes  $ML, ml, NL, nl$ , lesquelles perpendiculaires s'entrecoupent aux points  $P$  &  $Q$ . Tout cela formera les triangles rectangles semblables  $EFL$  &  $LHl$ ,  $EGL$  &  $LKl$ ; comme aussi les triangles  $LMH$  &  $MPm$ ,  $LnK$  &  $NQn$  rectangles en  $H$  &  $m, K$  &  $N$ , qui seront semblables entr'eux, puisque les angles  $LMH, MPm$  étant joints l'un ou l'autre au même angle  $PMm$ , font un droit. On prouvera de même, que les angles  $LnK, NQn$  sont égaux entr'eux.

Cela posé, on nommera le petit côté  $Mm$  du polygone qui compose la courbe  $M$ ,  $du$ ; & les données  $EF, m$ ;  $EG, n$ ;  $MN$  ou  $mn$ ,  $a$ ;  $ML$  ou  $ml$ ,  $b$ ;  $NL$  ou  $nl$ ,  $c$ ;  $MP$  ou

$MP, f; NQ$  ou  $nQ, g$  (je prens ici les droites  $MP, NQ$  pour données, parceque la nature des courbes  $M, N$  étant donnée par la supposition, on les pourra toujours trouver<sup>\*)</sup>; & l'on aura, 1<sup>o</sup>,  $MP(f). ML(b) :: Mm(du) LH = \frac{bdu}{f}$ . 2<sup>o</sup>.  $EF(m). EG(n) :: LH(\frac{bdu}{f}). LK = \frac{bndu}{mf}$ . 3<sup>o</sup>.  $LN$  ou  $Ln(c). nQ(g) :: LK(\frac{bndu}{mf}). nN = \frac{bgndu}{cfm}$ . 4<sup>o</sup>. (menant  $MR$  parallele à  $NL$  ou  $nl$ )  $ml(b). ln(c) :: mM(du). MR = \frac{cdn}{b}$ . 5<sup>o</sup>.  $MR + Nn(\frac{cdn}{b} + \frac{bgndu}{cfm})$ .  $MR(\frac{cdn}{b}) :: MN(a). MC = \frac{acfm}{ccfm + bbgm}$ . Ce qu'il falloit trouver.

Si la tangente  $EL$  tomboit sur la tangente  $ML$ , il est clair que  $EF(m)$  deviendrait nulle ou zero; & partant que le point cherché  $C$  tomberoit sur le point  $M$ . De même si la tangente  $EL$  se confondroit avec la tangente  $LN$ ; alors  $EG(n)$  deviendrait nulle, & l'on auroit par conséquent  $MC = 1$ ; d'où l'on voit que le point cherché  $C$  tomberoit aussi sur le point  $N$ . Et enfin si la tangente  $EL$  tomboit dans l'angle  $GLI$ ; en ce cas  $EG(n)$  deviendrait négative; ce qui donneroit alors  $MC = \frac{acfm}{ccfm - bbgm}$ ; & le point cherché  $C$  ne tomberoit plus entre les points  $M$  &  $N$ , mais de part ou d'autre.

## EXEMPLE I.

FIG. 129. 160. SUPPOSONS que les courbes  $M$  &  $N$  ne fassent qu'un cercle. Il est clair en ce cas que  $b=c$ , &  $f=g$ ; ce qui donne  $MC = \frac{am}{m+n}$ , d'où l'on voit qu'il ne faut alors que couper la droite  $MN$  en raison donnée de  $m$  à  $n$  pour avoir le point cherché  $C$ ; c'est à dire en sorte que  $MC.NC :: m.n$ .

## EXEMPLE II.

161. SUPPOSONS que les courbes  $M$  &  $N$  soient une

Sécion conique quelconque. La construction générale se peut changer en cette autre qui est beaucoup plus simple, si l'on fait attention à une propriété des Sécions coniques, que l'on trouve démontrée dans les Livres qui en traitent: sçavoir que si l'on mène de chacun des points  $L$ ,  $l$  d'une ligne droite  $EL$  deux tangentes  $LM$  &  $LN$ ,  $lm$  &  $ln$  à une Sécion conique, toutes les droites  $MN$ ,  $mn$  qui joignent les points touchans, se couperont dans le même point  $C$ , par lequel passe le diamètre  $AC$ , dont les ordonnées sont parallèles à la droite  $EL$ . Car il suit de là, que pour avoir le point  $C$ , il ne faut que mener un diamètre qui ait ses ordonnées parallèles à la tangente  $EL$ .

Il est évident que dans le cercle, le diamètre doit être perpendiculaire sur la tangente  $EL$ ; c'est à dire qu'en menant de son centre  $A$  une perpendiculaire  $AB$  sur cette tangente, elle coupera la droite  $MN$  au point cherché  $C$ .

## REMARQUE.

162. ON peut par le moyen de ce Problème résoudre FIG. 128. celui ci qui dépend de la Méthode des Tangentes.

Les trois courbes  $C$ ,  $M$ ,  $N$ , étant données, on fera rouler une ligne droite  $MN$  autour de la courbe  $C$ , en sorte qu'elle la touche continuellement; on tirera par les points  $M$ ,  $N$ , où elle coupe les courbes  $M$  &  $N$ , les tangentes  $ML$ ,  $NL$  qui s'entrecoupent en un point  $L$ , lequel décrit dans ce mouvement une quatrième courbe  $LL$ . Il s'agit de tirer la tangente  $LE$  de cette courbe, la position des droites  $MN$ ,  $ML$ ,  $NL$  étant donnée avec le point touchant  $C$ .

Car il est visible que ce Problème n'est que l'inverse du précédent, & qu'ici  $MC$  est donnée: ce qu'on cherche, c'est la raison de  $EF$ ,  $EG$ , qui détermine la position de la tangente  $EL$ . C'est pourquoi si l'on nomme la donnée  $MC$ ,  $h$ ;

l'on aura  $\frac{accfm}{ccfm + bbgn} = h$ : d'où l'on tire  $m = \frac{bbghn}{accf - ccfn}$ ; & par conséquent la tangente  $LE$  doit être tellement située dans l'angle donné  $MLG$ , que si l'on mène d'un de

ses points quelconque  $E$  les perpendiculaires  $EF$ ,  $EG$  sur les côtés de cet angle, elles soient toujours entr'elles en raison donnée de  $bbgh$  à  $accf - ccfh$ . Or cela se fait en menant  $MD$  parallèle à  $NL$ , & égale à  $\frac{b'gh}{accf - ccfh}$ .

FIG. 129. Il est évident \* que si les deux courbes  $M$  &  $N$  ne font

\* Art. 161. qu'une Section conique, il ne faudra que tirer la tangente  $LE$  parallèle aux ordonnées du diamètre qui passe par le point  $C$ .



## SECTION IX.

*Solution de quelques Problèmes qui dépendent des Méthodes précédentes.*

## PROPOSITION I.

## Problème.

163. SOIT une ligne courbe AMD ( $AP = x$ ,  $PM = y$ , FIG. 20.  $AB = a$ ) telle que la valeur de l'appliquée  $y$  soit exprimée par une fraction, dont le numérateur & le dénominateur deviennent chacun zero lorsque  $x = a$ , c'est à dire lorsque le point  $P$  tombe sur le point donné  $B$ . On demande quelle doit être alors la valeur de l'appliquée  $BD$ .

Soient entendues deux lignes courbes  $ANB$ ,  $COB$ , qui aient pour axe commun la ligne  $AB$ , & qui soient telles que l'appliquée  $PN$  exprime le numérateur, & l'appliquée  $PO$  le dénominateur de la fraction générale qui convient à toutes les  $PM$ : de sorte que  $PM = \frac{AB \times PN}{PO}$ . Il est clair que ces deux courbes se rencontreront au point  $B$ ; puisque par la supposition  $PN$  &  $PO$  deviennent chacune zero lorsque le point  $P$  tombe en  $B$ . Cela posé, si l'on imagine une appliquée  $bd$  infiniment proche de  $BD$ , & qui rencontre les lignes courbes  $ANB$ ,  $COB$  aux points  $f$ ,  $g$ ; on aura  $bd = \frac{AB \times bf}{bg}$ , laquelle \* ne diffère pas de  $BD$ . \* Art. 2.

Il n'est donc question que de trouver le rapport de  $bg$  à  $bf$ . Or il est visible que la coupée  $AP$  devenant  $AB$ , les appliquées  $PN$ ,  $PO$  deviennent nulles, & que  $AP$  devenant  $Ab$ , elles deviennent  $bf$ ,  $bg$ . D'où il suit que ces appliquées, elles-mêmes  $bf$ ,  $bg$ , sont la différence des appliquées en  $B$  &  $b$  par rapport aux courbes  $ANB$ ,  $COB$ ; & partant que si l'on prend la différence du numérateur, & qu'on la divise par la différence du dénominateur, après

T

avoir fait  $x = a = Ab$  ou  $AB$ , l'on aura la valeur cherchée de l'appliquée  $bd$  ou  $BD$ . Ce qu'il falloit trouver.

## EXEMPLE I.

164. **SOIT**  $y = \frac{\sqrt{2a^3x - x^3} - a\sqrt[3]{ax}}{a - \sqrt[3]{ax}}$ . Il est clair que lorsque  $x = a$ , le numérateur & le dénominateur de la fraction deviennent égaux chacun à zéro. C'est pourquoi l'on prendra la différence  $\frac{a^3dx - 2x^2dx}{\sqrt{2a^3x - x^3}} - \frac{a^2dx}{3\sqrt[3]{ax}}$  du numérateur, & on la divisera par la différence  $-\frac{3adx}{4\sqrt[3]{ax}}$  du dénominateur, après avoir fait  $x = a$ , c'est à dire qu'on divisera  $-\frac{4}{3}adx$  par  $-\frac{1}{4}dx$ ; ce qui donne  $\frac{16}{3}a$  pour la valeur cherchée de  $BD$ .

## EXEMPLE II.

165. **SOIT**  $y = \frac{aa - ax}{a - \sqrt{ax}}$ . On trouve  $y = 2a$ , lorsque  $x = a$ .

On pourroit résoudre cet exemple sans avoir besoin du calcul des différences, en cette sorte.

Ayant ôté les incommensurables, on aura  $aaxx + 2aaxy - axyy - 2a^3x + a^4 + aayy - 2a^3y = 0$ , qui étant divisé par  $x - a$ , se réduit à  $aax - a^3 + 2aay - ayy = 0$ ; & substituant  $a$  pour  $x$ , il vient comme auparavant  $y = 2a$ .

## LEMMES.

FIG. 131. 166. **SOIT** une ligne courbe quelconque  $BCG$ , avec une ligne droite  $AE$  qui la touche au point  $B$ , & sur laquelle soient marqués à discrétion deux points fixes  $A, E$ . Si l'on fait rouler cette droite autour de la courbe, en sorte qu'elle la touche continuellement; il est clair que les points fixes  $A, E$  décriront dans ce mouvement deux courbes  $AMD, ENH$ . Si l'on mène à présent  $DL$  parallèle à  $AB$ , & qui fasse par conséquent avec  $DK$  (sur laquelle je suppose la droite  $AE$  lorsqu'elle

touche la courbe  $BCG$  en  $G$ ) l'angle  $KDL$  égal à l'angle  $AOD$  fait par les tangentes en  $B, G$ ; & que l'on décrive comme on voudra, du centre  $D$  l'arc  $KFL$ :

Je dis que  $DK \cdot KFL :: AE \cdot AMD \pm ENH$ . savoir + lorsque le point touchant tombe toujours entre les points décrivant, & — lorsqu'il les laisse toujours du même côté.

Car supposant que la droite  $AE$  en roulant autour de la courbe  $BCG$  soit parvenue dans les positions  $MCN$ ,  $mCn$  infiniment proches l'une de l'autre, & menant les rayons  $DF, Df$  parallèles à  $CM, Cm$ : il est clair que les sécateurs  $Dff, CMm, CNn$  seront semblables; & qu'ainsi  $DF \cdot Ff :: CM \cdot Mm :: CN \cdot Nn :: CM \pm CN$  ou  $AE \cdot Mm \pm Nn$ . Or comme cela arrivera toujours en quelque endroit que se trouve le point touchant  $C$ , il s'ensuit que le rayon  $DK$  est à l'arc  $KFL$  somme de tous les petits arcs  $Ff :: AE \cdot AMD \pm ENH$  somme de tous les petits arcs  $Mm \pm Nn$ . Ce qu'il falloit démontrer.

## COROLLAIRE I.

167. IL est visible que les courbes  $AMD$ ,  $ENH$  sont formées par le développement de la même courbe  $BCG$ ; & qu'ainsi la droite  $AE$  est toujours perpendiculaire sur ces deux courbes dans toutes les positions où elle se rencontre: de sorte que leur distance est par tout la même; ce qui est la propriété des lignes parallèles. D'où l'on voit qu'une ligne courbe  $AMD$  étant donnée, on peut trouver une infinité de points de la courbe  $ENH$  sans avoir besoin de sa développée  $BCG$ , en menant autant de perpendiculaires que l'on voudra à cette courbe, & les prenant toutes égales à la droite  $AE$ .

## COROLLAIRE II.

168. SI la courbe  $BCG$  a ses deux moitiés  $BC, CG$  entièrement semblables & égales, & que l'on prenne les droites  $BA, GH$  égales entr'elles; il est clair que les courbes  $AMD, ENH$  seront semblables & égales, en sorte

qu'elles ne différeront que par leur position. D'où il suit que la courbe *AMD* sera à l'arc de cercle *KFL* ::  $\frac{1}{2} AB$ . *DK*, c'est à dire en raison donnée.

## PROPOSITION II.

## Problème.

FIG. 132. 169. SOIENT deux courbes quelconques *AEV*, *BCG*, avec une troisième *AMD* telle qu'ayant décrit par le développement de la courbe *BCG* une portion de courbe *EM*, la relation des portions de courbes *AE*, *EM*, & des rayons de la développée *EC*, *MG* soit exprimée par une équation quelconque donnée. On propose de mener d'un point donné *M* sur la courbe *AMD* la tangente *MT*.

Ayant imaginé une autre portion de courbe *em* infiniment proche de *EM*, & les rayons de la développée *CeF*, *GmR* ; Soit, 1°. *CH* perpendiculaire sur *CE*, & qui rencontre en *H* la tangente *EH* de la courbe *AEV*. 2°. *ML* parallèle à *CE*, & qui rencontre en *L* l'arc *GL* décrit du centre *M* & du rayon *MG*. 3°. *GT* perpendiculaire sur *MG*, & qui rencontre en *T* la tangente cherchée *MT*.

On nommera ensuite les données *AE*, *x* ; *EM*, *y* ; *CE*, *u* ; *GM*, *z* ; *CH*, *s* ; *EH*, *t* ; l'arc *GL*, *r* ; d'où l'on aura *Ee* = *dx*, *Fe* ou *Rm* = *du* = *dz* ; & les triangles rectangles semblables *eFE*, *ECH* donneront *CE* (*u*). *CH* (*s*) :: *Fe* (*dz*). *FE* =  $\frac{sdz}{u}$ . Et *CE* (*u*). *EH* (*t*) :: *Fe* (*dz*). *Ee* (*dx*) =  $\frac{tdz}{u}$ .

\* Art. 166. Or par le Lemme\* *RF* - *me* =  $\frac{rdz}{z}$  ; & partant *RM* (*RF* - *me* + *me* - *ME* + *ME* - *MF*) =  $\frac{rdz}{z} + dy + \frac{sdz}{u}$ . Donc à cause des triangles rectangles semblables *mRM*, *MGT*, l'on aura *mR* (*dz*). *RM* ( $\frac{rdz}{z} + \frac{sdz}{u} + dy$ ) :: *MG* (*z*). *GT* =  $r + \frac{tz}{u} + \frac{zdy}{dz}$ . Mais si l'on met dans la différence de l'équation donnée à la place de *du* & *dx* leurs valeurs *dz* &  $\frac{tdz}{u}$ , l'on trouvera une valeur de *dy* en *dz*, laquelle étant

substituée dans  $\frac{zdy}{az}$ , il viendra pour la sous-tangente cherchée  $GT$  une valeur entièrement connue & délivrée des différences. Ce qui étoit proposé.

Si l'on suppose que la courbe  $BCG$  se réunisse en un point  $O$ ; il est visible que la portion de courbe  $ME$  ( $y$ ) se change en un arc de cercle égal à l'arc  $GL$  ( $r$ ), & que les rayons  $CE$  ( $u$ ),  $GM$  ( $z$ ) de la développée deviennent égaux entr'eux: de sorte que  $GT$ , qui devient en ce cas  $OT$ , se trouvera  $= y + s + \frac{zdy}{dz}$ . FIG. 133.

## E X E M P L E.

170. S O I T  $y = \frac{xz}{a}$ ; les différences donneront  $dy$  FIG. 133.  
 $= \frac{zdx - xdz}{a}$  (on prend  $- xdz$  au lieu de  $+ xdz$ ; \* Art. 8. parceque  $x$  &  $y$  croissant,  $z$  diminue)  $= \frac{zdx - xdz}{a}$ , en mettant pour  $dx$  sa valeur  $\frac{tdz}{z}$ ; & partant  $OT$  ( $y + s + \frac{zdy}{dz}$ )  $= y + s + \frac{tz - xz}{a} = \frac{az + tz}{a}$ , en mettant pour  $\frac{xz}{a}$  sa valeur  $y$ .

## R E M A R Q U E.

171. S i le point  $O$  tombe sur l'axe  $AB$ , & que la courbe FIG. 134.  
 $AEV$  soit un demi-cercle; la courbe  $AMD$  sera une demi-roulette, formée par la révolution d'un demi-cercle  $BSN$  autour d'un arc égal  $BGN$  d'un cercle décrit du centre  $O$ , & dont le point générateur  $A$  tombera dehors, dedans, ou sur la circonférence du demi-cercle mobile  $BSN$ , selon que la donnée  $a$  sera plus grande, moindre, ou égale à  $OV$ . Pour le prouver, & déterminer en même temps le point  $B$ .

Je suppose ce qui est en question, sçavoir que la courbe  $AMD$  est une demi-roulette, formée par la révolution du demi-cercle  $BSN$ , qui a pour centre le point  $K$  centre du demi-cercle  $AEV$ , autour de l'arc  $BGN$  décrit du centre  $O$ ; & concevant que ce demi-cercle  $BSN$  s'arrête dans la situation  $BGN$  telle que le point décrivant  $A$

tombe sur le point  $M$ , je mène par les centres des cercles générateurs la droite  $OK$  qui passe par conséquent par le point touchant  $G$ ; & tirant  $KSE$ , j'observe que les triangles  $OKE$ ,  $OKM$  sont égaux & semblables, puisque leurs trois côtés sont égaux chacun à chacun. D'où il suit 1°. Que les angles extrêmes  $MOK$ ,  $EOK$  sont égaux; & qu'ainsi les angles  $MOE$ ,  $GOB$  le sont aussi: ce qui donne  $GB.ME :: OB.OE$ . 2°. Que les angles  $MKO$ ,  $EKO$  sont encore égaux; & qu'ainsi les arcs  $GN$ ,  $BS$ , qui les mesurent, le sont aussi: la même chose se doit dire de leurs compléments  $GB$ ,  $SN$ , à deux droits; puisqu'ils appartiennent à des cercles égaux. Or par la génération de la roulette, l'arc  $GB$  du cercle mobile est égal à l'arc  $GB$  de l'immobile. J'aurai donc  $SN.ME :: OB.OE$ . Cela posé,

Je nomme les données  $OV$ ,  $b$ ;  $KV$  ou  $KA$ ,  $c$ ; & l'inconnue  $KB$ ,  $x$ . J'ai  $OB = b + c - x$ ; & les sécateurs semblables  $KEA$ ,  $KSN$  me donnent  $KE (c) . KS (x) :: AE (x) . SN = \frac{xx}{c}$ . Et partant  $OB (b + c - x) . OE (x) :: SN (\frac{xx}{c}) . EM (y) = \frac{xxz}{bc + cc - cx} = \frac{xz}{a}$ . D'où je tire  $KB (x) = \frac{bc + cc}{a + c}$ . Il est donc évident que si l'on prend  $KB = \frac{bc + cc}{a + c}$ , & qu'on décrive des centres  $K$  &  $O$  le demi-cercle  $BSN$  & l'arc  $BGN$ ; la courbe  $AMD$  sera une demi-roulette décrite par la révolution du demi-cercle  $BSN$  autour de l'arc  $BGN$ , & dont le point décrivant  $A$  tombe dehors, dedans, ou sur la circonférence de ce cercle, selon que  $KV (c)$  est plus grand, moindre, ou égal à  $KB (\frac{bc + cc}{a + c})$ , c'est à dire selon que  $a$  est plus grand, moindre, ou égal à  $OV (b)$ .

## COROLLAIRE I.

172. IL est clair que  $EM (y) . AE (x) :: KB \times OE (xz) . OB \times KV (bc + cc - cx)$ . Or si l'on suppose que  $OB$  devienne infinie; la droite  $OE$  le sera aussi, & deviendra parallèle à  $OB$ , puisqu'elle ne la rencontrera jamais; les

arcs concentriques  $BGN$ ,  $EM$  deviendront des droites parallèles entr'elles, & perpendiculaires sur  $OB$ ,  $OE$  : & alors la droite  $EM$  sera à l'arc  $AE :: KB$ .  $KV$ . parce que les droites infinies  $OE$ ,  $OB$  ne diffèrent entr'elles que d'une grandeur finie, doivent être regardées comme égales.

## COROLLAIRE II.

173. De ce que les angles  $MKO$ ,  $EKO$  sont égaux, il suit que les triangles  $MKG$ ,  $EKB$  seront égaux & semblables ; & qu'ainsi les droites  $MG$ ,  $EB$  sont égales entr'elles. D'où l'on voit \* que pour mener d'un point donné  $M$  sur la rou- \* Art. 43.  
lette, la perpendiculaire  $MG$ , il n'y a qu'à décrire du centre  $O$  l'arc  $ME$ , & du centre  $M$  de l'intervalle  $EB$  un arc de cercle qui coupera la base  $BGN$  en un point  $G$ , par où & par le point donné  $M$  l'on tirera la perpendiculaire requise.

## COROLLAIRE III.

174. Un point  $G$  étant donné sur la circonférence du demi-cercle mobile  $BGN$  ; si l'on veut trouver le point  $M$  de la roulette sur lequel tombe le point décrivant  $A$  lorsque le point donné  $G$  touche la base, il ne faut que prendre l'arc  $SN$  égal à l'arc  $BG$ , & ayant tiré le rayon  $KS$  qui rencontre en  $E$  la circonférence  $AEV$ , décrire du centre  $O$  l'arc  $EM$ . Car il est évident que cet arc coupera la roulette au point cherché  $M$ .

## PROPOSITION III.

## Problème.

175. Soit une demi-roulette  $AMD$  décrite par la révolution du demi-cercle  $BGN$  autour d'un arc égal  $BGN$  d'un autre cercle, en sorte que les parties révolues  $BG$ ,  $BG$  soient toujours égales entr'elles ; soit le point décrivant  $M$  pris sur le diamètre  $BN$  dehors, dedans, ou sur la circonférence mobile  $BGN$ . On demande le point  $M$  de la plus grande largeur de la demi-roulette par rapport à son axe  $OA$ .

Supposant que le point  $M$  soit celui qu'on cherche, il

Fig. 135, 136.

\* Art. 47. est clair \* que la tangente en  $M$  doit être parallèle à l'axe  $OA$ ; & qu'ainsi la perpendiculaire  $MG$  à la roulette, doit être aussi perpendiculaire sur l'axe qu'elle rencontre au point  $P$ . Cela posé, si l'on mène  $OK$  par les centres des cercles générateurs, elle passera par le point touchant  $G$ ; & si l'on tire  $KZ$  perpendiculaire sur  $MG$ , on formera les angles égaux  $GKL$ ,  $GOB$ ; & partant l'arc  $IG$  qui est le double de la mesure de l'angle  $GKL$ , sera à l'arc  $GB$  mesure de l'angle  $GOB$ , comme le diamètre  $BN$  est au rayon  $OB$ . D'où il suit que pour déterminer sur le demi-cercle  $BGN$  le point  $G$ , où il touche l'arc qui lui sert de base lorsque le point décrivant  $M$  tombe sur celui de la plus grande largeur; il faut couper le demi-cercle  $BGN$  en un point  $G$ , en sorte qu'ayant tiré par le point donné  $M$  la corde  $IG$ , l'arc  $IG$  soit à l'arc  $GB$  en raison donnée de  $BN$  à  $OB$ . La question se réduit donc à un Problème de la géométrie commune qui se peut toujours résoudre géométriquement lorsque la raison donnée est de nombre à nombre; mais avec le secours des lignes dont l'équation est plus ou moins élevée, selon que la raison est plus ou moins composée.

Si l'on suppose que le rayon  $OB$  devienne infini, comme il arrive lorsque la base  $BGN$  devient une ligne droite; il s'ensuit que l'arc  $IG$  sera infiniment petit par rapport à l'arc  $GB$ . D'où l'on voit que la sécante  $MIG$  devient alors la tangente  $MT'$ , lorsque le point décrivant  $M$  tombe au dehors du cercle mobile; & qu'il ne peut y avoir de point de plus grande largeur lorsqu'il tombe au dedans.

Lorsque le point  $M$  tombe sur la circonférence en  $N$ , il ne faut que diviser la demi-circonférence  $BGN$  en raison donnée de  $BN$  à  $OB$  au point  $G$ . Car le point  $G$  ainsi trouvé, sera celui où le cercle mobile  $BGN$  touche la base, lorsque le point décrivant tombe sur le point cherché.

## LEMM E I I.

176. **E**N tout triangle  $BAC$ , dont les angles  $ABC$ ,  $ACB$ , FIG. 137.  
 &  $CAD$  complément à deux droits de l'angle obtus  $BAC$ ,  
 sont infiniment petits ; je dis que ces angles ont même rapport  
 entr'eux que les côtés  $AC$ ,  $AB$ ,  $BC$ , auxquels ils sont opposés.

Car si l'on circonscrit un cercle au tour du triangle  $BAC$ ,  
 les arcs  $AC$ ,  $AB$ ,  $BAC$ , qui mesurent les doubles de ces  
 angles, seront infiniment petits, & ne différeront \* point \* \* Art. 3.  
 par conséquent de leurs cordes ou soutendantes.

Si les côtés  $AC$ ,  $AB$ ,  $BC$  du triangle  $BAC$ , ne sont pas  
 infiniment petits, mais qu'ils aient une grandeur finie : il  
 s'ensuit que le cercle circonscrit doit être infiniment  
 grand ; puisque les arcs  $AC$ ,  $AB$ ,  $BAC$ , qui ont une gran-  
 deur finie, doivent être infiniment petits par rapport à ce  
 cercle, étant les mesures d'angles infiniment petits.

## P R O P O S I T I O N I V.

## Problème.

177. **L**E s mêmes choses étant posées ; il faut déterminer sur FIG. 135.  
 chaque perpendiculaire  $MG$ , le point  $C$  où elle touche la dé- 136.  
 velopée de la roulette.

Ayant imaginé une autre perpendiculaire  $mg$  infini-  
 ment proche de  $MG$ , & qui la coupe par conséquent au  
 point cherché  $C$ , on tirera la droite  $Gm$  ; & ayant pris sur  
 la circonférence du cercle mobile le petit arc  $Gg$  égal à  
 l'arc  $Gg$  de l'immobile, on mena les droites  $Mg$ ,  $Ig$ ,  $Kg$ ,  
 $Og$ . Cela posé, si l'on regarde les petits arcs  $Gg$ ,  $Gg$  comme  
 de petites droites perpendiculaires sur les rayons  $Kg$ ,  $Og$ , il  
 est clair que le petit arc  $Gg$  du cercle mobile tombant sur  
 l'arc  $Gg$  de l'immobile, le point décrivant  $M$  tombera sur  
 $m$ , en sorte que le triangle  $GMg$  se confondra avec le  
 triangle  $Gmg$ . D'où l'on voit que l'angle  $MGM$  est égal à  
 l'angle  $gGg = GKg + GOg$  ; puisqu'ajoutant de part & d'autre  
 les mêmes angles  $KGg$ ,  $OGg$ , l'on en compose deux droits.

Or nommant les données  $OG$ ,  $b$  ;  $KG$ ,  $a$  ;  $GM$  ou  $Gm$ ,  $m$  ;

V

- \* *Art.* 176.  $GI$  ou  $Ig$ ,  $n$ ; l'on trouve, 1<sup>o</sup>, \*  $OG \cdot KG :: GKg \cdot GOG$ . Et  $OG(b) \cdot OG + GK$  ou  $OK(b+a) :: GKg \cdot GKg + GOG$
- \* *Ibid.* ou  $MGm = \frac{a+b}{b} GKg$ . 2<sup>o</sup>, \*  $Ig \cdot MI :: GMg \cdot MGI$ . Et  $Ig \pm MI$  ou  $MG(m)$ .  $Ig(n) :: GMg \pm MGI$  ou  $GIG$  ou  $\frac{1}{2} GKg \cdot GMg$
- \* *Ibid.* ou  $Gmg = \frac{n}{2m} GKg$ . 3<sup>o</sup>, \* L'angle  $MCm$  ou  $MGm - Gmg$   
 $(\frac{a+b}{b} - \frac{n}{2m} GKg) \cdot Gmg (\frac{n}{2m} GKg) :: Gm(m) \cdot GC$   
 $= \frac{bm n}{2am + 2bm - bn}$ . Et par conséquent le rayon cherché  $MC$   
 de la développée sera  $= \frac{2amm + 2bmm}{2am + 2bm - bn}$ .

Si l'on suppose que le rayon  $OG(b)$  du cercle immobile devienne infini, sa circonférence deviendra une ligne droite; & en effaçant les termes  $2amm$ ,  $2am$ , parcequ'ils sont nuls par rapport aux autres  $2bmm$ ,  $2bm - bn$ , l'on aura  $MC = \frac{2bmm}{2m - n}$ .

## COROLLAIRE I.

178. D E ce que l'angle  $MGm = \frac{a+b}{b} GKg$ , & de ce que les arcs de différens cercles sont entr'eux en raison composée des rayons & des angles qu'ils mesurent, il suit que  $Gg \cdot Mm :: KG \times GKg \cdot MG \times \frac{a+b}{b} GKg$ . Et par conséquent aussi que  $KG \times Mm = \frac{a+b}{b} MG \times Gg$ ; ou (ce qui est la même chose) que  $KG \times Mm \cdot MG \times Gg :: OK(a+b) \cdot OG(b)$ , qui est une raison constante. D'où l'on voit que la dimension de la portion  $AM$  de la demi-roulette  $AMD$ , dépend de la somme des  $MG \times Gg$  dans l'arc  $GB$ ; & c'est ce que M. *Pascal* a démontré à l'égard des roulettes qui ont pour bases des lignes droites.

M. *Varignon* est tombé dans cette même propriété par une voye très différente de celle-ci.

## COROLLAIRE II.

FIG. 135. 179. L O R S Q U E le point décrivant  $M$  tombe hors de

la circonférence du cercle mobile, il arrive nécessairement l'un des trois cas suivans. Car menant la tangente  $MT$ , le point touchant  $G$  tombera 1°. Sur l'arc  $TB$ , comme l'on a supposé dans la figure en faisant le calcul; & alors  $MC \left( \frac{1amm + 1bmm}{1am + 1bm - bn} \right)$  surpassera toujours  $MG(m)$ . 2°. Sur le point touchant  $T$ ; & l'on aura pour lors  $MC \left( \frac{1am + 1bmm}{1amm - 1bm - bn} \right) = m$ , puisque  $IG(n)$  s'évanouit. 3°. Sur l'arc  $TN$ ; & alors la valeur de  $GI(n)$  devenant négative de positive qu'elle étoit, l'on aura  $MC = \frac{1amm + 1bmm}{1am + 1bm + bn}$ : de sorte que  $MC$  sera moindre que  $MG(m)$ , & toujours positif. D'où il est évident que dans tous ces cas, la valeur du rayon  $MC$  de la développée est toujours positive.

## COROLLAIRE III.

180. LORSQUE le point décrivant  $M$  tombe au de- FIG. 136.  
dans de la circonférence du cercle mobile, on a toujours

$MC = \frac{1amm + 1bmm}{1am + 1bm - bn}$ ; & il peut arriver que  $bn$  surpassé  $1am + 1bmm$ , & qu'ainsi la valeur du rayon  $MC$  de la développée soit négative: d'où l'on voit que lorsqu'elle cesse d'être positive pour devenir négative, comme il arrive \* lorsque le point  $M$  devient un point d'inflexion, il faut \* Art. 81.

nécessairement alors que  $bn = 1am + 1bmm$ ; & partant que  $MI \times MG(mn - mm) = \frac{1amm + 1bmm}{b}$ . Or si l'on nomme la donnée  $KM$ ,  $c$ ; l'on aura par la propriété du cercle  $MI \times MG \left( \frac{1amm + 1bmm}{b} \right) = BM \times MN(aa - cc)$  ce qui donne l'inconnue  $MG(m) = \sqrt{\frac{aab + bcc}{1a + b}}$ . Donc si l'on décrit du point donné  $M$  comme centre, & de l'intervalle  $MG = \sqrt{\frac{aab - bcc}{1a + b}}$  un cercle; il coupera le cercle mobile en un point  $G$ , où il touchera le cercle immobile qui lui sert de base, lorsque le point décrivant  $M$  tombera sur le point d'inflexion  $F$ .

Si l'on mène  $MR$  perpendiculaire sur  $BN$ , il est clair que cette  $MG(\sqrt{\frac{aab-bcc}{as+b}})$  sera moindre que  $MR(\sqrt{aa-cc})$ , & qu'elle lui doit être égale lorsque  $b$  devient infinie, c'est à dire lorsque la base de la roulette devient une ligne droite.

Il est à remarquer, qu'afin que le cercle décrit du rayon  $MG$  coupe le cercle mobile, il faut que  $MG$  surpasse  $MN$ , c'est à dire que  $\sqrt{\frac{aab-bcc}{as+b}}$  surpasse  $a-c$ ; & qu'ainsi  $KM(c)$  surpasse  $\frac{aa}{a+b}$ . D'où il est manifeste qu'afin qu'il y ait un point d'inflexion dans la roulette  $AMD$ , il faut que  $KM$  soit moindre que  $KN$ , & plus grande que  $\frac{aa}{a+b}$ .

### LEMME III.

FIG. 138. 181. **S**OIENT deux triangles  $ABb$ ,  $CDd$  qui aient chacun un de leurs côtés  $Bb$ ,  $Dd$  infiniment-petit par rapport aux autres : je dis que le triangle  $ABb$  est au triangle  $CDd$  en raison composée de l'angle  $BAb$  à l'angle  $DCd$ , & du carré du côté  $AB$  ou  $Ab$  au carré du côté  $CD$  ou  $Cd$ .

Car si l'on décrit des centres  $A$ ,  $C$ , & des intervalles  
\* Art. 2.  $AB$ ,  $CD$ , les arcs de cercles  $BE$ ,  $DF$ ; il est clair \* que les triangles  $ABb$ ,  $CDd$  ne différeront point des secteurs de cercles  $ABE$ ,  $CDF$ . Donc, &c.

Si les côtés  $AB$ ,  $CD$  sont égaux, les triangles  $ABb$ ,  $CDd$  seront entr'eux comme leurs angles  $BAb$ ,  $DCd$ .

### PROPOSITION V.

#### Problème.

FIG. 135. 182. **L**ES mêmes choses étant toujours posées; on demande la quadrature de l'espace  $MGBA$ , renfermé par les perpendiculaires  $MG$ ,  $BA$  à la roulette, par l'arc  $GB$ , & par la portion  $AM$  de la demi-roulette  $AMD$ , en supposant la quadrature du cercle.

L'angle  $GMg(\frac{n}{im}GKg)$  est à l'angle  $MGM(\frac{a+b}{c}GKg)$ ,

comme \* le petit triangle  $MGg$  qui a pour base l'arc  $Gg$  du \* Art. 181. cercle mobile, au petit triangle ou secteur  $G M m$ ; & partant le secteur  $G M m = \frac{2m}{n} MGg \times \frac{a+b}{b} = \frac{2a+2b}{b} MGg$

+  $\frac{2ap+2bp}{bn} MGg$  en nommant  $MI, p$ , & mettant pour  $m$

sa valeur  $p+n$ . Or \* le petit triangle ou secteur  $KGg$  \* Art. 181.

est au petit triangle  $MGg$  en raison composée du quarré de  $KG$  au quarré de  $MG$ , & de l'angle  $GKg$  à l'angle

$GMg$ ; c'est à dire ::  $aa \times GKg. mm \times \frac{n}{2m} GKg$ . & par-

tant le petit triangle  $MGg = \frac{mm}{2aa} KGg$ . Mettant donc cet-

te valeur à la place du triangle  $MGg$  dans  $\frac{2ap+2bp}{bn} MGg$ ,

l'on aura le secteur  $G M m = \frac{2a+2b}{b} MGg + \frac{a+b \times pm}{aab} KGg$ .

Mais à cause du cercle,  $GM \times MI (pm) = BM \times MN$

( $cc - aa$ ), qui est une quantité constante, & qui demeure toujours la même en quelque endroit que se trouve le

point décrivant  $M$ ; & par conséquent  $G M m + MGg$  ou

$mg$ , c'est à dire le petit espace de la roulette  $G M mg$

$= \frac{2a+2b}{b} MGg + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KGg$ . Donc puisque  $G M mg$

est la différence de l'espace de la roulette  $MGBA$ , &  $MGg$

celle de l'espace circulaire  $MGB$ , renfermé par les droites

$MG, M^3$ , & par l'arc  $GB$ , & que de plus le petit secteur  $KGg$

est la différence du secteur  $KGB$ ; il s'ensuit \* que l'espace de

la roulette  $MGBA = \frac{2a+2b}{b} MGB + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KGB$ . \* Art. 96.

Ce qu'il falloit trouver.

Lorsque le point décrivant  $M$  tombe hors la circonfé-

rence  $BGN$  du cercle mobile, & que le point touchant  $G$

tombe sur l'arc  $NT$ ; il est visible \* que les perpendiculaires \* Art. 180.

$MG, mg$  s'entrecoupent en un point  $C$ , & qu'on a pour

lors  $m = p - n$ . D'où il suit que le petit secteur  $G M m$

$= - \frac{2a-2b}{b} MGg + \frac{2ap+2bp}{bn} MGg = - \frac{2a-2b}{b} MGg$

+  $\frac{2ap+2bp}{bn} KGg$ , en mettant comme auparavant pour le

petit triangle  $MGg$  sa valeur  $\frac{mn}{2ab} KGg$ ; & partant que  $G Mm$ .

—  $MGg$  ou  $mGg$ , c'est à dire  $MCm - GCg = -\frac{2a-3b}{b} MGg$   
 $+ \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KGg$ , en mettant pour  $pm$  sa valeur  $cc - aa$ .

Or supposant que  $TH$  soit la position de la tangente  $TM$  du cercle mobile, lorsque son point  $T$  touche la base au point  $T$ ; il est clair que  $MCm - GCg = MGT H - mGT H$ , c'est à dire la différence de l'espace  $MGT H$ , & que  $MGg$  est

\* Art. 96. celle de  $MGT$ , de même que  $KGg$  celle de  $KGT$ . Donc l'es-

pace  $MGT H = -\frac{2a-3b}{b} MGT + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KGT$ .

Mais, comme l'on vient de prouver, l'espace  $HTBA$

$= \frac{2a+3b}{b} MTB + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KTB$ . Et partant on aura tou-

jours & dans tous les cas l'espace  $MGBA$  ( $MGT H + HTBA$ )

$= \frac{2a+3b}{b} MTB - MGT$  ou  $MGB + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} KGT$

+  $KTB$  ou  $KGB$ .

FIG. 135. Donc l'espace entier  $DNBA$  renfermé par les deux perpendiculaires à la roulette  $DN$ ,  $BA$ , par l'arc de cercle  $BGN$ , & par la demi roulette  $AMD$ , est

$= \frac{2a+3b}{b} + \frac{a+b \times cc - aa}{aab} \times K NGB$ ; puisque le secteur  $KGB$





& l'espace circulaire  $MGB$  deviennent chacun le demi-cercle  $K NGB$ , lorsque le point touchant  $G$  tombe au point  $N$ .

FIG. 136. Lorsque le point décrivant  $M$  tombe au dedans du cercle mobile, il faut mettre  $aa - cc$  à la place de  $cc - aa$  dans les formules précédentes; parcequ'alors  $BM \times MN = aa - cc$ .

Si l'on fait  $c = a$ , l'on aura la quadrature des roulettes qui ont leur point décrivant sur la circonférence du cercle mobile; & si l'on suppose  $b$  infinie, l'on aura la quadrature de celles qui ont pour bases des lignes droites.

#### AUTRE SOLUTION.

FIG. 140. 183. On décrit du rayon  $OD$  l'arc  $DV$ , & des diamètres  $AV$ ,  $BN$  les demi-cercles  $AEV$ ,  $BSN$ ; & ayant décrit



131.



137.





à discrétion du centre  $O$  l'arc  $EM$  renfermé entre le demi-cercle  $AEV$  & la demi-roulette  $AMD$ , l'on mene l'appliquée  $EP$ . Il s'agit de trouver la quadrature de l'espace  $AEM$  compris entre les arcs  $AE$ ,  $EM$ , & la portion  $AM$  de la demi-roulette  $AMD$ .

Pour cela, soit un autre arc  $em$  concentrique & infiniment proche de  $EM$ , une autre appliquée  $ep$ , une autre  $Oe$  qui rencontre l'arc  $ME$  prolongé (s'il est nécessaire) au point  $F$ . Soient nommées les variables  $Oe$ ,  $x$ ;  $VP$ ,  $u$ ; l'arc  $AE$ ,  $x$ ; & comme auparavant les constantes  $OB$ ,  $b$ ;  $KB$  ou  $KN$ ,  $a$ ;  $KV$  ou  $KA$ ,  $c$ : l'on aura  $Fe = dx$ ,  $Pp = du$ ,  $OP = a + b - c + u$ ,  $PE^2 = 2cu - uu$ , l'arc  $EM^* = \frac{axx}{bc}$ ; & par \* Art. 171. tant le rectangle fait de l'arc  $EM$  par la petite droite  $Fe$ , c'est à dire \* le petit espace  $EMme = \frac{axxdx}{bc}$ . Or à cause \* Art. 2. du triangle rectangle  $OPE$ ;  $xz = aa + zab + bb - zac - zbc + cc + zau + zbu$ , dont la différence donne  $zdz = adu + bdu$ . Mettant donc cette valeur à la place de  $xdz$  dans  $\frac{axxdx}{bc}$ , l'on aura le petit espace  $EMme = \frac{aaxdu + abxdu}{bc}$ .

Maintenant si l'on décrit la demi-roulette  $AHT$  par la révolution du demi-cercle  $AEV$  sur la droite  $VT$  perpendiculaire à  $VA$ , & qu'on prolonge les appliquées  $PE$ ,  $pe$  jusqu'à ce qu'elles la rencontrent aux points  $H$ ,  $h$ : il est clair \* que  $EH \times Pp$ , c'est à dire le petit espace  $EHhe$  \* Art. 172.  $= xdu$ ; & qu'ainsi  $EMme (\frac{aaxdu + abxdu}{bc})$ .  $EHhe (xdu) :: aa + ab.bc$ , qui est une raison constante. Or puisque cela arrive toujours en quelqu'endroit que se trouve l'arc  $EM$ , il s'en suit que la somme de tous les petits espaces  $EMme$ , c'est à dire l'espace  $AEM$ , est à la somme de tous les petits espaces  $EHhe$ , c'est à dire à l'espace  $AEH :: aa + ab.bc$ . Mais l'on a \* la quadrature de l'espace  $AEH$  dépendamment de celle du cercle; & partant aussi celle de l'espace cherché  $AEM$ .

Ceci se peut aussi démontrer sans aucun calcul, comme j'ai fait voir dans les Actes de Leypsic au mois d'Aoust de l'année 1695.

On peut encore trouver la quadrature de l'espace  $AEH$  sans avoir recours à l'art. 99. Car si l'on achève les rectangles  $PQ, pq$ , l'on aura  $Qq$  ou  $HR$ .  $Pp$  ou  $Rh$ :  $EP$ .  $PA$  ou  
 \* Art. 18.  $HQ$ , puisque \* la tangente en  $H$  est parallèle à la corde  $AE$ ; & partant  $HQ \times Qq = EP \times Pp$ , c'est à dire que les petits espaces  $HQqh$ ,  $EPpe$  sont toujours égaux entr'eux. D'où il suit que l'espace  $AHQ$  renfermé par les perpendiculaires  $AQ$ ,  $QH$ , & par la portion  $AH$  de la demi-roulette  $AHT$ , est égal à l'espace  $APE$  renfermé par les perpendiculaires  $AP$ ,  $PE$ , & par l'arc  $AE$ . L'espace  $AEH$  sera donc égal au rectangle  $PQ$  moins le double de l'espace circulaire  $APE$ ; c'est à dire au rectangle fait de  $PE$  par  $KA$  plus ou moins le rectangle fait de  $KP$  par l'arc  $AE$ , selon que le point  $P$  tombe au dessous ou au dessus du centre. Et par conséquent l'espace cherché  $AEM$

$$= \frac{aa + ab}{bc} PE \times KA \pm KP \times AE.$$

## COROLLAIRE I.

184. LORSQUE le point  $P$  tombe en  $K$ , le rectangle  $KP \times AE$  s'évanouit, & le rectangle  $PE \times KA$  devient égal au quarré de  $KA$ : d'où l'on voit que l'espace  $AEM$  est alors  $= \frac{aac + abc}{b}$ ; & par conséquent il est quarrable absolument & indépendamment de la quadrature du cercle.

## COROLLAIRE II.

185. SI l'on ajoute à l'espace  $AEM$  le secteur  $AKE$ , l'espace  $AKEM$  renfermé par les rayons  $AK$ ,  $KE$ , par l'arc  $EM$ , & par la portion  $AM$  de la demi-roulette  $AMD$ , se trouve (lorsque le point  $P$  tombe au dessus du centre  $K$ )

$$= \frac{bcc + 2aac + 2abc - 2aan - 2abn}{2bc} AE + \frac{aa + ab}{bc} PE \times KA; \&$$

partant si l'on prend  $VP(u) \frac{2aac + 2abc + bcc}{2aa + 2ab}$  (ce qui rend nul-

le la valeur de  $\frac{bcc + 2aac + 2abc - 2aan - 2abn}{2bc} AE$ ), l'on aura l'espace

l'espace  $AKEM = \frac{aa+ab}{bc} PE \times KA$ . D'où l'on voit que sa quadrature est encore indépendante de celle du cercle.

Il est visible qu'entre tous les espaces  $AEM$  &  $AKEM$ , il ne peut y avoir que les deux que l'on vient de marquer, dont la quadrature soit absolue.

#### AVERTISSEMENT.

*Tout ce que l'on vient de démontrer à l'égard des roulettes extérieures se doit aussi entendre des intérieures, c'est à dire de celles dont le cercle mobile roule au dedans de l'immobile ; en observant que les rayons  $KB$  (a),  $KV$  (a) deviennent négatifs de positifs qu'ils étoient. C'est pourquoi il faudra changer dans les formules précédentes, les signes des termes où a & c se rencontrent avec une dimension impaire.*

#### REMARQUE.

186. IL y a certaines courbes qui paroissent avoir un point d'inflexion, & qui cependant n'en ont point ; ce que je crois à propos d'expliquer par un exemple, car cela pourroit faire quelque difficulté.

\* Soit la courbe géométrique  $NDN$ , dont la nature est FIG. 141.

exprimée par l'équation  $z = \frac{xx - aa}{\sqrt{1xx - aa}}$  ( $AP = x$ ,  $PN = z$ ), dans laquelle il est clair 1°. Que  $x$  étant égale à  $a$  ;  $PN$  ( $z$ ) s'évanouit. 2°. Que  $x$  surpassant  $a$ , la valeur de  $z$  est positive, & qu'au contraire lorsqu'il est moindre, elle est négative. 3°. Que lorsque  $x = \sqrt{\frac{1}{2}} aa$ , la valeur de  $PN$  est infinie. D'où l'on voit que la courbe  $NDN$  passe de part & d'autre de son axe en le coupant en un point  $D$  tel que  $AD = a$  ; & qu'elle a pour asymptote la perpendiculaire  $BG$  menée par le point  $B$  tel que  $AB = \sqrt{\frac{1}{2}} aa$ .

Si l'on décrit à présent une autre courbe  $EDF$ , en sorte qu'ayant mené à discrétion la perpendiculaire  $MPN$ , le rectangle fait de l'appliquée  $PM$  par la constante  $AD$ ,

X

soit toujours égal à l'espace correspondant  $DPN$ ; il est visible qu'en nommant  $PM, y$ ; & prenant les différences, l'on aura  $AD \times Rm(ady) = NPpn$  ou  $NP \times Pp$  ( $\frac{x dx - a dx}{y x x - a a}$ ); & partant  $Rm(dy) \cdot Pp$  ou  $RM(dx)$  ::  $PN \cdot AD$ . D'où il suit que la courbe  $EDF$  touche l'asymptote  $EG$  prolongée de l'autre côté de  $B$  en un point  $E$ , & l'axe  $AP$  au point  $D$ ; & qu'ainsi elle doit avoir un point

- \* Art. 78. d'inflexion en  $D$ . Cependant on trouve  $* - \frac{x^2}{2aa}$  pour la valeur du rayon de sa développée, laquelle est toujours négative, & devient égale à  $-\frac{1}{2}a$  lorsque le point  $M$
- \* Art. 81. tombe en  $D$ : d'où l'on doit conclure \* que la courbe qui passe par tous les points  $M$  est toujours convexe vers l'axe  $AP$ , & qu'elle n'a pas de point d'inflexion en  $D$ . Comment donc accorder tout cela? En voici le dénouement.

Si l'on prend  $PM$  du même côté que  $PN$ , on formera une autre courbe  $GDH$  qui sera toute pareille à  $EDF$ , & qui en doit faire partie; puisque sa génération est la même. Cela étant ainsi, l'on doit penser que les parties qui composent la courbe entière ne sont pas  $EDF, GDH$  comme l'on s'étoit imaginé, mais bien  $EDH, GDF$  qui se touchent au point  $D$ ; car tout s'accorde parfaitement dans cette dernière supposition. Ceci se confirme encore par cet exemple.

- FIG. 142. Soit la courbe  $DMG$ , qui ait pour équation  $y^4 = x^4 + aaxx - b^4$  ( $AP = x, PM = y$ ). Il suit de cette équation que la courbe entière a deux parties  $EDH, GDF$  opposées l'une à l'autre comme l'hyperbole ordinaire, en sorte que leur distance  $DD$  ou  $2AD = \sqrt{-2aa + 2\sqrt{a^4 + 4b^4}}$ .

- FIG. 143. Si l'on suppose que  $b$  s'évanouisse, la distance  $DD$  s'évanouira aussi; & partant les deux parties  $EDH, GDF$  se toucheront au point  $D$ : de sorte qu'on pourroit penser à présent que cette courbe a un point d'inflexion ou de rebroussement en  $D$ , selon qu'on imagineroit que ses par-

ties seroient  $EDF$ ,  $GDH$  ou  $EDG$ ,  $HDF$ . Mais l'on se dé-  
tromperoit aisément, en cherchant le rayon de la déve-  
lopée; car l'on trouveroit qu'il seroit toujours positif, &  
qu'il deviendrait égal à  $\frac{1}{2}a$  dans le point  $D$ .

On peut remarquer en passant, que la quadrature de FIG. 141.  
l'espace  $DPN$  dépend de celle de l'hyperbole : ou ( ce  
qui revient au même) de la réctification de la parabole;  
& que la portion de courbe  $DMF$  satisfait au Problème  
proposé par M. *Bernoulli* dans le Tome second des Sup-  
plémens des Actes de *Leyplie*, page 291.



## SECTION X.

*Nouvelle manière de se servir du calcul des différences dans les courbes géométriques, d'où l'on déduit la Méthode de M<sup>r</sup> Delcartes & Hudde.*

## DÉFINITION I.

FIG. 144.  
145. 146.

SOIT une ligne courbe  $ADB$  telle que les parallèles  $SKMN$  à son diamètre  $AB$  la rencontrent en deux points  $M, N$ ; & soit entendue la partie interceptée  $MN$  ou  $PQ$  devenir infiniment petite. Elle sera nommée alors la *Différence* de la coupée  $AP$ , ou  $KM$ .

## COROLLAIRE I.

187. LORSQUE la partie  $MN$  ou  $PQ$  devient infiniment petite, il est clair que les coupées  $AP, AQ$  deviennent égales chacune à  $AE$ , & que les points  $M, N$  se réunissent en un point  $D$ : en sorte que l'appliquée  $ED$  est la plus grande ou la moindre de toutes ses semblables  $PM, NQ$ .

## COROLLAIRE II.

188. IL est clair qu'entre toutes les coupées  $AP$ , il n'y a que  $AE$  qui ait une différence; parcequ'il n'y a qu'en ce cas où  $PQ$  devienne infiniment petite.

## COROLLAIRE III.

189. SI l'on nomme les indéterminées  $AP$  ou  $KM$ ,  $x$ ;  $PM$  ou  $AK$ ,  $y$ ; il est évident que  $AK(y)$  demeurant la même, il doit y avoir deux valeurs différentes de  $x$ , savoir  $KM, KN$  ou  $AP, AQ$ . C'est pourquoi il faut que l'équation qui exprime la nature de la courbe  $ADB$  soit délivrée d'incommensurables, afin que la même inconnue  $x$  qui en marque les racines (car on regarde  $y$  comme connue) puisse avoir différentes valeurs. Ce qu'il faut observer dans la suite.

## PROPOSITION I.

## Problème.

190. **L**A nature de la courbe géométrique  $ADB$  étant donnée; déterminer la plus grande ou la moindre de ses appliquées  $ED$ .

Si l'on prend la différence de l'équation qui exprime la nature de la courbe, en traitant  $y$  comme constante, &  $x$  comme variable; il est clair \* qu'on formera une nouvelle équation qui aura pour une de ses racines  $x$ , une valeur  $AE$ , telle que l'appliquée  $ED$  sera la plus grande ou la moindre de toutes les semblables. \* Art. 188.

Soit, par exemple,  $x^3 + y^3 = axy$ , dont la différence, en traitant  $x$  comme variable, &  $y$  comme constante, donne  $3xxdx = aydx$ ; & partant  $y = \frac{3xx}{a}$ . Si l'on substitue cette valeur à la place de  $y$  dans l'équation à la courbe  $x^3 + y^3 = axy$ ; l'on aura pour  $x$  une valeur  $AE = \frac{2}{3}a\sqrt[3]{2}$ , telle que l'appliquée  $ED$  sera la plus grande de toutes les semblables, de même qu'on l'a déjà trouvé art. 48.

Il est évident que l'on détermine de même non seulement les points  $D$ , lorsque les appliquées  $ED$  sont perpendiculaires ou tangentes de la courbe  $ADB$ ; mais aussi lorsqu'elles sont obliques sur la courbe, c'est à dire lorsque les points  $D$  sont des points de rebroussement de la première ou seconde sorte. D'où l'on voit que cette nouvelle manière de considérer les différences dans les courbes géométriques est plus simple & moins embarrassante en quelques rencontres, que la \* première. \* Sect. 3.

## REMARQUE.

191. **O**N peut remarquer dans les courbes rebroussantes, que les  $PM$  parallèles à  $AK$ , les rencontrent en deux points  $M, O$ , de même que les  $KM$  parallèles à  $AP$ , font en  $M, N$ : de sorte que  $AP(x)$  demeurant la même,  $y$  a deux

X iij

FIG. 146.

différentes valeurs  $PM$ ,  $PO$ . C'est pourquoi l'on peut traiter  $x$  comme constante, &  $y$  comme variable, en prenant la différence de l'équation qui exprime la nature de cette courbe. D'où l'on voit que si l'on traite  $x$  &  $y$  comme variables, en prenant cette différence, il faudra que tous les termes qui multiplient  $dx$  d'une part, & tous ceux qui multiplient  $dy$  d'une autre part, soient égaux à zéro. Mais il faut bien prendre garde que  $dx$  &  $dy$  marquent ici les différences de deux appliquées qui partent d'un même point, & non pas (comme ci-devant Sect. 3.) la différence de deux appliquées infiniment proches.

## COROLLAIRE.

192. Si après avoir ordonné l'équation qui exprime la nature de la courbe dans laquelle il n'y a que l'inconnue  $x$  de variable, l'on en prend la différence; il est clair 1°. Qu'on ne fait autre chose que de multiplier chaque terme par l'exposant de la puissance de  $x$ , & par la différence  $dx$ , & le diviser ensuite par  $x$ . 2°. Que cette division par  $x$ , aussi-bien que la multiplication par  $dx$ , peut être négligée, parcequ'elle est la même dans tous les termes. 3°. Que les exposans des puissances de  $x$  font une progression arithmétique, dont le premier terme est l'exposant de la plus grande puissance, & le dernier est zéro; car on suppose qu'on ait marqué par une étoile les termes qui peuvent manquer dans l'équation.

Soit par exemple  $x^3 * - ayx + y^3 = 0$ . Si l'on multiplie chaque terme par ceux de la progression arithmétique 3, 2, 1, 0; l'on formera l'équation nouvelle  $3x^3 * - ayx = 0$ .

$$x^3 * - ayx + y^3 = 0.$$

$$\begin{array}{r} 3, \quad 2, \quad 1, \quad 0. \\ \hline 3x^3 * - ayx \quad * = 0. \end{array}$$

D'où l'on tire  $y = \frac{3x^3}{a}$ , de même que l'on auroit trouvé en prenant la différence à la manière accoutumée.

Cela supposé, je dis qu'au lieu de la progression arith-

métique  $3, 2, 1, 0$ , l'on peut se servir de telle autre progression arithmétique qu'on voudra :  $m+3, m+2, m+1, m+0$ , ou  $m$  (l'on désigne par  $m$  un nombre quelconque entier ou rompu, positif, ou négatif). Car multipliant  $x^3 - ayx + y^3 = 0$  par  $x^m$ , l'on aura  $x^{m+3} - ayx^{m+1} + y^3x^m = 0$ , dont les termes doivent être multipliés par ceux de la progression  $m+3, m+2, m+1, m$ . chacun par son correspondant pour en avoir la différence.

$$\begin{array}{ccccccc} x^{m+3} & & - ayx^{m+1} & & + y^3x^m & = & 0. \\ m+3, & m+2 & m+1, & & m. & & \\ \hline m+3x^{m+1} & & - m+1ayx^{m+1} & + & my^3x^m & = & 0. \end{array}$$

Ce qui donnera  $m+3x^{m+1} - m+1ayx^{m+1} + my^3x^m = 0$  ; & en divisant par  $x^m$ , il viendra  $m+3x^2 - m+1ayx + my^3 = 0$ , comme l'on auroit trouvé d'abord en multipliant simplement l'égalité proposée par la progression  $m+3, m+2, m+1, m$ .

Si  $m = -3$ , la progression sera  $0, -1, -2, -3$  ; & l'équation sera  $2ayx - 3y^3 = 0$ . Si  $m = -1$ , la progression sera  $2, 1, 0, -1$  ; & l'équation  $2x^2 - y^3 = 0$ .

On peut changer de signes tous les termes de la progression, c'est à dire qu'au lieu de  $0, -1, -2, -3$ , &  $2, 1, 0, -1$ , l'on peut prendre  $0, 1, 2, 3$ , &  $-2, -1, 0, 1$  ; parcequ'on ne fait par là que changer de signes tous les termes de la nouvelle équation qui doit être égale à zéro. Eten effet, au lieu de  $2ayx - 3y^3 = 0$ ,  $2x^2 - y^3 = 0$ , l'on auroit  $-2ayx + 3y^3 = 0$ ,  $-2x^2 + y^3 = 0$  ; ce qui est la même chose.

Or il est visible que ce que l'on vient de démontrer à l'égard de cet exemple, s'appliquera de même manière à tous les autres. D'où il suit que si après avoir ordonné une équation qui doit avoir deux racines égales entr'elles, l'on en multiplie les termes par ceux d'une progression arithmétique arbitraire, l'on formera une nouvelle équation qui renfermera entre ses racines une des deux égales de la première. Par la même raison, si cette nouvelle équation doit avoir encore deux racines égales, & qu'on la multiplie par une progression arith-

inétique, l'on en formera une troisième qui aura entre ses racines une des deux égales de la seconde; & ainsi de suite. De sorte que si l'on multiplie une équation qui doit avoir trois racines égales, par le produit de deux progressions arithmétiques, l'on en formera une nouvelle qui aura entre ses racines une des trois égales de la première; & de même si l'équation doit avoir quatre racines égales, il la faudra multiplier par le produit de trois progressions arithmétiques; si cinq, par le produit de quatre, &c.

C'est là précisément en quoi consiste la Méthode de M. Hudde.

## PROPOSITION II.

### Problème.

FIG. 147. 193. D'UN point donné T sur le diamètre AB, ou du point donné H sur AH parallèle aux appliquées; mener la tangente THM.

Ayant mené par le point touchant M l'appliquée MP, & nommé AT,  $s$ ; AH,  $t$ ; dont l'une ou l'autre est donnée, & les inconnues AP,  $x$ ; PM,  $y$ : les triangles semblables TAH, TPM donneront  $y = \frac{t + tx}{t}$ ,  $x = \frac{t - t^2}{t}$ ; & mettant ces valeurs à la place de  $y$  ou de  $x$  dans l'équation donnée, qui exprime la nature de la courbe AMD, l'on en formera une nouvelle dans laquelle  $y$  ou  $x$  ne se rencontrera plus.

Si l'on mène à présent une ligne droite TD qui coupe la droite AH en G, & la courbe AMD en deux points N, D, desquels l'on abaisse les appliquées NQ, DB; il est évident que  $t$  exprimant AG dans l'équation précédente,  $x$  ou  $y$  aura deux valeurs AQ, AB, ou NQ, DB, lesquelles deviennent égales entr'elles, savoir à la cherchée AP ou PM lorsque  $t$  exprime AH, c'est à dire lorsque la sécante TDN devient la tangente TM. D'où il suit que cette équation doit avoir deux racines égales. C'est pourquoi on la multipliera par une progression arithmétique arbitraire;

bitraire; ce que l'on réitérera, s'il est nécessaire, en multipliant de nouveau cette même équation par une autre progression arithmétique quelconque, afin que par la comparaison des équations qui en résultent, l'on en puisse trouver une qui ne renferme que l'inconnue  $x$  ou  $y$ , avec la donnée  $s$  ou  $t$ . L'exemple qui suit éclaircira suffisamment cette Méthode.

## E X E M P L E.

194. Soit  $ax = yy$  l'équation qui exprime la nature de la courbe  $AMD$ . Si l'on met à la place de  $x$  sa valeur  $\frac{t-tt}{t}$ , l'on aura  $yy$ , &c. qui doit avoir deux racines égales,

$$tyy - asy + ast = 0.$$

$$t, \quad 0, \quad -t.$$

$$tyy \quad * \quad - ast = 0.$$

C'est pourquoi multipliant par ordre ces termes par ceux de la progression arithmétique  $t, 0, -t$ , l'on trouvera  $as = yy = ax$ ; & partant  $AP(x) = s$ . D'où l'on voit qu'en prenant  $AP = AT$ ; & menant l'appliquée  $PM$ , la ligne  $TM$  sera tangente en  $M$ . Mais si au lieu de  $AT(t)$ , c'est  $AH(t)$  qui est donnée, l'on multipliera la même équation  $tyy$ , &c. par cette autre progression  $0, t, 2$ , & l'on aura la cherchée  $PM(y) = st$ .

On auroit trouvé la même construction en mettant pour  $y$  sa valeur  $\frac{t+tx}{t}$  dans  $ax = yy$ . Car il vient  $txx$ , &c. dont les termes multipliés par  $t, 0, -t$ , donnent  $xx = st$ ; & par conséquent  $AP(x) = s$ .

## C O R O L L A I R E.

195. Si l'on veut à présent que le point touchant  $M$  soit donné, & qu'il faille trouver le point  $T$  ou  $H$ , dans lequel la tangente  $MT$  rencontre le diamètre  $AB$  ou la parallèle  $AH$  aux appliquées; il n'y a qu'à regarder dans la dernière équation, qui exprime la valeur de l'inconnue  $x$  ou  $y$  par rapport à la donnée  $s$  ou  $t$ , cette dernière comme l'inconnue, &  $x$  ou  $y$  comme connue.

## PROPOSITION III.

## Problème.

FIG. 148. 196. **L**A nature de la courbe géométrique  $AED$  étant donnée; déterminer son point d'inflexion  $F$ .

Ayant mené le point cherché  $F$  l'appliquée  $FE$  avec la tangente  $FL$ , par le point  $A$  (origine des  $x$ ) la parallèle  $AK$  aux appliquées, & nommé les inconnues  $LA, s$ ;  $AK, t$ ;  $AE, x$ ;  $EF, y$ ; les triangles semblables  $LAK, LEF$  donneront encore  $y = \frac{H+t}{s}$ , &  $x = \frac{H}{s}$ , de sorte que mettant ces valeurs à la place de  $y$  ou  $x$  dans l'équation à la courbe, l'on en formera une nouvelle dans laquelle  $y$  ou  $x$  ne se rencontrera plus, de même que dans la proposition précédente.

Si l'on mène à présent une ligne droite  $TD$  qui coupe la droite  $AK$  en  $H$ , qui touche la courbe  $AED$  en  $M$ , & la coupe en  $D$ , d'où l'on abaisse les appliquées  $MP, DB$ : il est évident 1°. Que  $s$  exprimant  $AT$ ; &  $t, AH$ ; l'équation que l'on vient de trouver, doit avoir deux racines

\* Art. 193. égales, sçavoir\* chacune à  $AP$  ou à  $PM$  selon qu'on a fait évanouir  $y$  ou  $x$ , & une autre  $AB$ , ou  $BD$ . 2°. Que  $s$  exprimant  $AL$ ; &  $t, AK$ ; le point touchant  $M$  se réunit avec le point d'intersection  $D$  dans le point cherché  $F$ :

\* Art. 67. puisque\* la tangente  $LF$  doit toucher & couper la courbe dans le point d'inflexion  $F$ ; & qu'ainsi les valeurs  $AP, AB$  de  $x$  ou  $PM, BD$  de  $y$  deviennent égales entr'elles, sçavoir l'une & l'autre à la cherchée  $AE$  ou  $EF$ . D'où il suit que cette équation doit avoir trois racines égales. C'est pourquoi on la multipliera par le produit de deux progressions arithmétiques arbitraires; ce que l'on réitérera, s'il est nécessaire, en la multipliant de même par un autre produit de deux progressions arithmétiques quelconques, afin que par la comparaison des équations qui en résultent, l'on puisse faire évanouir les inconnues  $s$  &  $t$ .

## E X E M P L E.

197. S O I T  $ayy = xyy + aax$  l'équation qui exprime la nature de la courbe  $AFD$ . Si l'on met à la place de  $x$  sa valeur  $\frac{yy - a^2}{a}$ , on formera l'équation  $sy^3 - styy - atyy$ , &c.

$$sy^3 - styy + aasy - aast = 0.$$

$$- at$$

$$1, \quad 0, \quad -1, \quad -2.$$

$$3, \quad 2, \quad 1, \quad 0.$$

$$3sy^3 \quad * \quad - aasy \quad * \quad = 0.$$

qui étant multipliée par  $3, 0, -1, 0$ , produit des deux progressions arithmétiques  $1, 0, -1, -2$ , &  $3, 2, 1, 0$ , donne  $yy = \frac{1}{3}aa$ ; & mettant cette valeur dans l'équation à la courbe, l'on trouve l'inconnue  $AE(x) = \frac{1}{4}a$ . Ce qui revient à l'art. 68.

## A U T R E S O L U T I O N.

198. O N peut encore résoudre ce Problème en re- Fig. 149.  
marquant que du même point  $L$  ou  $K$  on ne peut me- 150.  
ner qu'une seule tangente  $LF$  ou  $KF$ ; parcequ'elle tou-  
che en dehors la partie concave  $AF$ , & en dedans le con-  
vexe  $FD$ ; au lieu que de tout autre point  $T$  ou  $H$ , pris sur  
 $AL$  ou  $AK$  entre  $A$  &  $L$  ou  $A$  &  $K$ , l'on peut mener deux  
tangentes  $TM, TD$  ou  $HM, HD$ , l'une de la partie con-  
cave, & l'autre de la convexe: de sorte qu'on peut consi-  
dérer le point d'inflexion  $F$  comme la réunion des deux  
points touchans  $M$  &  $D$ . Si donc l'on suppose que  $AT(s)$   
ou  $AH(s)$  soit donnée, & qu'on cherche\* la valeur de  $x$  \* Art. 194.  
ou  $y$  par rapport à  $s$  ou  $t$ ; l'on aura une équation qui  
aura deux racines  $AP, AB$  ou  $PM, BD$  qui deviennent  
égales chacune à la cherchée  $AE$  ou  $EF$ , lorsque  $s$  expri-  
me  $AL$  &  $t, AK$ . C'est pourquoi l'on multipliera cette  
équation par une progression arithmétique arbitraire, &c.

## EXEMPLE.

199. Soit comme ci-dessus,  $ayy = xyy + aax$ ; l'on aura encore  $xy - styy - atyy + aasy - aast = 0$ , qui étant multipliée par la progression arithmétique  $x, 0, -1, -2$ , donne  $y^3x - aasy - 2aat = 0$ , dans laquelle  $s$  ne se rencontre plus, & qui a deux racines inégales, sçavoir  $PM, BD$ , lorsque  $t$  exprime  $AH$ , & deux égales chacune à la cherchée  $EF$  lorsque  $t$  exprime  $AK$ . C'est pourquoi multipliant de nouveau cette dernière équation par la progression arithmétique  $3, 2, 1, 0$ , l'on aura  $zyy - aa = 0$ ; & partant  $EF (y) = \sqrt{\frac{1}{3}aa}$ . Ce qu'il falloit trouver.

## PROPOSITION IV.

## Problème.

FIG. 151. 200. **MENER** d'un point donné  $C$  hors une ligne courbe  $AMD$  une perpendiculaire  $GM$  à cette courbe.

Ayant mené les perpendiculaires  $MP, CK$  sur le diamètre  $AB$ , & décrit du centre  $C$  de l'intervalle  $CM$  un cercle; il est clair qu'il touchera la courbe  $AMD$  au point  $M$ . Nommant ensuite les inconnues  $AP, x$ ;  $PM, y$ ;  $CM, r$ ; & les connues  $AK, s$ ;  $KC, t$ : l'on aura  $PK$  ou  $CE = s - x$ ,  $ME = y + t$ ; & à cause du triangle rectangle  $MEC$ ,  $y = -t + \sqrt{rr - ss + 2sx - xx}$ ,  $x = s - \sqrt{rr - tt - 2ty - yy}$ : de sorte que mettant ces valeurs à la place de  $y$  ou  $x$  dans l'équation à la courbe, l'on en formera une nouvelle dans laquelle  $y$  ou  $x$  ne se rencontrera plus.

Si l'on décrit à présent du même centre  $C$  un autre cercle qui coupe la courbe en deux points  $N, D$ , d'où l'on abaisse les perpendiculaires  $NQ, DB$ ; il est évident que  $r$  exprimant le rayon  $CN$  ou  $CD$  dans l'équation précédente,  $x$  ou  $y$  aura deux valeurs  $AQ, AB$  ou  $NQ, DB$  qui deviennent égales entr'elles, sçavoir à la cherchée  $AP$  ou  $PM$  lorsque  $r$  exprime le rayon  $CM$ . D'où il suit que cette équation doit avoir deux racines égales. C'est pourquoi on la multipliera, &c.

## EXEMPLE.

201. SOIT  $ax = yy$  l'équation qui exprime la nature de la courbe  $AMD$ , dans laquelle mettant pour  $x$  sa valeur  $s - \sqrt{rr - tt - 2ty - yy}$ , l'on aura  $as - yy = a\sqrt{rr - tt - 2ty - yy}$  de sorte qu'en quarrant chaque membre, & ordonnant ensuite l'équation, l'on trouvera  $y^4$ , &c. qui doit avoir deux racines égales lorsque  $y$  exprime la cherchée  $PM$ .

$$y^4 - 2asyy + 2aaty + aass = 0.$$

$$+ aa \quad - aarr \quad + aatt$$

---


$$4y^4 - 4asyy + 2aaty + 2aa = 0.$$

C'est pourquoi on la multipliera par la progression arithmétique 4, 3, 2, 1, 0, ce qui donnera  $4y^4 - 4asyy + 2aa$  dont la résolution fournira pour  $y$  la valeur cherchée  $MP$ .

Si le point donné  $C$  tomboit sur le diamètre  $AB$ ; l'on auroit alors  $t = 0$ , & il faudroit effacer par conséquent tous les termes où  $t$  se rencontre; ce qui donneroit  $4as - 2aa = 4yy = 4ax$ , en mettant pour  $yy$  sa valeur  $ax$ . D'où l'on tireroit  $x = s - \frac{1}{2}a$ ; c'est à dire que si l'on prend  $CP$  égale à la moitié du paramètre, & qu'ayant tiré l'appliquée  $PM$  perpendiculaire sur  $AB$ , l'on mène la droite  $CM$ , elle sera perpendiculaire sur la courbe  $AMD$ .

## COROLLAIRE.

202. SI l'on veut à présent que le point  $M$  soit donné, & que le point  $C$  soit celui qu'on cherche; il faudra dans la dernière équation qui exprime la valeur de  $AC$  ( $s$ ) par rapport à  $AP$  ( $x$ ) ou  $PM$  ( $y$ ), regarder ces dernières comme connues, & l'autre comme l'inconnue.

## DEFINITION II.

Si d'un rayon quelconque de la développée l'on décrit un cercle, il sera nommé *cercle baissant*.

Le point où ce cercle touche ou baise la courbe, est appelé *point baissant*.

## PROPOSITION V.

## Problème.

FIG. 153. 203. LA nature de la courbe AMD étant donnée avec un de ses points quelconque M, trouver le centre C du cercle qui la baise en ce point M.

Ayant mené les perpendiculaires MP, CK sur l'axe, & nommé les lignes par les mêmes lettres que dans le Problème précédent, l'on arrivera à la même équation dans laquelle il faut observer que la lettre  $x$  ou  $y$ , que l'on y regarde comme l'inconnue, marque ici une grandeur donnée; & qu'au contraire  $s$ ,  $t$ , que l'on y regarde comme connues, sont en effet ici les inconnues aussi bien que  $r$ .

Cela posé, il est clair 1°. Que le point cherché C sera situé sur la perpendiculaire MG à la courbe. 2°. Que l'on pourra toujours décrire un cercle qui touchera la courbe en M, & la coupera au moins en deux points (dont je suppose que le plus proche est D, d'où l'on abaissera la perpendiculaire DB); puisque l'on peut toujours trouver un cercle qui coupe une ligne courbe quelconque, autre qu'un cercle, au moins en quatre points, & que le point touchant M n'équivaut qu'à deux intersections. 3°. Que plus son centre G approche du point cherché C, plus aussi le point d'intersection D approche du point touchant M: de sorte que le point G tombant sur le point

\*Art. 76. C, le point D se réunit avec le point M; puisque \* le cercle décrit du rayon CM, doit toucher & couper la courbe au même point M. D'où l'on voit que  $s$  exprimant AF, &  $t$ , FG, l'équation doit avoir deux racines

\*Art. 200. égales, savoir \* chacune à AP ou PM selon qu'on a fait

évanouir  $y$  ou  $x$ , & une autre  $AB$  ou  $BD$  qui devient aussi égale à  $AP$  ou  $PM$  lorsque  $s$  &  $t$  expriment les cherchées  $AK$ ,  $KC$ ; & qu'ainsi cette équation doit avoir trois racines égales.

## EXEMPLE.

204. Soit  $ax = yy$  l'équation qui exprime la nature de la courbe  $AMD$ , & l'on trouvera  $y^4$ , &c. qui étant multipliée par  $8, 3, 0, -1, 0$ , produit des deux progressions arithmétiques  $4, 3, 2, 1, 0$ , &  $2, 1, 0, -1, -2$  donne  $8y^4 = 2aaty$ . \* Art. 201.

$$\begin{array}{r}
 y^4 \quad * \quad - 2aaty \quad + 2aaty \quad + aat = 0. \\
 \quad \quad + aa \quad \quad \quad - aat \\
 \quad \quad \quad \quad \quad + aat \\
 4, \quad 3, \quad 2, \quad 1, \quad 0. \\
 2, \quad 1, \quad 0, \quad -1, \quad -2. \\
 \hline
 8y^4 \quad * \quad - 2aaty \quad * \quad = 0.
 \end{array}$$

D'où l'on tire la cherchée  $KC$  ou  $PE$  ( $t$ ) =  $\frac{4y^4}{aa}$ .

Si l'on veut avoir une équation qui exprime la nature de la courbe qui passe par tous les points  $C$ , l'on multipliera encore  $y^4$ , &c. par  $0, 3, 4, 3, 0$ , produit des deux progressions  $4, 3, 2, 1, 0$ , &  $0, 1, 2, 3, 4$ ; & l'on trouvera  $8asy - 4aay = 6aat$ : d'où, en supposant pour abréger  $s - \frac{1}{2}a = u$ , l'on tirera  $y = \frac{3at}{4u}$ , &  $4y^4 = \frac{27a^4t^4}{16u^4} = aat$ ; & partant  $16u^4 = 27att$ . D'où il suit que la courbe qui passe par tous les points  $C$ , est une seconde parabole cubique, dont le paramètre =  $\frac{27a}{16}$ , & dont le sommet est éloigné de celui de la parabole proposée de  $\frac{1}{2}a$ ; parceque  $u = s - \frac{1}{2}a$ .

Lorsque la position des parties de la courbe, voisines du point donné  $M$ , est entièrement semblable de part & d'autre de ce point, comme il arrive lorsque la courbure  $y$  est la plus grande ou la moindre; il s'enfuit que l'une des intersections du cercle touchant ne peut se réunir avec le point touchant, que l'autre ne s'y réunisse en

même temps : de sorte que l'équation doit avoir alors quatre racines égales. En effet si l'on multiplie  $y^4$ , &c. par  $24, 6, 0, 0, 0$ , produit des trois progressions arithmétiques  $4, 3, 2, 1, 0$ , &  $3, 2, 1, 0, -1$ , &  $2, 1, 0, -1, -2$ ; l'on aura  $24y^4 = 0$ : ce qui fait voir que le point  $M$  doit tomber sur le sommet  $A$  de la parabole, afin que la position des parties voisines de la courbe soit semblable de part & d'autre.

## AUTRE SOLUTION.

- FIG. 154. 205. ON peut encore résoudre ce Problème en se souvenant que l'on a démontré dans l'article 76 qu'on ne peut mener du point cherché  $C$  qu'une seule perpendiculaire  $CM$  à la courbe  $AMD$ ; au lieu qu'il y a une infinité d'autres points  $G$  sur cette perpendiculaire  $MC$ , d'où l'on peut mener deux perpendiculaires  $MG$ ,  $GD$  à la courbe. Si donc on suppose que le point  $G$  soit donné, & que l'on cherche \* la valeur de  $x$  ou  $y$  par rapport aux données  $s$  &  $t$ ; il est visible que cette équation doit avoir deux racines inégales, sçavoir  $AP$ ,  $AB$  ou  $PM$ ,  $BD$  qui deviennent égales entr'elles lorsque le point  $G$  tombe sur le point cherché  $C$ . C'est pourquoi l'on multipliera cette équation par une progression arithmétique quelconque, &c.
- \* Art. 100.

## EXEMPLE.

- \* Art. 101. 206. SOIT comme ci-dessus  $ax = yy$ , & l'on aura \*  $4y^4$ , &c.

$$\begin{array}{r}
 4y^4 * - 4asy + 2adt = 0. \\
 + 2ad \\
 \hline
 2, \quad 1, \quad 0, \quad -1. \\
 8y^4 * \quad * - 2adt = 0.
 \end{array}$$

qui étant multipliée par la progression arithmétique  $2, 1, 0$ ,

- \* Art. 204. —  $1$ , donne comme \* auparavant  $t = \frac{4y^4}{an}$ .

COROL.









